

**Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes
(ESCC)
Cycle 1.2**

Spécifications des variables dérivées (VD)

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Table des matières

VARIABLES GÉOGRAPHIQUES (1 VD)	1
1) RÉGION SOCIO-SANITAIRE – VARIABLE GROUPEE.....	1
VARIABLES CONCERNANT LES ENREGISTREMENTS DE LOGEMENTS ET DE MÉNAGES (5 VDS).....	2
1) NOMBRE DE PERSONNES DE MOINS DE 12 ANS DANS LE MÉNAGE – VARIABLE GROUPEE	2
2) NOMBRE DE PERSONNES DE CINQ ANS OU MOINS DANS LE MÉNAGE – VARIABLE GROUPEE.....	2
3) NOMBRE DE PERSONNES DE 6 À 11 ANS DANS LE MÉNAGE - VARIABLE GROUPEE.....	2
4) SITUATION DANS LA FAMILLE ÉCONOMIQUE (TYPE DE MÉNAGE).....	2
<i>Reformatages temporaires</i>	3
5) MODALITÉS DE VIE DU RÉPONDANT SÉLECTIONNÉ – VARIABLE GROUPEE	6
<i>Reformatages temporaires</i>	6
VARIABLES SUR LE NIVEAU DE SCOLARITÉ (4 VD)	8
1) PLUS HAUT NIVEAU DE SCOLARITÉ – DU RÉPONDANT, 10 NIVEAUX	8
2) PLUS HAUT NIVEAU DE SCOLARITÉ – RÉPONDANT, 4 NIVEAUX.....	8
3) PLUS HAUT NIVEAU DE SCOLARITÉ – MÉNAGE, 10 NIVEAUX.....	9
4) PLUS HAUT NIVEAU DE SCOLARITÉ – MÉNAGE, 4 NIVEAUX	10
ÉTAT DE SANTÉ GÉNÉRAL (1 VD).....	11
1) AUTOÉVALUATION DE LA SANTÉ (ANTÉRIEUREMENT INDICE DE LA DESCRIPTION DE L'ÉTAT DE SANTÉ).....	11
FILTRAGE DES RÉPONDANTS EN FONCTION DES TROUBLES (9 VD).....	12
1) SATISFACTION FACE À LA VIE	12
2) AUTOÉVALUATION DE LA SANTÉ PHYSIQUE	12
3) AUTOÉVALUATION DE LA SANTÉ MENTALE	13
4) FILTRAGE DES RÉPONDANTS – DÉPRESSION	13
5) FILTRAGE DES RÉPONDANTS - MANIE	13
6) FILTRAGE DES RÉPONDANTS – TROUBLE PANIQUE.....	14
7) FILTRAGE DES RÉPONDANTS – PHOBIE SOCIALE	14
8) FILTRAGE DES RÉPONDANTS – AGORAPHOBIE	15
9) FILTRAGE DES RÉPONDANTS – TROUBLE D'ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE.....	15
PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES (3 VD)	16
1) EST ATTEINT(E) D'AUTRES FORMES DE PSYCHOSE – VARIABLE GROUPEE	16
2) EST ATTEINT D'AUTRES PROBLÈMES DE SANTÉ PHYSIQUE OU MENTALE DE LONGUE DURÉE – VARIABLE GROUPEE	16
3) A UN PROBLÈME DE SANTÉ CHRONIQUE.....	17
TAILLE ET POIDS (4 VD).....	20
1) TAILLE (MÈTRES) - VARIABLE GROUPEE	20
2) POIDS (KILOGRAMMES) - VARIABLE GROUPEE	22
3) INDICE DE LA MASSE CORPORELLE - VARIABLE GROUPEE	23
4) POIDS STANDARD (STANDARD CANADIEN) - VARIABLE GROUPEE	23
ACTIVITÉS PHYSIQUES (6 VD)	24
1) DÉPENSE D'ÉNERGIE	24
2) PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS PHYSIQUES DE LOISIRS	31
3) MOYENNE DE LA FRÉQUENCE MENSUELLE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES DURANT PLUS DE 15 MINUTES	31
<i>Reformatages temporaires</i>	31
4) FRÉQUENCE DE TOUTES LES ACTIVITÉS PHYSIQUES D'UNE DURÉE DE PLUS DE 15 MINUTES	33
5) PARTICIPATION QUOTIDIENNE À DES ACTIVITÉS PHYSIQUES D'UNE DURÉE DE PLUS DE 15 MINUTES	33
6) INDICE DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE	33

BIEN-ÊTRE PSYCHOLOGIQUE (1 VD).....	34
1) ÉCHELLE DE MANIFESTATION DU BIEN-ÊTRE PSYCHOLOGIQUE (EMMBEP)	34
<i>Reformatages temporaires</i>	34
DÉTRESSE (3 VD)	36
<i>Reformatages temporaires</i>	36
1) ÉCHELLE DE DÉTRESSE – K10	36
2) ÉCHELLE DE DÉTRESSE – K6	37
3) ÉCHELLE DE CHRONICITÉ DE LA DÉTRESSE ET DE L'AFFAIBLISSEMENT LIÉ À LA DÉTRESSE	37
ÉPISODE DÉPRESSIF MAJEUR (30 VD).....	39
ÉPISODE DÉPRESSIF MAJEUR – AU COURS DE LA VIE	41
1) DURÉE DU PIRE ÉPISODE DÉPRESSIF - VARIABLE GROUPEE	41
2) DURÉE DE L'ÉPISODE DÉPRESSIF LE PLUS RÉCENT - VARIABLE GROUPEE	42
3) DURÉE DU PREMIER ÉPISODE DÉPRESSIF - VARIABLE GROUPEE	43
4) DURÉE DE L'UNIQUE ÉPISODE DÉPRESSIF AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS – VARIABLE GROUPEE	44
5) DURÉE DU PREMIER DE PLUSIEURS ÉPISODES DÉPRESSIFS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS - VARIABLE GROUPEE	45
6) DURÉE DE L'ÉPISODE DÉPRESSIF LE PLUS LONG – VARIABLE GROUPEE	47
7) ÉPISODE DÉPRESSIF MAJEUR AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE A, PARTIE 1	48
8) ÉPISODE DÉPRESSIF MAJEUR AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE A, PARTIE 2	49
8a) Symptôme 1 – humeur dépressive	49
8b) Symptôme 2 – diminution de l'intérêt ou du plaisir pour la plupart des activités	49
8c) Symptôme 3 – perte ou gain de poids significatif ou changement de l'appétit	50
8d) Symptôme 4 – insomnie ou hypersomnie	51
8e) Symptôme 5 – agitation ou ralentissement psychomoteur	51
8f) Symptôme 6 – fatigue ou perte d'énergie	52
8g) Symptôme 7 – sentiment de dévalorisation	52
8h) Symptôme 8 – diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer	52
8i) Symptôme 9 – pensées de mort récurrentes	53
Évaluation du critère A, partie 2	53
9) ÉPISODE DÉPRESSIF MAJEUR AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE A (PARTIES 1 ET 2 COMBINÉES)	54
10) ÉPISODE DÉPRESSIF MAJEUR AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE C, PARTIE 1	54
11) ÉPISODE DÉPRESSIF MAJEUR AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE C, PARTIE 2	55
11a) Perturbation sociale et professionnelle	55
Évaluation du critère C, partie 2	56
12) ÉPISODE DÉPRESSIF MAJEUR AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE C, (PARTIES 1 ET 2 COMBINÉES)	56
13) ÉPISODE DÉPRESSIF MAJEUR AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE E, PARTIE 1	57
14) ÉPISODE DÉPRESSIF MAJEUR AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE E, PARTIE 2	57
14a) Pire épisode dépressif de plus de deux mois	58
14b) Plus récent épisode dépressif de plus de deux mois	58
14c) Premier épisode dépressif de plus de deux mois	59
14d) Un seul épisode dépressif de plus de deux mois au cours des 12 derniers mois	59
14e) Plus récent épisode dépressif de plus de deux mois au cours des 12 derniers mois	60
14f) Plus long épisode dépressif de plus de deux mois	60
Évaluation du critère E, partie 2	61
15) ÉPISODE DÉPRESSIF MAJEUR AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE E, PARTIE 3	61
15a) Perturbation sociale et professionnelle	61
15b) Altération du fonctionnement	62
15c) Préoccupations de dévalorisation	63
15d) Idées suicidaires	63
15e) Ralentissement psychomoteur	63
Évaluation du critère E, partie 3	64
16) ÉPISODE DÉPRESSIF MAJEUR AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE E (PARTIES 1, 2, ET 3 COMBINÉES)	65
17) ALGORITHME POUR UN ÉPISODE DÉPRESSIF MAJEUR AU COURS DE LA VIE	66
18) ÉPISODE DÉPRESSIF MAJEUR - ÂGE AU MOMENT DE L'APPARITION - VARIABLE GROUPEE	66
19) ÉPISODE DÉPRESSIF MAJEUR - ÂGE LORS DU PLUS RÉCENT - VARIABLE GROUPEE	67
20) ÉPISODE DÉPRESSIF MAJEUR - PERSISTANCE DE LA DÉPRESSION (EN ANNÉES) - VARIABLE GROUPEE	68

ÉPISODE DÉPRESSIF MAJEUR– 12 DERNIERS MOIS	68
21) ÉPISODE DÉPRESSIF MAJEUR AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS - CRITÈRE A.....	68
22) ÉPISODE DÉPRESSIF MAJEUR AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS - CRITÈRE B.....	69
23) ÉPISODE DÉPRESSIF AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS - CRITÈRE C.....	70
24) ALGORITHME POUR UN ÉPISODE DÉPRESSIF MAJEUR AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS	71
25) PENSÉES SUICIDAIRES AU COURS DE LA VIE.....	72
26) PENSÉES SUICIDAIRES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS	72
27) TENTATIVE DE SUICIDE AU COURS DE LA VIE	73
28) TENTATIVE DE SUICIDE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS	73
29) TROUBLE ATTRIBUABLE À L'ÉPISODE DÉPRESSIF MAJEUR – MOYENNE	74
30) INDICATEUR DU TROUBLE ATTRIBUABLE À L'ÉPISODE DÉPRESSIF MAJEUR	75
ÉPISODE DE MANIE (MANIE) (24 VD)	76
MANIE AU COURS DE LA VIE	78
1) DURÉE DU PIRE ÉPISODE MANIAQUE (EXCITÉ ET PLEIN D'ÉNERGIE) – VARIABLE GROUPEE	78
2) DURÉE DU PLUS RÉCENT ÉPISODE MANIAQUE (EXCITÉ ET PLEIN D'ÉNERGIE) – VARIABLE GROUPEE	79
3) DURÉE DU PIRE RÉCENT ÉPISODE MANIAQUE (IRRITABLE OU GRINCHEUX) – VARIABLE GROUPEE	81
4) DURÉE DU PLUS RÉCENT ÉPISODE MANIAQUE (IRRITABLE OU GRINCHEUX) – VARIABLE GROUPEE	82
5) DURÉE DU PREMIER ÉPISODE MANIAQUE – VARIABLE GROUPEE	84
6) DURÉE DU PLUS LONG ÉPISODE MANIAQUE – VARIABLE GROUPEE	85
7) MANIE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE A, PARTIE 1	86
8) MANIE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE A, PARTIE 2.....	87
8a) Variable temporaire– Durée du pire épisode maniaque (excité et plein d'énergie) en jours.....	87
8b) Variable temporaire – Durée du plus récent épisode maniaque (excité et plein d'énergie) en jours.....	88
8c) Variable temporaire – Durée du pire épisode maniaque (irritable ou grincheux) en jours	88
8d) Variable temporaire – Durée du plus récent épisode maniaque (irritable ou grincheux) en jours	89
8e) Variable temporaire – Durée du plus long épisode maniaque en jours.....	89
Évaluation du critère A, partie 2.....	90
9) MANIE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE A (PARTIES 1 ET 2 COMBINÉES)	90
10) MANIE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE B.....	91
10a) Symptôme 1 – augmentation de l'estime de soi ou idées de grandeur.....	91
10b) Symptôme 2 – réduction du besoin de sommeil.....	92
10c) Symptôme 3 – plus grande communicabilité que d'habitude ou désir de parler constamment.....	92
10d) Symptôme 4 – fuite des idées ou sensations subjectives que les pensées défilent	93
10e) Symptôme 5 – distractivité (p. ex., l'attention est trop facilement attirée par des stimulus extérieurs sans importance ou insignifiants).....	93
10f) Symptôme 6 – augmentation de l'activité orientée vers un but ou agitation psychomotrice	93
10g) Symptôme 7 – engagement excessif dans des activités agréables mais à potentiel élevé de conséquences dommageables.....	94
10h) Humeur irritable – détermine si l'humeur était uniquement irritable	94
Évaluation du critère B de manie au cours de la vie.....	95
11) MANIE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE D, PARTIE 1	95
11a) Perturbation sociale et professionnelle	95
Évaluation du critère D, partie 1 de manie au cours de la vie.....	96
12) MANIE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE D, PARTIE 2	97
13) MANIE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE D, PARTIE 3	97
14) MANIE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE D (PARTIES 1, 2 ET 3 COMBINÉES)	98
15) ALGORITHME POUR LA MANIE AU COURS DE LA VIE	98
16) MANIE – ÂGE AU MOMENT DE L'APPARITION - VARIABLE GROUPEE	99
Reformatages temporaires	99
17) MANIE – ÂGE LORS DU PLUS RÉCENT ÉPISODE - VARIABLE GROUPEE.....	100
18) MANIE - PERSISTANCE DE LA MANIE - VARIABLE GROUPEE	101
MANIE – DOUZE DERNIERS MOIS.....	101
19) MANIE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS - CRITÈRE A	101
20) MANIE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS - CRITÈRE B	102
21) MANIE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS - CRITÈRE C	103
22) ALGORITHME POUR LA MANIE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS	104

23)	TRouble ATTRIBUABLE À LA MANIE – MOYENNE	105
24)	INDICATEUR DU TROUBLE ATTRIBUABLE À LA MANIE	106
TROUBLE PANIQUE (19 VD)		107
ATTAQUE DE PANIQUE AU COURS DE LA VIE		109
1)	ATTAQUE DE PANIQUE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE A.....	109
2)	ATTAQUE DE PANIQUE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE B.....	109
	2a) Symptôme 1 – palpitations, battements de cœur ou accélération du rythme cardiaque	110
	2b) Symptôme 2 – transpiration.....	110
	2c) Symptôme 3 – frémissements ou tremblements	111
	2d) Symptôme 4 – sensation de souffle court	111
	2e) Symptôme 5 – sensation d'étouffement.....	111
	2f) Symptôme 6 – douleur ou gêne thoracique.....	112
	2g) Symptôme 7 – nausée ou gêne abdominale.....	112
	2h) Symptôme 8 – sensations de vertige, d'instabilité, de tête vide ou impression d'évanouissement.....	112
	2i) Symptôme 9 – déréalisation ou dépersonnalisation.....	113
	2j) Symptôme 10 – peur de perdre le contrôle de soi ou de devenir fou	113
	2k) Symptôme 11 – peur de mourir.....	113
	2l) Symptôme 12 – paresthésie.....	114
	2m) Symptôme 13 – frissons ou bouffées de chaleur.....	114
	2n) Symptôme 14 – bouche sèche.....	114
	Évaluation du critère B d'attaque de panique.....	114
3)	ATTAQUE DE PANIQUE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE C.....	115
4)	ALGORITHME POUR ATTAQUE DE PANIQUE AU COURS DE LA VIE	116
TROUBLE PANIQUE AU COURS DE LA VIE.....		117
5)	TROUBLE PANIQUE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE A, PARTIE 1.....	117
6)	TROUBLE PANIQUE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE A, PARTIE 2	117
	6a) Symptôme 1 – crainte persistante d'avoir d'autres attaques de panique	117
	6b) Symptôme 2 – préoccupations à propos des implications possibles de l'attaque ou de ses conséquences	118
	6c) Symptôme 3 – changement de comportement important en relation aux attaques.....	118
	Évaluation du critère A, partie 2 de trouble panique.....	119
7)	TROUBLE PANIQUE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE A (PARTIES 1 ET 2 COMBINÉES)	119
8)	ALGORITHME POUR LE TROUBLE PANIQUE AU COURS DE LA VIE	120
	Reformatages Temporaires.....	121
9)	TROUBLE PANIQUE – ÂGE AU MOMENT DE L'APPARITION - VARIABLE GROUPEE	121
10)	TROUBLE PANIQUE – ÂGE AU MOMENT DE L'APPARITION - VARIABLE GROUPEE	122
	Reformatages Temporaires.....	122
11)	TROUBLE PANIQUE – ÂGE LORS DE LA PLUS RÉCENTE ATTAQUE - VARIABLE GROUPEE	122
12)	TROUBLE PANIQUE – PERSISTANCE DU TROUBLE PANIQUE - VARIABLE GROUPEE	123
ATTAQUE DE PANIQUE – AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS		123
13)	ATTAQUE DE PANIQUE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS	123
14)	TROUBLE PANIQUE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS - CRITÈRE A	124
15)	TROUBLE PANIQUE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS - CRITÈRE B.....	125
16)	TROUBLE PANIQUE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS - CRITÈRE C	125
17)	ALGORITHME POUR UN TROUBLE PANIQUE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS.....	126
18)	TROUBLE ATTRIBUABLE AU TROUBLE PANIQUE – MOYENNE	127
19)	INDICATEUR DU TROUBLE ATTRIBUABLE AU TROUBLE PANIQUE	128
PHOBIE SOCIALE (21 VD).....		129
PHOBIE SOCIALE AU COURS DE LA VIE		131
1)	PHOBIE SOCIALE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE A, PARTIE 1	131
2)	PHOBIE SOCIALE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE A, PARTIE 2.....	132
3)	PHOBIE SOCIALE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE A (PARTIES 1 ET 2 COMBINÉES)	132
4)	PHOBIE SOCIALE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE B.....	133
5)	PHOBIE SOCIALE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE C.....	134
6)	PHOBIE SOCIALE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE D, PARTIE 1	134
7)	PHOBIE SOCIALE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE D, PARTIE 2	135

7a) Variable temporaire.....	135
7b) Symptômes d'anxiété ou de panique	135
Évaluation du critère D, partie 2 de la phobie sociale au cours de la vie	136
8) PHOBIE SOCIALE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE D (PARTIES 1 ET 2 COMBINÉES).....	137
9) PHOBIE SOCIALE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE E.....	137
9a) Perturbation sociale et professionnelle	137
Évaluation du critère E de la phobie sociale au cours de la vie	138
10) PHOBIE SOCIALE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE F, PARTIE 1.....	139
Reformatages temporaires	139
11) PHOBIE SOCIALE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE F, PARTIE 2.....	140
12) PHOBIE SOCIALE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE F (PARTIES 1 ET 2 COMBINÉES).....	141
13) ALGORITHME POUR LA PHOBIE SOCIALE AU COURS DE LA VIE.....	141
14) PHOBIE SOCIALE – ÂGE AU MOMENT DE L'APPARITION – VARIABLE GROUPEE	143
15) PHOBIE SOCIALE – ÂGE AU MOMENT DE L'ÉPISODE LE PLUS RÉCENT – VARIABLE GROUPEE	143
PHOBIE SOCIALE – AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS	144
16) PHOBIE SOCIALE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS - CRITÈRE A.....	144
17) PHOBIE SOCIALE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS - CRITÈRE B.....	144
18) PHOBIE SOCIALE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS - CRITÈRE C.....	145
19) ALGORITHME POUR LA PHOBIE SOCIALE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS	146
20) TROUBLE ATTRIBUABLE À LA PHOBIE SOCIALE – MOYENNE.....	147
21) INDICATEUR DE LA PERTURBATION ATTRIBUABLE À LA PHOBIE SOCIALE	148
AGORAPHOBIE (22 VD).....	149
AGORAPHOBIE AU COURS DE LA VIE	152
1) AGORAPHOBIE – DURÉE DE LA PLUS LONGUE PÉRIODE DURANT LAQUELLE LE RÉPONDANT A ÉTÉ INCAPABLE DE QUITTER SA MAISON – VARIABLE GROUPEE	152
2) AGORAPHOBIE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE A	153
3) AGORAPHOBIE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE B, PARTIE 1	154
4) AGORAPHOBIE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE B, PARTIE 2	154
5) AGORAPHOBIE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE B, PARTIE 3	155
6) AGORAPHOBIE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE B (PARTIES 1, 2 ET 3 COMBINÉES)	156
7) ALGORITHME POUR L'AGORAPHOBIE AU COURS DE LA VIE	156
AGORAPHOBIE AVEC SYMPTÔMES DE PANIQUE MAIS SANS TROUBLE DE PANIQUE AU COURS DE LA VIE	157
8) AGORAPHOBIE AVEC SYMPTÔMES DE PANIQUE MAIS SANS TROUBLE DE PANIQUE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE A, PARTIE 1.....	157
9) AGORAPHOBIE AVEC SYMPTÔMES DE PANIQUE MAIS SANS TROUBLE DE PANIQUE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE A, PARTIE 2.....	158
10) AGORAPHOBIE AVEC SYMPTÔMES DE PANIQUE MAIS SANS TROUBLE DE PANIQUE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE A (PARTIES 1 ET 2 COMBINÉES)	158
11) AGORAPHOBIE AVEC SYMPTÔMES DE PANIQUE MAIS SANS TROUBLE DE PANIQUE AU COURS DE LA VIE - CRITÈRE B.....	159
12) ALGORITHME POUR L'AGORAPHOBIE AVEC SYMPTÔMES DE PANIQUE MAIS SANS TROUBLE DE PANIQUE AU COURS DE LA VIE	159
13) AGORAPHOBIE – ÂGE AU MOMENT DE L'APPARITION – VARIABLE GROUPEE	160
14) AGORAPHOBIE – ÂGE AU MOMENT DE L'ÉPISODE LE PLUS RÉCENT – VARIABLE GROUPEE	161
15) AGORAPHOBIE – PERSISTANCE – VARIABLE GROUPEE	162
16) AGORAPHOBIE AVEC SYMPTÔMES DE PANIQUE MAIS SANS TROUBLE DE PANIQUE – ÂGE AU MOMENT DE L'APPARITION – VARIABLE GROUPEE	162
17) AGORAPHOBIE AVEC SYMPTÔMES DE PANIQUE MAIS SANS TROUBLE DE PANIQUE – ÂGE AU MOMENT DE L'ÉPISODE LE PLUS RÉCENT – VARIABLE GROUPEE.....	163
18) AGORAPHOBIE AVEC SYMPTÔMES DE PANIQUE MAIS SANS TROUBLE DE PANIQUE – PERSISTANCE – VARIABLE GROUPEE	163
AGORAPHOBIE – AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS	164
19) ALGORITHME POUR L'AGORAPHOBIE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS.....	164
20) ALGORITHME POUR L'AGORAPHOBIE AVEC SYMPTÔMES DE PANIQUE MAIS SANS TROUBLE DE PANIQUE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS	165
21) TROUBLE ATTRIBUABLE À L'AGORAPHOBIE – MOYENNE	166
22) INDICATEUR DU TROUBLE ATTRIBUABLE À L'AGORAPHOBIE	167

PROFILS DE SANTÉ MENTALE (9 VD)	168
1) DIAGNOSTIC AU COURS DE LA VIE – N'IMPORTE QUEL TROUBLE	168
2) DIAGNOSTIC AU COURS DE LA VIE – N'IMPORTE QUEL TROUBLE DE L'HUMEUR	168
3) DIAGNOSTIC AU COURS DE LA VIE – N'IMPORTE QUEL TROUBLE ANXIEUX	169
4) DIAGNOSTIC AU COURS DES 12 MOIS PRÉCÉDENTS – N'IMPORTE QUEL TROUBLE OU N'IMPORTE QUELLE DÉPENDANCE À UNE SUBSTANCE RETENUS	169
5) DIAGNOSTIC AU COURS DES 12 MOIS PRÉCÉDENTS – N'IMPORTE QUEL TROUBLE DE L'HUMEUR	170
6) DIAGNOSTIC AU COURS DES 12 MOIS PRÉCÉDENTS – N'IMPORTE QUEL TROUBLE ANXIEUX	170
7) DIAGNOSTIC AU COURS DES 12 MOIS PRÉCÉDENTS – N'IMPORTE QUELLE DÉPENDANCE À UNE SUBSTANCE	170
8) INDICATEUR DE LA PERTURBATION ATTRIBUABLE À N'IMPORTE QUEL TROUBLE OU N'IMPORTE QUELLE DÉPENDANCE À UNE SUBSTANCE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS	171
9) ÂGE AU MOMENT DE LA PREMIÈRE MANIFESTATION – N'IMPORTE QUEL TROUBLE RETENU - VARIABLE GROUPEE	172
CONSOMMATION D'ALCOOL (3 VD)	173
1) GENRE DE BUVEUR	173
2) CONSOMMATION HEBDOMADAIRE	173
3) MOYENNE QUOTIDIENNE DES CONSOMMATIONS D'ALCOOL - VARIABLE GROUPEE	174
DÉPENDANCE À L'ALCOOL/ABUS D'ALCOOL (4 VD)	175
<i>Reformatages temporaires</i>	175
1) ÉCHELLE DE DÉPENDANCE À L'ALCOOL (COTE DU QUESTIONNAIRE ABRÉGÉ) – 12 MOIS	176
2) PROBABILITÉ PRÉVUE POUR LES RÉPONDANTS (DÉPENDANCE À L'ALCOOL) – 12 MOIS	176
3) TROUBLE CAUSÉ PAR L'ALCOOL AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS – MOYENNE	177
4) INDICATEUR DU TROUBLE CAUSÉ PAR LA CONSOMMATION D'ALCOOL AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS	178
DROGUES ILLICITES (17 VD)	179
1) CONSOMMATION DE CANNABIS – AU COURS DE LA VIE (Y COMPRIS LA CONSOMMATION « JUSTE UNE FOIS »)	179
2) CONSOMMATION DE CANNABIS – AU COURS DE LA VIE (NON COMPRIS LA CONSOMMATION « JUSTE UNE FOIS »)	179
3) CONSOMMATION DE CANNABIS – AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS (NON COMPRIS LA CONSOMMATION « JUSTE UNE FOIS »)	180
4) CONSOMMATION DE COCAÏNE OU DE CRACK – AU COURS DE LA VIE	180
5) CONSOMMATION D'AMPHÉTAMINES (SPEED) – AU COURS DE LA VIE	180
6) CONSOMMATION DE MDMA (ECSTASY) – AU COURS DE LA VIE	181
7) CONSOMMATION D'HALLUCINOGENES, DE PCP OU DE LSD – AU COURS DE LA VIE	181
8) INHALATION DE COLLE, D'ESSENCE OU D'AUTRES SOLVANTS – AU COURS DE LA VIE	181
9) CONSOMMATION D'HÉROÏNE – AU COURS DE LA VIE	182
10) CONSOMMATION DE STÉROÏDES – AU COURS DE LA VIE	182
11) CONSOMMATION DE TOUTE DROGUE ILLICITE – AU COURS DE LA VIE (Y COMPRIS LA CONSOMMATION DE CANNABIS « JUSTE UNE FOIS »)	182
12) CONSOMMATION DE TOUTE DROGUE ILLICITE – AU COURS DE LA VIE (NON COMPRIS LA CONSOMMATION DE CANNABIS « JUSTE UNE FOIS »)	183
13) CONSOMMATION DE TOUTE DROGUE ILLICITE – AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS (Y COMPRIS LA CONSOMMATION DE CANNABIS « JUSTE UNE FOIS »)	184
14) CONSOMMATION DE TOUTE DROGUE ILLICITE – AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS (NON COMPRIS LA CONSOMMATION DE CANNABIS « JUSTE UNE FOIS »)	184
15) DÉPENDANCE AUX DROGUES ILLICITES – AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS	185
15a) Variable temporaire – Consommation de drogue en quantité plus importante ou pendant une période plus longue que prévu – Au cours des 12 derniers mois	185
15b) Variable temporaire – Symptômes de sevrage – Au cours des 12 derniers mois	186
Calcul de la valeur pour dépendance aux drogues illicites au cours des 12 derniers mois	187
16) TROUBLE CAUSÉ PAR LA CONSOMMATION DE DROGUES ILLICITES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS - MOYENNE	187
17) INDICATEUR DE PERTURBATION CAUSÉE PAR LA CONSOMMATION DE DROGUES ILLICITES – AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS	188
JEU PATHOLOGIQUE (4 VD)	189
<i>Reformatages temporaires</i>	189

1)	ACTIVITÉ DE JEU – JOUEUR VS. NON-JOUEUR	189
2)	INDICE DE GRAVITÉ DU JEU PATHOLOGIQUE (IGJP) – VERSION MODIFIÉE	190
3)	TYPE DE JOUEUR	191
4)	NOMBRE DE CATÉGORIES D'ACTIVITÉ DE JEU DANS LA LISTE UTILISÉE POUR CALCULER L'ICJE	192
	<i>Reformatages Temporaires</i>	192
TROUBLES ALIMENTAIRES (2 VD)		194
1)	COTE SUR L'ÉCHELLE DES ATTITUDES ALIMENTAIRES - MODIFIÉE	194
	<i>Reformatages temporaires</i>	194
2)	INDICATEUR DE RISQUE DE TROUBLES ALIMENTAIRES - MODIFIÉE	196
LIMITATION DES ACTIVITÉS (5 VD)		197
1)	CAUSE DU PROBLÈME DE SANTÉ - VARIABLE GROUPEE	197
2)	INCIDENCES DES PROBLÈMES DE SANTÉ	197
3)	PARTICIPATION ET LIMITATIONS D'ACTIVITÉS	198
4)	A BESOIN D'AIDE POUR CERTAINES TÂCHES	198
5)	DIFFICULTÉS DANS LES SITUATIONS SOCIALES	199
INCAPACITÉ AU COURS DES DEUX DERNIÈRES SEMAINES (5 VD).....		200
	<i>Reformatages temporaires</i>	200
1)	NOMBRE TOTAL DE JOURS D'INCAPACITÉ	200
2)	NOMBRE TOTAL DE JOURS D'ALIMENT À CAUSE D'UN PROBLÈME DE SANTÉ MENTALE	200
3)	NOMBRE TOTAL DE JOURS DE LIMITATION DES ACTIVITÉS À CAUSE D'UN PROBLÈME LIÉ À LA SANTÉ MENTALE	201
4)	NOMBRE TOTAL DE JOURS EXIGEANT UN EFFORT SUPPLÉMENTAIRE À CAUSE DE PROBLÈMES LIÉS À LA SANTÉ MENTALE ..	201
5)	NOMBRE TOTAL DE JOURNÉES D'INCAPACITÉ À CAUSE DE PROBLÈMES LIÉS À LA SANTÉ MENTALE.....	202
UTILISATION DES SERVICES DE SANTÉ (36 VD)		203
1)	DURÉE TOTALE DES HOSPITALISATIONS POUR DES PROBLÈMES RELIÉS AUX ÉMOTIONS, À LA SANTÉ MENTALE OU À LA CONSOMMATION D'ALCOOL OU DE DROGUES – AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS – VARIABLE GROUPEE	203
2)	CONSULTÉ UN PSYCHIATRE – CLINIQUE EXTERNE – VARIABLE GROUPEE	204
3)	CONSULTÉ UN PSYCHIATRE – AUTRE CLINIQUE – VARIABLE GROUPEE	205
4)	CONSULTÉ UN PSYCHIATRE – TRAVAIL, ÉCOLE, AUTRE ENDROIT – VARIABLE GROUPEE	205
5)	CONSULTÉ UN MÉDECIN DE FAMILLE – CLINIQUE EXTERNE – VARIABLE GROUPEE	205
6)	CONSULTÉ UN MÉDECIN DE FAMILLE – AUTRE CLINIQUE – VARIABLE GROUPEE	206
7)	CONSULTÉ UN MÉDECIN DE FAMILLE – TRAVAIL, ÉCOLE, AUTRE ENDROIT – VARIABLE GROUPEE	206
8)	CONSULTÉ UN AUTRE MÉDECIN – CLINIQUE EXTERNE – VARIABLE GROUPEE	207
9)	CONSULTÉ UN AUTRE MÉDECIN – AUTRE CLINIQUE – VARIABLE GROUPEE	207
10)	CONSULTÉ UN AUTRE MÉDECIN – TRAVAIL, ÉCOLE, AUTRE ENDROIT – VARIABLE GROUPEE.....	208
11)	CONSULTÉ UN PSYCHOLOGUE – CLINIQUE EXTERNE – VARIABLE GROUPEE.....	208
12)	CONSULTÉ UN PSYCHOLOGUE – AUTRE CLINIQUE – VARIABLE GROUPEE	208
13)	CONSULTÉ UN PSYCHOLOGUE – TRAVAIL, ÉCOLE, AUTRE ENDROIT – VARIABLE GROUPEE.....	209
14)	CONSULTÉ UNE INFIRMIÈRE – CLINIQUE EXTERNE – VARIABLE GROUPEE.....	209
15)	CONSULTÉ UNE INFIRMIÈRE – AUTRE CLINIQUE – VARIABLE GROUPEE	210
16)	CONSULTÉ UNE INFIRMIÈRE – TRAVAIL, ÉCOLE, AUTRE ENDROIT – VARIABLE GROUPEE.....	210
17)	CONSULTÉ UN TRAVAILLEUR SOCIAL – CLINIQUE EXTERNE – VARIABLE GROUPEE	211
18)	CONSULTÉ UN TRAVAILLEUR SOCIAL – AUTRE CLINIQUE – VARIABLE GROUPEE	211
19)	CONSULTÉ UN TRAVAILLEUR SOCIAL – TRAVAIL, ÉCOLE, AUTRE ENDROIT – VARIABLE GROUPEE.....	211
20)	CONSULTÉ UN CONSEILLER RELIGIEUX – CLINIQUE EXTERNE – VARIABLE GROUPEE	212
21)	CONSULTÉ UN CONSEILLER RELIGIEUX – AUTRE CLINIQUE – VARIABLE GROUPEE.....	212
22)	CONSULTÉ UN CONSEILLER RELIGIEUX – TRAVAIL, ÉCOLE, AUTRE ENDROIT – VARIABLE GROUPEE	213
23)	CONSULTÉ UN AUTRE PROFESSIONNEL – CLINIQUE EXTERNE – VARIABLE GROUPEE	213
24)	CONSULTÉ UN AUTRE PROFESSIONNEL – AUTRE CLINIQUE – VARIABLE GROUPEE.....	214
25)	CONSULTÉ UN AUTRE PROFESSIONNEL – TRAVAIL, ÉCOLE, AUTRE ENDROIT – VARIABLE GROUPEE	214
26)	INDICATEUR SIGNALANT SI LA PERSONNE A DÉJÀ ÉTÉ HOSPITALISÉE PENDANT UNE NUIT OU PLUS AU COURS DE SA VIE POUR DES PROBLÈMES RELIÉS AUX ÉMOTIONS, À LA SANTÉ MENTALE OU À LA CONSOMMATION D'ALCOOL OU DE DROGUE	215

27)	NOMBRE TOTAL DE JOURS PASSÉS À L'HÔPITAL AU COURS DE LA VIE POUR DES PROBLÈMES RELIÉS AUX ÉMOTIONS, À LA SANTÉ MENTALE OU À LA CONSOMMATION D'ALCOOL OU DE DROGUE - VARIABLE GROUPEE	215
27a)	Variable temporaire - Répondants hospitalisés une seule fois au cours de la vie	215
27b)	Variable temporaire - Répondants hospitalisés plus d'une fois au cours de la vie	216
	Évaluation du nombre total de jours passés à l'hôpital pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue	217
28)	INDICATEUR D'HOSPITALISATION AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS POUR DES PROBLÈMES RELIÉS AUX ÉMOTIONS, À LA SANTÉ MENTALE OU À LA CONSOMMATION D'ALCOOL ET DE DROGUE	218
29)	INDICATEUR DE CONSULTATION, AU COURS DE LA VIE, DE PROFESSIONNEL (N'IMPORTE QUEL) AU SUJET DE PROBLÈMES RELIÉS AUX ÉMOTIONS, À LA SANTÉ MENTALE OU À LA CONSOMMATION D'ALCOOL OU DE DROGUE	218
30)	INDICATEUR D'UTILISATION DE TOUTE RESSOURCE POUR DES PROBLÈMES RELIÉS AUX ÉMOTIONS, À LA SANTÉ MENTALE OU À LA CONSOMMATION D'ALCOOL OU DE DROGUE AU COURS DE LA VIE	219
31)	NOMBRE DE CATÉGORIES DE RESSOURCES UTILISÉES, AU COURS DE LA VIE, POUR DES PROBLÈMES RELIÉS AUX ÉMOTIONS, À LA SANTÉ MENTALE OU À LA CONSOMMATION D'ALCOOL OU DE DROGUE	219
	Reformatages temporaires	219
32)	INDICATEUR D'UTILISATION DE TOUTE RESSOURCE POUR DES PROBLÈMES RELIÉS AUX ÉMOTIONS, À LA SANTÉ MENTALE OU À LA CONSOMMATION D'ALCOOL OU DE DROGUE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS	220
33)	NOMBRE DE CATÉGORIES DE RESSOURCES UTILISÉES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS POUR DES PROBLÈMES RELIÉS AUX ÉMOTIONS, À LA SANTÉ MENTALE OU À LA CONSOMMATION D'ALCOOL OU DE DROGUE	221
	Reformatages temporaires	221
34)	INDICATEUR SIGNALANT DES OBSTACLES À L'OBTENTION DE SERVICES DE SANTÉ MENTALE RELATIFS À L'ACCESSIBILITÉ	223
35)	INDICATEUR SIGNALANT LES OBSTACLES À L'OBTENTION DE SERVICES DE SOINS DE SANTÉ MENTALE RELATIFS À L'ACCEPTABILITÉ	223
36)	INDICATEUR SIGNALANT DES OBSTACLES À L'OBTENTION DE SERVICES DE SANTÉ MENTALE RELATIFS À LA DISPONIBILITÉ	224
CODES DE MÉDICAMENTS (1 VD)		225
SOUTIEN SOCIAL (4 VD)		230
	Reformatages temporaires	230
1)	SOUTIEN CONCRET – SOUS-ÉCHELLE MOS	230
2)	AFFECTION – SOUS ÉCHELLE MOS	231
3)	INTÉRACTION SOCIALE POSITIVE – SOUS-ÉCHELLE MOS	231
4)	SOUTIEN ÉMOTIONNEL OU INFORMATIONNEL – SOUS-ÉCHELLE MOS	232
CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES (4 VD)		233
1)	PAYS DE NAISSANCE - VARIABLE GROUPEE	233
2)	INDICATEUR D'IMMIGRATION	233
3)	NOMBRE D'ANNÉES AU CANADA DEPUIS L'IMMIGRATION - VARIABLE GROUPEE	233
4)	LANGUE(S) PARLÉE(S) PAR LE RÉPONDANT - VARIABLE GROUPEE	234
POPULATION ACTIVE (8 VD)		236
1)	SITUATION EN REGARD DE L'ACTIVITÉ LA SEMAINE DERNIÈRE (QUESTIONNAIRE ABRÉGÉ)	236
2)	SITUATION EN REGARD DE L'ACTIVITÉ LA SEMAINE DERNIÈRE (QUESTIONNAIRE COMPLET)	236
3)	RAISON PRINCIPALE POUR NE PAS TRAVAILLER AU COURS DE LA SEMAINE DERNIÈRE - VARIABLE GROUPEE	237
4)	EMPLOIS MULTIPLES	237
5)	LE STATUT DE TRAVAIL AUTONOME - ENTREPRISE OU EMPLOI PRINCIPAL - VARIABLE GROUPEE	238
6)	NOMBRE TOTAL D'HEURES HABITUELLEMENT TRAVAILLÉES PAR SEMAINE	238
7)	EMPLOI À TEMPS PLEIN/TEMPS PARTIEL (POUR LE NOMBRE TOTAL D'HEURES HABITUELLES)	239
8)	SITUATION D'EMPLOI AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE - VARIABLE GROUPEE	239
STRESS AU TRAVAIL (6 VD)		240
	Reformatages temporaires	240
1)	ÉCHELLE DE L'INDICE DU STRESS AU TRAVAIL – LATITUDE DE DÉCISION : DISCRÉTION RELATIVE À LA COMPÉTENCE (APTITUDES REQUISES)	240
2)	ÉCHELLE DE L'INDICE DU STRESS AU TRAVAIL – LATITUDE DE DÉCISION : POUVOIR DÉCISIONNEL	241

3)	ÉCHELLE DE L'INDICE DU STRESS AU TRAVAIL – DEMANDES PSYCHOLOGIQUES	241
4)	ÉCHELLE DE L'INDICE DU STRESS AU TRAVAIL – MENACE DE PERDRE SON EMPLOI	241
5)	ÉCHELLE DE L'INDICE DU STRESS AU TRAVAIL – EXIGENCES PHYSIQUES	242
6)	ÉCHELLE DE L'INDICE DU STRESS AU TRAVAIL – SOUTIEN SOCIAL	242
REVENU (6 VD)		243
1)	REVENU TOTAL DU MÉNAGE, PRINCIPALE SOURCE - VARIABLE GROUPEE	243
2)	REVENU TOTAL DU MÉNAGE, DEUX CATÉGORIES	243
3)	REVENU TOTAL DU MÉNAGE, QUATRE CATÉGORIES	244
4)	REVENU TOTAL DU MÉNAGE, CINQ CATÉGORIES	245
5)	REVENU TOTAL DU MÉNAGE, TOUTES PROVENANCES - VARIABLE GROUPEE	246
6)	REVENU PERSONNEL, TOUTES PROVENANCES - VARIABLE GROUPEE	246

Variables géographiques (1 VD)

1) Région socio-sanitaire – Variable groupée

Nom de la variable : GEOBGHR4

Basée sur : GEOB_HR4

Description : Cette variable est un nombre à quatre chiffres qui identifie les régions sociosanitaires infraprovinciales et regroupe les régions sociosanitaires de la Nouvelle-Écosse.

Valeur de GEOBGHR4	Condition(s)	Explication
1201	GEOB_HR4 = 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206	Regroupement des régions sociosanitaires de la Nouvelle-Écosse
Valeur de GEOB_HR4	GEOB_HR4 = GEOBGHR4	Valeur de GEOB_HR4

Variables concernant les enregistrements de logements et de ménages (5 VDs)

1) Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage – Variable groupée

Nom de la variable : DHHBGL12

Basée sur : PERSONID, DHHB_AGE

Description : La variable suivante indique s'il y a des personnes qui vivent dans un ménage et qui sont âgées de moins de 12 ans.

Valeur de DHHBGL12	Condition(s)	Explication
0	DHHBDL12 = 0	Le ménage ne compte aucune personne de moins de 12 ans.
1	DHHBDL12 => 1	Le ménage compte au moins une personne de moins de 12 ans.

2) Nombre de personnes de cinq ans ou moins dans le ménage – Variable groupée

Nom de la variable : DHHBGLE5

Basée sur : PERSONID, DHHB_AGE

Description : La variable suivante indique s'il y a des personnes de moins de 6 ans ou non comme membre d'un ménage.

Valeur de DHHBGLE5	Condition(s)	Explication
0	DHHBDLE5 = aucune	Le ménage ne compte aucune personne de moins de 6 ans.
1	DHHBDLE5 = 1 ou plus	Le ménage compte au moins une personne de moins de 6 ans.

3) Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - Variable groupée

Nom de la variable : DHHBG611

Basée sur : PERSONID, DHHB_AGE

Description : La variable suivante indique s'il y a des personnes qui vivent dans un ménage dont l'âge se situe entre 6 et 11 ans.

Valeur de DHHBGL12	Condition(s)	Explication
0	DHHBDL611 = 0	Le ménage ne compte aucune personne de 6 à 11 ans.
1	DHHBDL611 => 1	Le ménage compte au moins une personne de 6 à 11 ans.

4) Situation dans la famille économique (type de ménage)

Nom de la variable : DHHBDECF

Basée sur : RE_REL pour toutes PERSONID dans SAMPLEID, DHHB_AGE, DHHB_SEX, DHHBDHSZ

Description : Cette variable indique les liens familiaux au sein du ménage est recueillie au moyen d'un ensemble de codes de liens qui définissent un lien entre chaque membre d'un ménage. Tous les liens dans chaque échantillon (les rapports que chaque personne dans un ménage entretient avec les autres membres du ménage) sont utilisés dans le calcul de cette variable. La variable se fonde sur l'âge et le lien déclarés de chaque personne par rapport aux autres membres du ménage. La matrice des codes de liens ne figure pas dans le fichier maître.

Reformatages temporaires

Reformatage		Explication
CODES DES LIENS DVECF94 RELATIONSHIP CODES: (*d'après le fichier des liens)		Codes des liens utilisés.
CODES A0 Conjoint/conjointe B0 Conjoint de fait C0 Conjoint de même sexe D1 Père/mère biologique D2 Père/mère par alliance D3 Père/mère adoptif E1 Fille/fils biologique E2 Beau-fils/belle-fille E3 Fils/fille adoptée F1 Sœur/frère F2 Demi-sœur/demi-frère F3 Demi-sœur/demi-frère par alliance F4 Sœur/frère adopté F5 Sœur/frère de famille d'accueil G0 Parent de famille d'accueil H0 Enfant en famille d'accueil I0 Grands-parents J0 Petits-enfants K0 Beaux-parents L0 Autre lien Y1 Célibataire Z0 Aucun lien	CATÉGORIE	
A=(Parent) L=(Autre) M=(Enfant) X=(Conjoint) Y=(Célibataire) Z=(Non déclaré)	D1, D2, D3 F1, F2, F3, F4, F5*, G0*, H0*, I0, J0, K0, L0, Z0 E1, E2, E3 (trié selon l'âge) A0, B0, C0 Y1 ND	Nouveaux codes temporaires pour comprimer les liens.

* Tous les liens d'une famille d'accueil (sœur/frère, parent ou enfant) ont été codés de nouveau sous Autre lien.

Valeur de DHHBDECF	Condition(s)	Explication
ND	Tout RE_REL = Z	Non déclaré
1	DHHBDHSZ = 1	Personne sans lien vivant seule Personne sans lien. Taille du ménage = 1.
2	Tout RE_REL pour tous les PERSONID dans SAMPLEID dans (L,Y)	Personne sans lien vivant avec d'autres. Personnes sans lien vivant ensemble. Il ne peut y avoir aucune relation matrimoniale, d'union de fait ou parentale, mais d'autres liens, comme des liens fraternels, sont permis.

3	DHHBDHSZ = 2 et RE_REL pour les deux PERSONID dans SAMPLEID = X	Couple seul Marié ou en union de fait, sans enfants à charge. Aucun autre lien n'est permis. Taille du ménage = 2.
4	DHHBDHSZ > 2 et au moins deux PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir un RE_REL = X et RE_REL pour tous les PERSONID dans SAMPLEID <> A et M	Couple sans enfants à charge, autres Marié ou en union de fait, sans enfants à charge. Il ne peut y avoir aucun lien de parent/enfants. D'autres liens sont permis.
5	DHHBDHSZ > 2 et au moins deux PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir un RE_REL = X et au moins un doit avoir un RE_REL = A. Tous les autres PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir RE_REL = M et de ceux-là au moins un est DHHB_AGE < 25	Couple avec enfant(s) à charge de moins de 25 ans Couple marié ou en union de fait dont au moins l'un des partenaires est le parent de l'enfant à charge. Aucun autre lien n'est permis.
6	Au moins deux PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir un RE_REL = X et au moins un de ceux-là doit avoir un RE_REL = A. Au moins un autre PERSONID dans SAMPLEID doit avoir un RE_REL = M avec le PERSONID ci- dessus et de ceux-là au moins un est DHHB_AGE < 25	Couple avec enfant(s) de moins de 25 ans, autres Au moins l'un des partenaires doit être le parent d'un enfant de moins de 25 ans vivant dans le ménage. D'autres liens sont permis.
7	DHHBDHSZ > 2 et au moins deux PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir un RE_REL = X et au moins un de ceux-là doit avoir un RE_REL = A. Tous les autres PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir RE_REL = M et de ceux-là DHHB_AGE >= 25	Couple dont tous les enfants ont 25 ans et plus Couple marié ou en union de fait dont tous les enfants ont 25 ans et plus. Aucun autre lien n'est permis.
8	DHHBDHSZ > 2 et au moins deux PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir un RE_REL = X et au moins un de ceux-là doit avoir un RE_REL = A. Au moins un autre PERSONID dans SAMPLEID doit avoir RE_REL = M avec les PERSONID ci- dessus et de ceux-ci DHHB_AGE >= 25	Couple dont tous les enfants ont 25 ans et plus, autres Couple marié ou en union de fait dont tous les enfants ont 25 ans et plus. D'autres liens sont permis.

9	DHHBDHSZ > 1 et un PERSONID dans SAMPLEID doit avoir RE_REL = A et DHHB_SEX = F. Tous les autres PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir RE_REL = M et de ceux-là au moins un DHHB_AGE < 25	Mère seule avec enfant(s) de moins de 25 ans Un enfant doit avoir moins de 25 ans. Aucun autre lien n'est permis.
10	DHHBDHSZ > 1 et un PERSONID dans SAMPLEID doit avoir RE_REL = A et DHHB_SEX = F. Au moins un autre PERSONID dans SAMPLEID doit avoir RE_REL = M avec le PERSONID ci-dessus et de ceux-là au moins un DHHB_AGE < 25.	Mère seule avec enfant(s) de moins de 25 ans, autres Un enfant doit avoir moins de 25 ans. D'autres liens sont permis.
11	DHHBDHSZ > 1 et un PERSONID dans SAMPLEID doit avoir RE_REL = A et DHHB_SEX = F. Tous les autres PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir RE_REL = M et de ceux-là DHHB_AGE >= 25	Mère seule dont tous les enfants ont 25 ans et plus Tous les enfants doivent avoir 25 ans et plus. Aucun autre lien n'est permis.
12	DHHBDHSZ > 1 et un PERSONID dans SAMPLEID doit avoir RE_REL = A et DHHB_SEX = F. Au moins un autre PERSONID dans SAMPLEID doit avoir RE_REL = M avec le PERSONID ci-dessus et de ceux-là DHHB_AGE >= 25.	Mère seule dont tous les enfants ont 25 ans et plus, autres. Tous les enfants doivent avoir 25 ans et plus. D'autres liens sont permis.
13	DHHBDHSZ > 1 et un PERSONID dans SAMPLEID doit avoir RE_REL = A et DHHB_SEX = M. Tous les autres PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir RE_REL = M et de ceux-là au moins un DHHB_AGE < 25	Père seul avec enfant(s) de moins de 25 ans. Un enfant doit avoir moins de 25 ans. Aucun autre lien n'est permis.
14	DHHBDHSZ > 1 et un PERSONID dans SAMPLEID doit avoir RE_REL = A et DHHB_SEX = M. Au moins un autre PERSONID dans SAMPLEID doit avoir RE_REL = M avec le PERSONID ci-dessus et de ceux-là au moins un DHHB_AGE < 25.	Père seul avec enfant(s) de moins de 25 ans, autres Un enfant doit avoir moins de 25 ans. D'autres liens sont permis.
15	DHHBDHSZ > 1 et un PERSONID dans SAMPLEID doit avoir RE_REL = A et DHHB_SEX = M. Tous les autres PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir RE_REL = M et de ceux-là DHHB_AGE >= 25	Père seul dont tous les enfants ont 25 ans et plus Tous les enfants doivent avoir 25 ans et plus. Aucun autre lien n'est permis.

16	DHHBDHSZ > 1 et un PERSONID dans SAMPLEID doit avoir RE_REL = A et DHHB_SEX = M. Au moins un autre PERSONID dans SAMPLEID doit avoir RE_REL = M avec le PERSONID ci-dessus et de ceux-là DHHB_AGE >= 25.	Père seul dont tous les enfants ont 25 ans et plus, autres Tous les enfants doivent avoir 25 ans et plus. D'autres liens sont permis.
17	Autre	Autres types de famille Tous les autres types de ménage.

5) Modalités de vie du répondant sélectionné – Variable groupée

Nom de la variable : DHHBGLVG

Basée sur : RE_REL du répondant sélectionné seulement

Description : Cette variable décrit les liens familiaux qui existent entre le répondant sélectionné et le reste des membres de son ménage est recueillie au moyen d'un ensemble de codes de liens qui établissent un lien entre chaque personne du ménage. Toutes les relations avec le répondant sélectionné dans chaque échantillon (la relation qu'entretient le répondant sélectionné avec tous les autres membres du ménage) sont utilisées dans le calcul de cette variable.

Certaines valeurs ont été regroupées, tel qu'indiqué au tableau suivant :

Reformatages temporaires

Reformatage		Explication
CODES DES LIENS : (*d'après le fichier des liens)		Codes des liens utilisés.
CODES	CATÉGORIE	
A0	Conjoint/conjointe	
B0	Conjoint de fait	
C0	Conjoint de même sexe	
D1	Père/mère biologique	
D2	Père/mère par alliance	
D3	Père/mère adoptif	
E1	Fille/fils biologique	
E2	Beau-fils/belle-fille	
E3	Fils/fille adoptée	
F1	Sœur/frère	
F2	Demi-sœur/demi-frère	
F3	Demi-sœur/demi-frère par alliance	
F4	Sœur/frère adopté	
F5	Sœur/frère de famille d'accueil	
G0	Parent de famille d'accueil	
H0	Enfant en famille d'accueil	
I0	Grands-parents	
J0	Petits-enfants	
K0	Beaux-parents	
L0	Autre lien	
Y1	Célibataire	
Z0	Aucun lien	
A1=(Parent)	D1, D2, D3	Nouveaux codes temporaires pour comprimer les liens.
B1=(Enfant)	E1, E2, E3	
C1=(Frère/sœur)	F1, F2, F3, F4	
K1=(Autre lien de parenté)	I0, J0, K0, L0	
L1=(Aucun lien de parenté)	F5*, G0*, H0*, Z0	
X1=(Conjoint/conjointe)	A0, B0, C0	
Z1=(Non déclaré)	ND	

* Tous les liens d'une famille d'accueil (sœur/frère, parent ou enfant) ont été codés de nouveau sous Aucun lien.

Valeur de DHHBGLVG	Condition(s)	Explication
1	DHHBDHSZ = 1	Personne sans lien vivant seule Le répondant sélectionné vit seul. Taille du ménage = 1.
2	Tous les RE_REL <> X1 et A1	Personne sans lien vivant avec d'autres Le répondant sélectionné vit avec d'autres personnes. Il ne peut entretenir aucun lien matrimonial, d'union de fait ou parental, mais d'autres liens, tels que des liens fraternels, sont permis.
3	DHHBDHSZ = 2 et RE_REL = X1	Personne vivant avec un(e) conjoint(e)/partenaire Le répondant sélectionné vit avec un(e) conjoint(e)/partenaire uniquement. Taille du ménage = 2.
4	DHHBDHSZ > 2 et un RE_REL = X1 et tous les autres RE_REL = A1	Parent vivant avec un(e) conjoint(e)/partenaire et des enfants Le répondant sélectionné vit avec un(e) conjoint(e)/partenaire et un ou des enfants.
5	Tous les RE_REL = A1	Parent seul vivant avec enfant(s) Le répondant sélectionné vit avec un ou des enfants. Aucun autre lien n'est permis.
6	(DHHBDHSZ = 2 et RE_REL = B1) ou (DHHBDHSZ > 2 et une RE_REL = B1 et tous les autres RE_REL = C1)	Enfant vivant avec un seul parent, avec ou sans d'autres enfants
7	(DHHBDHSZ = 3 et All RE_REL = B1) ou (DHHBDHSZ > 3 et Two RE_REL = B1 et tous les autres RE_REL = C1)	Enfant vivant avec deux parents, avec ou sans d'autres enfants
8	Autre	Autres Le répondant sélectionné vit dans un ménage dont la composition n'est pas classée ici.
ND	RE_REL = Z1	Non déclaré

Variables sur le niveau de scolarité (4 VD)

1) Plus haut niveau de scolarité – du répondant, 10 niveaux

Nom de la variable : EDUBDR10

Basée sur : EDUB_1, EDUB_2, EDUB_3, EDUB_4

Description : La variable décrit le plus haut niveau de scolarité atteint par le répondant.

Valeur de EDUBDR10	Condition(s)	Explication
1	EDUB_1 = 1 et EDUB_3 = 2	Huitième année ou moins (Québec : deuxième secondaire ou moins)
2	EDUB_1 = 2 et EDUB_3 = 2	Neuvième ou dixième année (QC : troisième ou quatrième secondaire; TN : première année du secondaire)
3	EDUB_1 = 3 et EDUB_2 = 2 et EDUB_3 = 2	Onzième à treizième années (QC : cinquième secondaire; TN : deuxième à quatrième années du secondaire)
4	EDUB_2 = 1 et EDUB_3 = 2	Diplôme d'études secondaires, aucune étude postsecondaire
5	EDUB_4 = 1	Études postsecondaires partielles
6	EDUB_4 = 2	Certificat commercial ou diplôme d'une école de métiers ou formation d'apprenti
7	EDUB_4 = 3	Diplôme ou certificat d'un collège communautaire, CEGEP, école de nursing, etc.
8	EDUB_4 = 4	Certificat universitaire inférieur au baccalauréat
9	EDUB_4 = 5	Baccalauréat
10	EDUB_4 = 6	Grade/certificat d'études supérieures
ND	[(EDUB_1 = NSP, R, ND) et EDUB_2 = 2] ou (EDUB_2 = NSP, R, ND) ou (EDUB_3 = NSP, R, ND) ou (EDUB_4 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

2) Plus haut niveau de scolarité – répondant, 4 niveaux

Nom de la variable : EDUBDR04

Basée sur : EDUB_1, EDUB_2, EDUB_3, EDUB_4

Description : La variable décrit le plus haut niveau de scolarité atteint par le répondant.

Valeur de EDUBDR04	Condition(s)	Explication
1	[(EDUB_1 = 1, 2) ou EDUB_2 = 2] et EDUB_3 = 2	Études secondaires partielles
2	EDUB_2 = 1 et EDUB_3 = 2	Diplôme d'études secondaires, aucune étude postsecondaire
3	EDUB_4 = 1	Études postsecondaires partielles
4	2 <= EDUB_4 <= 6	Grade/diplôme d'études postsecondaires

ND	(EDUB_2 = NSP, R, ND) ou (EDUB_3 = NSP, R, ND) ou (EDUB_4 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
----	---	--

3) Plus haut niveau de scolarité – ménage, 10 niveaux

Nom de la variable : EDUBDH10

Basée sur : EDUBDR10 pour chaque membre du ménage.

Description : La variable décrit le plus haut niveau de scolarité atteint par tous les membres du ménage.

Spécifications techniques : Établir temporairement EDUBDR10 pour chaque membre du ménage (tous PERSONID dans SAMPLEID). Comparer les valeurs de EDUBDR10 dans le ménage et donner la valeur supérieure. Si un PERSONID a EDUBDR10 de ND (non déclaré), donner ND. Si tous les EDUBDR10 sont SO (sans objet), alors donne SO.

Valeur de EDUBDH10	Condition(s)	Explication
1	EDUB_1 = 1 et EDUB_3 = 2	Huitième année ou moins (Québec : deuxième secondaire ou moins)
2	EDUB_1 = 2 et EDUB_3 = 2	Neuvième ou dixième année (QC : troisième ou quatrième secondaire; TN : première année du secondaire)
3	EDUB_1 = 3 et EDUB_2 = 2 et EDUB_3 = 2	Onzième à treizième années (QC : cinquième secondaire; TN : deuxième à quatrième années du secondaire)
4	EDUB_2 = 1 et EDUB_3 = 2	Diplôme d'études secondaires, aucune étude postsecondaire
5	EDUB_4 = 1	Études postsecondaires partielles
6	EDUB_4 = 2	Certificat commercial ou diplôme d'une école de métiers ou formation d'apprenti
7	EDUB_4 = 3	Diplôme ou certificat d'un collège communautaire, CEGEP, école de nursing, etc.
8	EDUB_4 = 4	Certificat universitaire inférieur au baccalauréat
9	EDUB_4 = 5	Baccalauréat
10	EDUB_4 = 6	Grade/certificat d'études supérieures
ND	[(EDUB_1 = NSP, R, ND) et EDUB_2 = 2] ou (EDUB_2 = NSP, R, ND) ou (EDUB_3 = NSP, R, ND) ou (EDUB_4 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

4) Plus haut niveau de scolarité – ménage, 4 niveaux

Nom de la variable : EDUBDH04

Basée sur : EDUBDR04 pour chaque membre du ménage.

Description : La variable décrit le plus haut niveau de scolarité atteint par tous les membres du ménage.

Spécifications techniques : Établir temporairement EDUBDR04 pour chaque membre du ménage (tous PERSONID dans SAMPLEID). Comparer ces valeurs de EDUBDR04 dans le ménage et donner la valeur supérieure. Si un PERSONID a EDUBDR04 de ND (non déclaré), donner ND. Si tous les EDUBDR04 sont SO (sans objet), alors donne SO.

Valeur de EDUBDH04	Condition(s)	Explication
1	[(EDUB_1 = 1, 2) ou EDUB_2 = 2] et EDUB_3 = 2	Études secondaires partielles
2	EDUB_2 = 1 et EDUB_3 = 2	Diplôme d'études secondaires, aucune étude postsecondaire
3	EDUB_4 = 1	Études postsecondaires partielles
4	2 <= EDUB_4 <= 6	Grade/diplôme d'études postsecondaires
ND	(EDUB_2 = NSP, R, ND) ou (EDUB_3 = NSP, R, ND) ou (EDUB_4 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

État de santé général (1 VD)

1) Autoévaluation de la santé (antérieurement Indice de la description de l'état de santé)

Nom de la variable : GENBDHDI

Basée sur : GENB_01

Description : La variable décrit l'état de santé du répondant d'après son propre jugement. Une cote élevée indique qu'il a évalué positivement son propre état de santé.

Valeur de GENBDHDI	Condition(s)	Explication
ND	GENB_01 > 6	Inconnue
0	GENB_01 = 5	Mauvaise
1	GENB_01 = 4	Passable
2	GENB_01 = 3	Bonne
3	GENB_01 = 2	Très bonne
4	GENB_01 = 1	Excellente

Filtrage des répondants en fonction des troubles (9 VD)

Cette enquête évalue cinq troubles mentaux : l'épisode dépressif majeur, l'épisode de manie, la phobie sociale, le trouble panique et l'agoraphobie. Afin de réduire le fardeau de réponse, les modules sur les troubles mentaux sont précédés d'une « section-filtre » qui comprend des « questions-filtres » correspondant à chacun de ces troubles. Les répondants qui ont fourni des réponses négatives aux « questions-filtres » ne se sont pas fait poser la liste complète des questions associées aux modules correspondants. Ces répondants ont été exclus du ou des modules en question sur la base de leurs réponses aux « questions-filtres » puis, en conséquence, ont été classés comme ne répondant pas aux critères du ou des troubles en question. Les variables créées ici indiquent si le répondant, sur la base de ses réponses aux « questions-filtres », a été dirigé ou non vers chacun de ces modules sur les troubles de santé mentale. En plus de ces « questions-filtres », il y a plusieurs questions qui évaluent l'état de santé général du répondant ainsi que sa satisfaction à l'égard de la vie.

1) Satisfaction face à la vie

Nom de la variable : SCRBDSAT

Basée sur : SCRB_01

Description : Cette variable décrit la satisfaction du répondant face à la vie en général. Des scores plus élevés signalent une plus grande satisfaction.

Valeur de SCRBDSAT	Condition(s)	Explication
1	SCRB_01 = 5	Très insatisfait
2	SCRB_01 = 4	Insatisfait
3	SCRB_01 = 3	Ni satisfait ni insatisfait
4	SCRB_01 = 2	Satisfait
5	SCRB_01 = 1	Très satisfait
ND	(SCRB_01 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

2) Autoévaluation de la santé physique

Nom de la variable : SCRBDPHY

Basée sur : SCRB_081

Description : Cette variable décrit la santé physique du répondant selon ses propres déclarations. Des scores plus élevés signalent une meilleure santé.

Valeur de SCRBDPHY	Condition(s)	Explication
0	SCRB_081 = 5	Mauvaise
1	SCRB_081 = 4	Passable
2	SCRB_081 = 3	Bonne
3	SCRB_081 = 2	Très bonne
4	SCRB_081 = 1	Excellente
ND	(SCRB_081 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

3) Autoévaluation de la santé mentale

Nom de la variable : SCRBDMEN

Basée sur : SCRB_082

Description : Cette variable décrit la santé mentale du répondant selon ses propres déclarations. Des scores plus élevés signalent une meilleure santé.

Valeur de SCRBDMEN	Condition(s)	Explication
0	SCRB_082 = 5	Mauvaise
1	SCRB_082 = 4	Passable
2	SCRB_082 = 3	Bonne
3	SCRB_082 = 2	Très bonne
4	SCRB_082 = 1	Excellente
ND	(SCRB_082 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

4) Filtrage des répondants – Dépression

Nom de la variable : SCRBFDEP

Basée sur : SCRB_21, SCRB_22, SCRB_23

Description : Cette variable indique si le répondant a été retenu ou non au moment du filtrage pour le module de la dépression.

Nota : Cette variable ne devrait pas être utilisée comme une variable substitut pour mesurer ce trouble particulier.

Valeur de SCRBFDEP	Condition(s)	Explication
1	SCRB_21 = 1 ou SCRB_22 = 1 ou SCRB_23 = 1	Répondant retenu pour le module de la dépression.
2	SCRB_21 = 2 et SCRB_22 = 2 et SCRB_23 = 2	Répondant non retenu pour le module de la dépression.
ND	(SCRB_21 = NSP, R, ND) ou (SCRB_22 = NSP, R, ND) ou (SCRB_23 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

5) Filtrage des répondants - Manie

Nom de la variable : SCRBFMIA

Basée sur : SCRB_24, SCRB_25, SCRB_25A

Description : Cette variable indique si le répondant a été retenu ou non au moment du filtrage pour le module de la manie.

Nota : Cette variable ne devrait pas être utilisée comme une variable substitut pour mesurer ce trouble particulier.

Valeur de SCRBFMIA	Condition(s)	Explication
1	SCRB_24 = 1 ou SCRB_25A = 1	Répondant retenu pour le module de la manie.

2	(SCRB_24 = 2 et SCRB_25 = 2) ou (SCRB_24 = 2 et SCRB_25A = 2)	Répondant non retenu pour le module de la manie.
ND	(SCRB_24 = NSP, R, ND) ou (SCRB_25 = NSP, R, ND) ou (SCRB_25A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

6) Filtrage des répondants – Trouble panique

Nom de la variable : SCRBF PAD

Basée sur : SCRB_20, SCRB_20A

Description : Cette variable indique si le répondant a été retenu ou non au moment du filtrage pour le module du trouble panique.

Nota : Cette variable ne devrait pas être utilisée comme une variable substitut pour mesurer ce trouble particulier.

Valeur de SCRBF PAD	Condition(s)	Explication
1	SCRB_20 = 1 ou SCRB_20A = 1	Répondant retenu pour le module du trouble panique.
2	SCRB_20 = 2 et SCRB_20A = 2	Répondant non retenu pour le module du trouble panique.
ND	(SCRB_20 = NSP, R, ND) ou (SCRB_20A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

7) Filtrage des répondants – Phobie sociale

Nom de la variable : SCRBF SOP

Basée sur : SCRB_29A, SCRB_291, SCRB_292, SCRB_293

Description : Cette variable indique si le répondant a été retenu ou non au moment du filtrage pour le module de la phobie sociale.

Nota : Cette variable ne devrait pas être utilisée comme une variable substitut pour mesurer ce trouble particulier.

Valeur de SCRBF SOP	Condition(s)	Explication
1	SCRB_291 = 1 et (SCRB_292 = 1 ou SCRB_293 = 1)	Répondant retenu pour le module de la phobie sociale.
2	SCRB_29A = 2 ou SCRB_291 = 2 ou (SCRB_292 = 2 et SCRB_293 = 2)	Répondant non retenu pour le module de la phobie sociale.
ND	(SCRB_29A = NSP, R, ND) ou (SCRB_291 = NSP, R, ND) ou (SCRB_292 = NSP, R, ND) ou (SCRB_293 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

8) Filtrage des répondants – Agoraphobie

Nom de la variable : SCRBFAGP

Basée sur : SCRB_30

Description : Cette variable indique si le répondant a été retenu ou non au moment du filtrage pour le module de l'agoraphobie.

Nota : Cette variable ne devrait pas être utilisée comme une variable substitut pour mesurer ce trouble particulier.

Valeur de SCRBFAGP	Condition(s)	Explication
1	SCRB_30 = 1	Répondant retenu pour le module de l'agoraphobie.
2	SCRB_30 = 2	Répondant non retenu pour le module de l'agoraphobie.
ND	(SCRB_30 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

9) Filtrage des répondants – Trouble d'anxiété généralisée

Nom de la variable : SCRBFAGAD

Basée sur : SCRB_26, SCRB_26A, SCRB_26B

Description : Cette variable indique si le répondant a été retenu ou non au moment du filtrage pour le module du trouble d'anxiété généralisée. Il est à noter que la présente enquête ne comprend pas de module sur le trouble d'anxiété généralisée.

Nota : Cette variable ne devrait pas être utilisée comme une variable substitut pour mesurer ce trouble particulier.

Valeur de SCRBFAGAD	Condition(s)	Explication
1	SCRB_26 = 1 ou SCRB_26A = 1 ou SCRB_26B = 1	Répondant retenu pour le module du trouble d'anxiété généralisée.
2	SCRB_26 = 2 et SCRB_26A = 2 et SCRB_26B = 2	Répondant non retenu pour le module du trouble d'anxiété généralisée.
ND	(SCRB_26 = NSP, R, ND) ou (SCRB_26A = NSP, R, ND) ou (SCRB_26B = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

Problèmes de santé chroniques (3 VD)

1) Est atteint(e) d'autres formes de psychose – Variable groupée

Nom de la variable : CCCBG281

Basée sur : CCCB_271, CCCB_281

Description : Cette variable indique si le répondant est atteint de schizophrénie ou de toute autre forme de psychose qui a été diagnostiquée par un professionnel de la santé.

Valeur de CCCBG281	Condition(s)	Explication
1	(CCCB_271 = 1) ou (CCCB_281 = 1)	Le répondant a répondu « oui » à une ou aux deux questions sur la schizophrénie ou toute autre forme de psychose.
2	(CCCB_271 = 2) et (CCCB_281 = 2)	Le répondant n'est pas atteint de schizophrénie ni d'une autre forme de psychose.
ND	(CCCB_271 = NSP, R, ND) et (CCCB_281 = NSP, R, ND)	Le répondant a refusé de répondre, ne savait pas, n'a pas précisé ou la question ne s'appliquait pour aucun des troubles considérés dans le calcul.

2) Est atteint d'autres problèmes de santé physique ou mentale de longue durée – Variable groupée

Nom de la variable : CCCBG901

Basée sur : CCCB_181, CCCB_301, CCCB_321, CCCB_341, CCCB_901

Description : Cette variable indique si le répondant est ou non atteint d'autres problèmes de santé physique ou mentale de longue durée diagnostiqués par un professionnel de la santé.

Valeur de CCCBG901	Condition(s)	Explication
1	(CCCB_181 = 1) ou (CCCB_301 = 1) ou (CCCB_321 = 1) ou (CCCB_341 = 1) ou (CCCB_901 = 1)	Le répondant a répondu « oui » pour un ou plusieurs des troubles suivants : maladie d'Alzheimer ou autre forme de démence, dysthymie, autisme ou tout autre trouble du développement, troubles de l'alimentation, comme l'anorexie ou la boulimie, ou autres problèmes de santé physique ou mentale de longue durée.
2	(CCCB_181 = SO, 2) et (CCCB_301 = 2) et (CCCB_321 = 2) et (CCCB_341 = 2) et (CCCB_901 = 2)	Le répondant a répondu « non » à la maladie d'Alzheimer ou toute autre forme de démence, la dysthymie, l'autisme ou tout autre trouble du développement, les troubles de l'alimentation comme l'anorexie ou la boulimie et tout autre problème de santé physique ou mentale de longue durée.
ND	(CCCB_181 = NSP, R, ND) et (CCCB_301 = NSP, R, ND) et (CCCB_321 = NSP, R, ND) et (CCCB_341 = NSP, R, ND) et (CCCB_901 = NSP, R, ND)	Le répondant a refusé de répondre, ne savait pas, n'a pas précisé ou la question ne s'appliquait pour aucun des troubles considérés dans le calcul.

3) A un problème de santé chronique

Nom de la variable : CCCBF1

Basée sur : CCCB_011, CCCB_021, CCCB_031, CCCB_041, CCCB_051, CCCB_061, CCCB_071, CCCB_081, CCCB_91A, CCCB_91B, CCCB_101, CCCB_111, CCCB_121, CCCB_131, CCCB_141, CCCB_151, CCCB_171, CCCB_181, CCCB_191, CCCB_201, CCCB_211, CCCB_251, CCCB_261, CCCB_271, CCCB_281, CCCB_301, CCCB_311, CCCB_321, CCCB_331, CCCB_341, CCCB_901

Description : Cette variable indique si le répondant souffrait ou non d'un problème de santé chronique qui a été diagnostiqué par un professionnel de la santé.

Spécifications techniques : On peut déterminer si le répondant a un problème de santé chronique si celui-ci a répondu « oui » à l'un des problèmes mentionnés.

Valeur de CCCBF1	Condition(s)	Explication
2	CCCB_011 = 2 et CCCB_021 = 2 et CCCB_031 = 2 et CCCB_041 = 2 et CCCB_051 = 2 et CCCB_061 = 2 et CCCB_071 = 2 et CCCB_081 = 2 et CCCB_91A = 2 et (CCCB_91B = 2, SO) et CCCB_101 = 2 et CCCB_111 = 2 et CCCB_121 = 2 et CCCB_131 = 2 et CCCB_141 = 2 et CCCB_151 = 2 et CCCB_171 = 2 et (CCCB_181 = 2, SO) et (CCCB_191 = 2, SO) et (CCCB_201 = 2, SO) et CCCB_211 = 2 et CCCB_251 = 2 et CCCB_261 = 2 et CCCB_271 = 2 et CCCB_281 = 2 et CCCB_301 = 2 et CCCB_311 = 2 et CCCB_321 = 2 et CCCB_331 = 2 et CCCB_341 = 2 et CCCB_901 = 2	Le répondant n'a aucun problème de santé chronique.

1	CCCB_011 = 1 ou CCCB_021 = 1 ou CCCB_031 = 1 ou CCCB_041 = 1 ou CCCB_051 = 1 ou CCCB_061 = 1 ou CCCB_071 = 1 ou CCCB_081 = 1 ou CCCB_91A = 1 ou CCCB_91B = 1 ou CCCB_101 = 1 ou CCCB_111 = 1 ou CCCB_121 = 1 ou CCCB_131 = 1 ou CCCB_141 = 1 ou CCCB_151 = 1 ou CCCB_171 = 1 ou CCCB_181 = 1 ou CCCB_191 = 1 ou CCCB_201 = 1 ou CCCB_211 = 1 ou CCCB_251 = 1 ou CCCB_261 = 1 ou CCCB_271 = 1 ou CCCB_281 = 1 ou CCCB_301 = 1 ou CCCB_311 = 1 ou CCCB_321 = 1 ou CCCB_331 = 1 ou CCCB_341 = 1 ou CCCB_901 = 1	Le répondant a au moins un problème de santé chronique.
---	--	---

ND	(CCCB_011 = NSP, R, ND) ou (CCCB_021 = NSP, R, ND) ou (CCCB_031 = NSP, R, ND) ou (CCCB_041 = NSP, R, ND) ou (CCCB_051 = NSP, R, ND) ou (CCCB_061 = NSP, R, ND) ou (CCCB_071 = NSP, R, ND) ou (CCCB_081 = NSP, R, ND) ou (CCCB_91A = NSP, R, ND) ou (CCCB_91B = NSP, R, ND) ou (CCCB_101 = NSP, R, ND) ou (CCCB_111 = NSP, R, ND) ou (CCCB_121 = NSP, R, ND) ou (CCCB_131 = NSP, R, ND) ou (CCCB_141 = NSP, R, ND) ou (CCCB_151 = NSP, R, ND) ou (CCCB_171 = NSP, R, ND) ou (CCCB_181 = NSP, R, ND) ou (CCCB_191 = NSP, R, ND) ou (CCCB_201 = NSP, R, ND) ou (CCCB_211 = NSP, R, ND) ou (CCCB_251 = NSP, R, ND) ou (CCCB_261 = NSP, R, ND) ou (CCCB_271 = NSP, R, ND) ou (CCCB_281 = NSP, R, ND) ou (CCCB_301 = NSP, R, ND) ou (CCCB_311 = NSP, R, ND) ou (CCCB_321 = NSP, R, ND) ou (CCCB_331 = NSP, R, ND) ou (CCCB_341 = NSP, R, ND) ou (CCCB_901 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
----	---	--

Taille et poids (4 VD)

1) Taille (mètres) - Variable groupée

Nom de la variable : HWTBGHT

Basée sur : HWTB_2, HWTB_2A, HWTB_2B, HWTB_2C, HWTB_2D, HWTB_2E, HWTB_2F

Description : Cette variable identifie la taille du répondant en mètres. Par exemple, une personne qui mesure 5 pieds et 8 pouces aura une taille de 1,727 mètre. La valeur de 1,727 correspond au milieu de la fourchette (1,715-1,739), soit environ 5 pieds et 8 pouces. Les valeurs de la fourchette ont été calculées comme suit pour une personne qui mesure 5 pieds 8 pouces : LIMITE INFÉRIEURE : prendre la valeur exacte en mètres d'une personne qui mesure 5 pieds et 7 pouces et l'arrondir à la valeur qui équivaut à 5 pieds 8 pouces. LIMITE SUPÉRIEURE : Prendre la valeur exacte en mètres d'une personne qui fait 5 pieds 9 pouces et l'arrondir à la valeur qui équivaut à 5 pieds 8 pouces, puis soustraire 0,001.

Spécifications techniques : Pour assurer que certains répondants ne soient pas identifiables, certaines valeurs ont été regroupées, tel qu'indiqué au tableau suivant.

Valeur de HWTBGHT	Condition(s)	Explication
1	HWTB_2 = 3 et HWTB_2C = 8	1.118 mètres (1.105 à 1.129 mètres)
2	HWTB_2 = 3 et HWTB_2C = 9	1.143 mètres (1.130 à 1.155 mètres)
3	HWTB_2 = 3 et HWTB_2C = 10	1.168 mètres (1.156 à 1.180 mètres)
4	HWTB_2 = 3 et HWTB_2C = 11	1.194 mètres (1.181 à 1.206 mètres)
5	HWTB_2 = 4 et HWTB_2D = 0	1.219 mètres (1.207 à 1.231 mètres)
6	HWTB_2 = 4 et HWTB_2D = 1	1.245 mètres (1.232 à 1.256 mètres)
7	HWTB_2 = 4 et HWTB_2D = 2	1.270 mètres (1.257 à 1.282 mètres)
8	HWTB_2 = 4 et HWTB_2D = 3	1.295 mètres (1.283 à 1.307 mètres)
9	HWTB_2 = 4 et HWTB_2D = 4	1.321 mètres (1.308 à 1.333 mètres)
10	HWTB_2 = 4 et HWTB_2D = 5	1.346 mètres (1.334 à 1.358 mètres)
11	HWTB_2 = 4 et HWTB_2D = 6	1.372 mètres (1.359 à 1.383 mètres)
12	HWTB_2 = 4 et HWTB_2D = 7	1.397 mètres (1.384 à 1.409 mètres)
13	HWTB_2 = 4 et HWTB_2D = 8	1.422 mètres (1.410 à 1.434 mètres)
14	HWTB_2 = 4 et HWTB_2D = 9	1.448 mètres (1.435 à 1.460 mètres)
15	HWTB_2 = 4 et HWTB_2D = 10	1.473 mètres (1.461 à 1.485 mètres)
16	HWTB_2 = 4 et HWTB_2D = 11	1.499 mètres (1.486 à 1.510 mètres)
17	HWTB_2 = 5 et HWTB_2E = 0	1.524 mètres (1.511 à 1.536 mètres)
18	HWTB_2 = 5 et HWTB_2E = 1	1.549 mètres (1.537 à 1.561 mètres)
19	HWTB_2 = 5 et HWTB_2E = 2	1.575 mètres (1.562 à 1.587 mètres)

20	HWTB_2 = 5 et HWTB_2E = 3	1.600 mètres (1.588 à 1.612 mètres)
21	HWTB_2 = 5 et HWTB_2E = 4	1.626 mètres (1.613 à 1.637 mètres)
22	HWTB_2 = 5 et HWTB_2E = 5	1.651 mètres (1.638 à 1.663 mètres)
23	HWTB_2 = 5 et HWTB_2E = 6	1.676 mètres (1.664 à 1.688 mètres)
24	HWTB_2 = 5 et HWTB_2E = 7	1.702 mètres (1.689 à 1.714 mètres)
25	HWTB_2 = 5 et HWTB_2E = 8	1.727 mètres (1.715 à 1.739 mètres)
26	HWTB_2 = 5 et HWTB_2E = 9	1.753 mètres (1.740 à 1.764 mètres)
27	HWTB_2 = 5 et HWTB_2E = 10	1.778 mètres (1.765 à 1.790 mètres)
28	HWTB_2 = 5 et HWTB_2E = 11	1.803 mètres (1.791 à 1.815 mètres)
29	HWTB_2 = 6 et HWTB_2F = 0	1.829 mètres (1.816 à 1.841 mètres)
30	HWTB_2 = 6 et HWTB_2F = 1	1.854 mètres (1.842 à 1.866 mètres)
31	HWTB_2 = 6 et HWTB_2F = 2	1.880 mètres ou plus
ND	(HWTB_2 = NSP, R, ND) ou (HWTB_2A = NSP, R, ND) ou (HWTB_2B = NSP, R, ND) ou (HWTB_2C = NSP, R, ND) ou (HWTB_2D = NSP, R, ND) ou (HWTB_2E = NSP, R, ND) ou (HWTB_2F = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

Groupement		
17	DHHB_SEX = 1 et DHHB_AGE => 15 et HWTBDHTM <= 1.524	Hommes âgés de 15 ans ou plus d'une taille de 1.524 ou moins
28	DHHB_SEX = 1 et 12 <= DHHB_AGE <= 14 et HWTBDHTM => 1.803	Garçons âgés de 12 à 14 ans d'une taille de 1.803 ou plus
31	DHHB_SEX = 1 et DHHB_AGE => 15 et HWTBDHTM => 1.88	Hommes âgés de 15 ans ou plus d'une taille de 1.880 ou plus
5	DHHB_SEX = 2 et 12 <= DHHB_AGE <= 14 et HWTBDHTM <= 1.219	Filles âgées de 12 à 14 ans d'une taille de 1.219 ou moins
12	DHHB_SEX = 2 et DHHB_AGE => 15 et HWTBDHTM <= 1.397	Femmes âgées 15 ans ou plus d'une taille de 1.397 ou moins
28	DHHB_SEX = 2 et DHHB_AGE => 12 et HWTBDHTM => 1.803	Femmes âgées de 12 ans ou plus d'une taille de 1.803 ou plus

2) Poids (kilogrammes) - Variable groupée

Nom de la variable : HWTBGWTK

Basée sur : HWTB_3, HWTB_N4

Description : Cette variable identifie le poids du répondant en kilogrammes.

Spécifications techniques : Pour assurer que certains répondants ne soient pas identifiables, certaines valeurs ont été regroupées, tel qu'indiqué au tableau suivant.

Valeur de HWTBGWTK	Condition(s)	Explication
HWTB_3	HWTB_N4 = 2	Poids déjà en kilogrammes
HWTB_3 × .45	HWTB_N4 = 1	Le poids est exprimé en livres, le convertir en kilogrammes.

Valeur de HWTBGWTK	Sexe	Groupe d'âge	Condition(s)	Minimum/Maximum valeur de poids
27	Male	12-14	DHHB_SEX = 1 et 12 <= DHHB_AGE <= 14 et HWTBDWTK <= 27	<= 27
41	Male	15-19	DHHB_SEX = 1 et 15 <= DHHB_AGE <= 19 et HWTBDWTK <= 41	<= 41
50	Male	=>20	DHHB_SEX = 1 et DHHB_AGE => 20 et HWTBDWTK <= 50	<= 50
106	Male	12-14	DHHB_SEX = 1 et 12 <= DHHB_AGE <= 14 et HWTBDWTK => 106	=> 106
130	Male	15-19	DHHB_SEX = 1 et 15 <= DHHB_AGE <= 19 et HWTBDWTK => 130	=> 130
137	Male	=>20	DHHB_SEX = 1 et DHHB_AGE => 20 et HWTBDWTK => 137	=> 137
29	Female	12-14	DHHB_SEX = 2 et 12 <= DHHB_AGE <= 14 et HWTBDWTK <= 29	<= 29
40	Female	>=15	DHHB_SEX = 2 et DHHB_AGE => 15 et HWTBDWTK <= 40	<= 40
86	Female	12-14	DHHB_SEX = 2 et 12 <= DHHB_AGE <= 14 et HWTBDWTK => 86	=> 86
113	Female	>=15	DHHB_SEX = 2 et DHHB_AGE => 15 et HWTBDWTK => 113	=> 113
ND			(HWTB_3 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

3) Indice de la masse corporelle - Variable groupée

Nom de la variable : HWTBGBMI

Basée sur : HWTBDHTM, HWTBDWTK, HWTB_1, DHHB_AGE, DHHB_SEX

Description : L'indice de la masse corporelle (IMC) constitue une méthode rapide et exacte pour déterminer le risque pour la santé puisqu'il se rapporte au poids et à la taille corporels. Il est calculé pour les personnes de 20 à 64 ans, sauf les femmes enceintes. La question sur la grossesse (variable HWTB_1) a été ajoutée pour mesurer l'IMC des femmes qui ont été interviewées durant la deuxième période de collecte, ce qui signifie que l'IMC ne pouvait pas être calculé pour les femmes qui ont été interviewées durant la première période de collecte. On ne calcule pas l'IMC des personnes qui mesurent moins de 0,914 mètre (3 pieds) ou plus de 2,108 mètres (7 pieds). Les IMC ont été regroupés pour indiquer une valeur minimum de 14 et maximum de 58.

Spécifications techniques : L'IMC est calculé en divisant le poids du répondant (en kilogrammes) par le carré de sa taille (en mètres). $IMC = POIDS\ (KG) / CARRÉ\ DE\ LA\ TAILLE\ (EN\ MÈTRES)$

Valeur de HWTBGBMI	Condition(s)	Explication
SO	$20 < DHHB_AGE < 64$	Le répondant avait moins de 20 ans ou plus de 64 ans.
SO	$HWTB_1 = 1$	Le répondant est enceinte.
ND	$HWTBDHTM = ND$ ou $HWTBDWTK = ND$	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.
ND	$HWTB_1 = ND$ et $DHHB_SEX = 2$	La question sur la grossesse n'a pas été posée aux femmes qui ont été interviewées durant la première période de collecte (2002Q1).
SO	$.914 < HWTBDHTM < 2.108$	La taille du répondant ne se situe pas dans la fourchette.
$HWTBDWTK / (HWTBDHTM \times HWTBDHTM)$ (arrondir à .1) (min. : 14; max. : 58)	$.914 \leq HWTBDHTM \leq 2.108$ et $0 < HWTBDWTK \leq 260$	L'IMC est calculé d'après les valeurs de la taille et du poids.

4) Poids standard (Standard canadien) - Variable groupée

Nom de la variable : HWTBGSW

Basée sur : HWTBDBMI

Description : Cette variable classe le répondant selon son IMC et précise s'il est insuffisant, acceptable, ou excessif selon le standard canadien.

Valeur de HWTBGSW	Condition(s)	Explication
SO	$HWTBDBMI = SO$	Le répondant a une valeur de non-réponse (sans objet) à la variable dérivée nécessaire au calcul.
ND	$HWTBDBMI = ND$	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul.
1	$HWTBDBMI < 20.0$	Poids insuffisant
2	$20.0 \leq HWTBDBMI < 25.0$	Poids acceptable
3	$25.0 \leq HWTBDBMI$	Poids excessif

Activités physiques (6 VD)

1) Dépense d'énergie

Nom de la variable : PACBDEE

Basée sur : PACB_1V, PACB_2A, PACB_2B, PACB_2C, PACB_2D, PACB_2E, PACB_2F, PACB_2G, PACB_2H, PACB_2I, PACB_2J, PACB_2K, PACB_2L, PACB_2M, PACB_2N, PACB_2O, PACB_2P, PACB_2Q, PACB_2R, PACB_2S, PACB_2T, PACB_2U, PACB_2W, PACB_2X, PACB_3A, PACB_3B, PACB_3C, PACB_3D, PACB_3E, PACB_3F, PACB_3G, PACB_3H, PACB_3I, PACB_3J, PACB_3K, PACB_3L, PACB_3M, PACB_3N, PACB_3O, PACB_3P, PACB_3Q, PACB_3R, PACB_3S, PACB_3T, PACB_3U, PACB_3W, PACB_3X

Description : Pour calculer l'indice d'activités physiques, il faut estimer la dépense d'énergie (DE) des participants durant leurs activités de loisirs. On se fonde, pour calculer la DE, sur la fréquence et sur la durée des séances d'activités physiques, ainsi que sur la valeur de la MET. La MET représente la demande d'énergie métabolique exprimée sous forme d'une multiple du taux de métabolisme au repos. Donc, une activité de quatre MET exige quatre fois la quantité d'énergie brûlée par l'organisme au repos.

Spécifications techniques : On calcule les valeurs de la dépense d'énergie pour chaque activité (kcal/kg/jour) = $(N \times D \times \text{valeur de la MET})/365$

Où :

N = nombre de fois que le répondant a fait une activité pendant une période de 12 mois

D = durée moyenne, en heures de l'activité

valeur de la MET = demande d'énergie de l'activité, exprimée en kilocalories dépensées par kilo de masse corporelle par heure d'activité† (kcal/kg par heure)/365 (pour convertir les données annuelles en données quotidiennes)

† En général, on regroupe les valeurs de la MET en trois niveaux d'intensité (c.-à-d. faible, moyenne et forte).

Comme l'ESCC ne contient aucune question demandant de préciser le niveau d'intensité des activités physiques, on a utilisé les valeurs de la MET correspondant à une faible intensité pour chaque activité. Cette approche est celle adoptée par l'Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode de vie, car les gens ont tendance à surestimer l'intensité, la fréquence et la durée de leurs activités. Les valeurs de la MET sont :

Nom de la variable	Activité	Valeur de la MET (kcal/kg/heure)
PACBDEEA	MARCHE POUR FAIRE DE L'EXERCICE	3
PACBDEEB	JARDINAGE OU TRAVAUX À L'EXTÉRIEUR	3
PACBDEEC	NATATION	3
PACBDEED	BICYCLETTE	4
PACBDEEE	DANSE MODERNE OU DANSE SOCIALE	3
PACBDEEF	EXERCICES À LA MAISON	3
PACBDEEG	HOCKEY SUR GLACE	6
PACBDEEH	PATINAGE SUR GLACE	4
PACBDEEI	PATINS À ROUES ALIGNÉES	5
PACBDEEJ	JOGGING OU COURSE	9.5
PACBDEEK	GOLF	4
PACBDEEL	EXERCICES DIRIGÉS OU AÉROBIE	4
PACBDEEM	SKY ALPIN OU PLANCHE À NEIGE	4
PACBDEEN	QUILLES	2
PACBDEEO	BASEBALL OU BALLE-MOLLE	3
PACBDEEP	TENNIS	4
PACBDEEQ	POIDS ET HALTÈRES	3

PACBDEER	PÊCHE	3
PACBDEES	VOLLEYBALL	5
PACBDEET	BASKETBALL	6
PACBDEEU	AUTRE (U)	4
PACBDEEW	AUTRE (W)	4
PACBDEEX	AUTRE (X)	4

Nota : Le jogging (valeur de la MET 7) et la course (valeur de la MET 12) s'inscrivent dans une seule catégorie; par conséquent, la valeur de la MET pour l'activité regroupée est la moyenne de leurs valeurs de la MET (9,5). Puisqu'il est difficile d'attribuer une valeur de la MET à la catégorie « Autres activités », la valeur utilisée est la moyenne des valeurs correspondant aux activités énumérées, sauf pour le jogging et la course. Pour ces deux activités, on a remplacé la moyenne par la valeur correspondant au **jogging** UNIQUEMENT dans le calcul de la moyenne globale pour les « Autres activités ». La valeur de la MET est inférieure à la moyenne pour certaines activités; toutefois, cette approche est conforme à celle adoptée pour d'autres études, comme l'Enquête Campbell et l'Enquête sur la santé en Ontario (ESO).

Nota : *Le nombre de fois a été arrondi à une valeur précise pour le calcul, comme dans le cas de l'ENSP (13 min. ou 0,2167 heure, 23 min. ou 0,3833 heure, 45min. ou 0,75 heure, 60 min. ou une heure).

Site Internet : L'Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode de vie : www.cflri.ca

MARCHE POUR FAIRE DE L'EXERCICE :

Valeur de PACBDEEA	Condition(s)	Explication
0	PACB_3A = SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité.
0	(PACB_3A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
$(PACB_2A \times 4 \times .2167 \times 3) / 365$	PACB_3A = 1	Calculer la DE pour < 15 min.*
$(PACB_2A \times 4 \times .3833 \times 3) / 365$	PACB_3A = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min.*
$(PACB_2A \times 4 \times .75 \times 3) / 365$	PACB_3A = 3	Calculer la DE pour 31 à 60 min.*
$(PACB_2A \times 4 \times 1 \times 3) / 365$	PACB_3A = 4	Calculer la DE pour > 60 min.*

JARDINAGE OU TRAVAUX À L'EXTÉRIEUR :

Valeur de PACBDEEB	Condition(s)	Explication
0	PACB_3B = SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité.
0	(PACB_3B = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
$(PACB_2B \times 4 \times .2167 \times 3) / 365$	PACB_3B = 1	Calculer la DE pour < 15 min.*
$(PACB_2B \times 4 \times .3833 \times 3) / 365$	PACB_3B = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min.*
$(PACB_2B \times 4 \times .75 \times 3) / 365$	PACB_3B = 3	Calculer la DE pour 31 à 60 min.*
$(PACB_2B \times 4 \times 1 \times 3) / 365$	PACB_3B = 4	Calculer la DE pour > 60 min.*

NATATION :

Valeur de PACBDEEC	Condition(s)	Explication
0	PACB_3C = SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité.
0	(PACB_3C = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
$(PACB_2C \times 4 \times .2167 \times 3) / 365$	PACB_3C = 1	Calculer la DE pour < 15 min.*
$(PACB_2C \times 4 \times .3833 \times 3) / 365$	PACB_3C = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min.*

$(PACB_2C \times 4 \times .75 \times 3) / 365$	$PACB_3C = 3$	Calculer la DE pour 31 à 60 min.*
$(PACB_2C \times 4 \times 1 \times 3) / 365$	$PACB_3C = 4$	Calculer la DE pour > 60 min.*

BICYCLETTE :

Valeur de PACBDEED	Condition(s)	Explication
0	$PACB_3D = SO$	Le répondant n'a pas participé à l'activité.
0	$(PACB_3D = NSP, R, ND)$	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
$(PACB_2D \times 4 \times .2167 \times 4) / 365$	$PACB_3D = 1$	Calculer la DE pour < 15 min.*
$(PACB_2D \times 4 \times .3833 \times 4) / 365$	$PACB_3D = 2$	Calculer la DE pour 16 à 30 min.*
$(PACB_2D \times 4 \times .75 \times 4) / 365$	$PACB_3D = 3$	Calculer la DE pour 31 à 60 min.*
$(PACB_2D \times 4 \times 1 \times 4) / 365$	$PACB_3D = 4$	Calculer la DE pour > 60 min.*

DANSE MODERNE OU DANSE SOCIALE :

Valeur de PACBDEEE	Condition(s)	Explication
0	$PACB_3E = SO$	Le répondant n'a pas participé à l'activité.
0	$(PACB_3E = NSP, R, ND)$	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
$(PACB_2E \times 4 \times .2167 \times 3) / 365$	$PACB_3E = 1$	Calculer la DE pour < 15 min.*
$(PACB_2E \times 4 \times .3833 \times 3) / 365$	$PACB_3E = 2$	Calculer la DE pour 16 à 30 min.*
$(PACB_2E \times 4 \times .75 \times 3) / 365$	$PACB_3E = 3$	Calculer la DE pour 31 à 60 min.*
$(PACB_2E \times 4 \times 1 \times 3) / 365$	$PACB_3E = 4$	Calculer la DE pour > 60 min.*

EXERCICES À LA MAISON :

Valeur de PACBDEEF	Condition(s)	Explication
0	$PACB_3F = SO$	Le répondant n'a pas participé à l'activité.
0	$(PACB_3F = NSP, R, ND)$	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
$(PACB_2F \times 4 \times .2167 \times 3) / 365$	$PACB_3F = 1$	Calculer la DE pour < 15 min.*
$(PACB_2F \times 4 \times .3833 \times 3) / 365$	$PACB_3F = 2$	Calculer la DE pour 16 à 30 min.*
$(PACB_2F \times 4 \times .75 \times 3) / 365$	$PACB_3F = 3$	Calculer la DE pour 31 à 60 min.*
$(PACB_2F \times 4 \times 1 \times 3) / 365$	$PACB_3F = 4$	Calculer la DE pour > 60 min.*

HOCKEY SUR GLACE :

Valeur de PACBDEEG	Condition(s)	Explication
0	$PACB_3G = SO$	Le répondant n'a pas participé à l'activité.
0	$(PACB_3G = NSP, R, ND)$	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
$(PACB_2G \times 4 \times .2167 \times 6) / 365$	$PACB_3G = 1$	Calculer la DE pour < 15 min.*
$(PACB_2G \times 4 \times .3833 \times 6) / 365$	$PACB_3G = 2$	Calculer la DE pour 16 à 30 min.*
$(PACB_2G \times 4 \times .75 \times 6) / 365$	$PACB_3G = 3$	Calculer la DE pour 31 à 60 min.*
$(PACB_2G \times 4 \times 1 \times 6) / 365$	$PACB_3G = 4$	Calculer la DE pour > 60 min.*

PATINAGE SUR GLACE :

Valeur de PACBDEEH	Condition(s)	Explication
0	PACB_3H = SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité.
0	(PACB_3H = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
$(PACB_2H \times 4 \times .2167 \times 4) / 365$	PACB_3H = 1	Calculer la DE pour < 15 min.*
$(PACB_2H \times 4 \times .3833 \times 4) / 365$	PACB_3H = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min.*
$(PACB_2H \times 4 \times .75 \times 4) / 365$	PACB_3H = 3	Calculer la DE pour 31 à 60 min.*
$(PACB_2H \times 4 \times 1 \times 4) / 365$	PACB_3H = 4	Calculer la DE pour > 60 min.*

PATINS À ROUES ALIGNÉES :

Valeur de PACBDEEI	Condition(s)	Explication
0	PACB_3I = SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité.
0	(PACB_3I = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
$(PACB_2I \times 4 \times .2167 \times 5) / 365$	PACB_3I = 1	Calculer la DE pour < 15 min.*
$(PACB_2I \times 4 \times .3833 \times 5) / 365$	PACB_3I = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min.*
$(PACB_2I \times 4 \times .75 \times 5) / 365$	PACB_3I = 3	Calculer la DE pour 31 à 60 min.*
$(PACB_2I \times 4 \times 1 \times 5) / 365$	PACB_3I = 4	Calculer la DE pour > 60 min.*

JOGGING OU COURSE :

Valeur de PACBDEEJ	Condition(s)	Explication
0	PACB_3J = SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité.
0	(PACB_3J = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
$(PACB_2J \times 4 \times .2167 \times 9.5) / 365$	PACB_3J = 1	Calculer la DE pour < 15 min.*
$(PACB_2J \times 4 \times .3833 \times 9.5) / 365$	PACB_3J = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min.*
$(PACB_2J \times 4 \times .75 \times 9.5) / 365$	PACB_3J = 3	Calculer la DE pour 31 à 60 min.*
$(PACB_2J \times 4 \times 1 \times 9.5) / 365$	PACB_3J = 4	Calculer la DE pour > 60 min.*

GOLF :

Valeur de PACBDEEK	Condition(s)	Explication
0	PACB_3K = SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité.
0	(PACB_3K = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
$(PACB_2K \times 4 \times .2167 \times 4) / 365$	PACB_3K = 1	Calculer la DE pour < 15 min.*
$(PACB_2K \times 4 \times .3833 \times 4) / 365$	PACB_3K = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min.*
$(PACB_2K \times 4 \times .75 \times 4) / 365$	PACB_3K = 3	Calculer la DE pour 31 à 60 min.*
$(PACB_2K \times 4 \times 1 \times 4) / 365$	PACB_3K = 4	Calculer la DE pour > 60 min.*

EXERCICES DIRIGÉS OU AÉROBIE :

Valeur de PACBDEEL	Condition(s)	Explication
0	PACB_3L = SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité.

0	(PACB_3L = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
$(PACB_2L \times 4 \times .2167 \times 4) / 365$	PACB_3L = 1	Calculer la DE pour < 15 min.*
$(PACB_2L \times 4 \times .3833 \times 4) / 365$	PACB_3L = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min.*
$(PACB_2L \times 4 \times .75 \times 4) / 365$	PACB_3L = 3	Calculer la DE pour 31 à 60 min.*
$(PACB_2L \times 4 \times 1 \times 4) / 365$	PACB_3L = 4	Calculer la DE pour > 60 min.*

SKY ALPIN OU PLANCHE À NEIGE :

Valeur de PACBDEEM	Condition(s)	Explication
0	PACB_3M = SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité.
0	(PACB_3M = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
$(PACB_2M \times 4 \times .2167 \times 4) / 365$	PACB_3M = 1	Calculer la DE pour < 15 min.*
$(PACB_2M \times 4 \times .3833 \times 4) / 365$	PACB_3M = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min.*
$(PACB_2M \times 4 \times .75 \times 4) / 365$	PACB_3M = 3	Calculer la DE pour 31 à 60 min.*
$(PACB_2M \times 4 \times 1 \times 4) / 365$	PACB_3M = 4	Calculer la DE pour > 60 min.*

QUILLES :

Valeur de PACBDEEN	Condition(s)	Explication
0	PACB_3N = SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité.
0	(PACB_3N = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
$(PACB_2N \times 4 \times .2167 \times 2) / 365$	PACB_3N = 1	Calculer la DE pour < 15 min.*
$(PACB_2N \times 4 \times .3833 \times 2) / 365$	PACB_3N = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min.*
$(PACB_2N \times 4 \times .75 \times 2) / 365$	PACB_3N = 3	Calculer la DE pour 31 à 60 min.*
$(PACB_2N \times 4 \times 1 \times 2) / 365$	PACB_3N = 4	Calculer la DE pour > 60 min.*

BASEBALL OU BALLE-MOLLE :

Valeur de PACBDEEO	Condition(s)	Explication
0	PACB_3O = SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité.
0	(PACB_3O = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
$(PACB_2O \times 4 \times .2167 \times 3) / 365$	PACB_3O = 1	Calculer la DE pour < 15 min.*
$(PACB_2O \times 4 \times .3833 \times 3) / 365$	PACB_3O = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min.*
$(PACB_2O \times 4 \times .75 \times 3) / 365$	PACB_3O = 3	Calculer la DE pour 31 à 60 min.*
$(PACB_2O \times 4 \times 1 \times 3) / 365$	PACB_3O = 4	Calculer la DE pour > 60 min.*

TENNIS :

Valeur de PACBDEEP	Condition(s)	Explication
0	PACB_3P = SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité.
0	(PACB_3P = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
$(PACB_2P \times 4 \times .2167 \times 4) / 365$	PACB_3P = 1	Calculer la DE pour < 15 min.*
$(PACB_2P \times 4 \times .3833 \times 4) / 365$	PACB_3P = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min.*
$(PACB_2P \times 4 \times .75 \times 4) / 365$	PACB_3P = 3	Calculer la DE pour 31 à 60 min.*
$(PACB_2P \times 4 \times 1 \times 4) / 365$	PACB_3P = 4	Calculer la DE pour > 60 min.*

POIDS ET HALTÈRES :

Valeur de PACBDEEQ	Condition(s)	Explication
0	PACB_3Q = SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité.
0	(PACB_3Q = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
$(PACB_2Q \times 4 \times .2167 \times 3) / 365$	PACB_3Q = 1	Calculer la DE pour < 15 min.*
$(PACB_2Q \times 4 \times .3833 \times 3) / 365$	PACB_3Q = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min.*
$(PACB_2Q \times 4 \times .75 \times 3) / 365$	PACB_3Q = 3	Calculer la DE pour 31 à 60 min.*
$(PACB_2Q \times 4 \times 1 \times 3) / 365$	PACB_3Q = 4	Calculer la DE pour > 60 min.*

PÊCHE :

Valeur de PACBDEER	Condition(s)	Explication
0	PACB_3R = SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité.
0	(PACB_3R = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
$(PACB_2R \times 4 \times .2167 \times 3) / 365$	PACB_3R = 1	Calculer la DE pour < 15 min.*
$(PACB_2R \times 4 \times .3833 \times 3) / 365$	PACB_3R = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min.*
$(PACB_2R \times 4 \times .75 \times 3) / 365$	PACB_3R = 3	Calculer la DE pour 31 à 60 min.*
$(PACB_2R \times 4 \times 1 \times 3) / 365$	PACB_3R = 4	Calculer la DE pour > 60 min.*

VOLLEYBALL :

Valeur de PACBDEES	Condition(s)	Explication
0	PACB_3S = SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité.
0	(PACB_3S = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
$(PACB_2S \times 4 \times .2167 \times 5) / 365$	PACB_3S = 1	Calculer la DE pour < 15 min.*
$(PACB_2S \times 4 \times .3833 \times 5) / 365$	PACB_3S = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min.*
$(PACB_2S \times 4 \times .75 \times 5) / 365$	PACB_3S = 3	Calculer la DE pour 31 à 60 min.*
$(PACB_2S \times 4 \times 1 \times 5) / 365$	PACB_3S = 4	Calculer la DE pour > 60 min.*

BASKETBALL :

Valeur de PACBDEET	Condition(s)	Explication
0	PACB_3T = SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité.
0	(PACB_3T = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
$(PACB_2T \times 4 \times .2167 \times 6) / 365$	PACB_3T = 1	Calculer la DE pour < 15 min.*
$(PACB_2T \times 4 \times .3833 \times 6) / 365$	PACB_3T = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min.*
$(PACB_2T \times 4 \times .75 \times 6) / 365$	PACB_3T = 3	Calculer la DE pour 31 à 60 min.*
$(PACB_2T \times 4 \times 1 \times 6) / 365$	PACB_3T = 4	Calculer la DE pour > 60 min.*

AUTRE (U) :

Valeur de PACBDEEU	Condition(s)	Explication
0	PACB_3U = SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité.
0	(PACB_3U = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
$(PACB_2U \times 4 \times .2167 \times 4) / 365$	PACB_3U = 1	Calculer la DE pour < 15 min.*
$(PACB_2U \times 4 \times .3833 \times 4) / 365$	PACB_3U = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min.*
$(PACB_2U \times 4 \times .75 \times 4) / 365$	PACB_3U = 3	Calculer la DE pour 31 à 60 min.*
$(PACB_2U \times 4 \times 1 \times 4) / 365$	PACB_3U = 4	Calculer la DE pour > 60 min.*

AUTRE (W) :

Valeur de PACBDEEW	Condition(s)	Explication
0	PACB_3W = SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité.
0	(PACB_3W = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
$(PACB_2W \times 4 \times .2167 \times 4) / 365$	PACB_3W = 1	Calculer la DE pour < 15 min.*
$(PACB_2W \times 4 \times .3833 \times 4) / 365$	PACB_3W = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min.*
$(PACB_2W \times 4 \times .75 \times 4) / 365$	PACB_3W = 3	Calculer la DE pour 31 à 60 min.*
$(PACB_2W \times 4 \times 1 \times 4) / 365$	PACB_3W = 4	Calculer la DE pour > 60 min.*

AUTRE (X) :

Valeur de PACBDEEX	Condition(s)	Explication
0	PACB_3X = SO	Le répondant n'a pas participé à l'activité.
0	(PACB_3X = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
$(PACB_2X \times 4 \times .2167 \times 4) / 365$	PACB_3X = 1	Calculer la DE pour < 15 min.*
$(PACB_2X \times 4 \times .3833 \times 4) / 365$	PACB_3X = 2	Calculer la DE pour 16 à 30 min.*
$(PACB_2X \times 4 \times .75 \times 4) / 365$	PACB_3X = 3	Calculer la DE pour 31 à 60 min.*
$(PACB_2X \times 4 \times 1 \times 4) / 365$	PACB_3X = 4	Calculer la DE pour > 60 min.*

SOMME DES VALEURS 'DE' ARRONDIE À UNE DÉCIMALE PRÈS :

TOTAL :

Valeur de PACBDEE	Condition(s)	Explication
ND	(PACB_1V = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
0	PACB_1V = 1	Aucune activité physique.
PACBDEEA + PACBDEEB + PACBDEEC + PACBDEED + PACBDEEE + PACBDEEF + PACBDEEG + PACBDEEH + PACBDEEI + PACBDEEJ + PACBDEEK + PACBDEEL + PACBDEEM + PACBDEEN + PACBDEEO + PACBDEEP + PACBDEEQ + PACBDEER +	0 ≤ PACBDEEA < SO et 0 ≤ PACBDEEB < SO et 0 ≤ PACBDEEC < SO et 0 ≤ PACBDEED < SO et 0 ≤ PACBDEEE < SO et 0 ≤ PACBDEEF < SO et 0 ≤ PACBDEEG < SO et 0 ≤ PACBDEEH < SO et 0 ≤ PACBDEEI < SO et	Le total de la dépense énergétique (kcal/kg/jour) est égal à la somme de la dépense d'énergie pour chaque activité.

PACBDEES + PACBDEET + PACBDEEU + PACBDEEW + PACBDEEX Arrondi à une décimale près (min : 0; max : 99.5)	0 <= PACBDEEJ < SO et 0 <= PACBDEEK < SO et 0 <= PACBDEEL < SO et 0 <= PACBDEEM < SO et 0 <= PACBDEEN < SO et 0 <= PACBDEEO < SO et 0 <= PACBDEEP < SO et 0 <= PACBDEEQ < SO et 0 <= PACBDEER < SO et 0 <= PACBDEES < SO et 0 <= PACBDEET < SO et 0 <= PACBDEEU < SO et 0 <= PACBDEEW < SO et 0 <= PACBDEEX < SO	
--	---	--

2) Participation à des activités physiques de loisirs

Nom de la variable : PACBFLEI

Basée sur : PACB_1V

Description : Cette variable indique si le répondant a participé à des activités de loisirs dans les trois mois précédant l'interview.

Source : Enquête sur la santé des Ontariens

Site Internet : www.chass.utoronto.ca/datalib/codebooks/utm/ohs/ohs90.htm

Valeur de PACBFLEI	Condition(s)	Explication
ND	(PACB_1V = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
2	PACB_1V = 1	Le répondant ne participe pas à des activités physiques de loisirs.
1	PACB_1V = 2	Le répondant participe à des activités physiques de loisirs.

3) Moyenne de la fréquence mensuelle des activités physiques durant plus de 15 minutes

Nom de la variable : PACBDFM

Basée sur : PACB_1V, PACB_2A, PACB_2B, PACB_2C, PACB_2D, PACB_2E, PACB_2F, PACB_2G, PACB_2H, PACB_2I, PACB_2J, PACB_2K, PACB_2L, PACB_2M, PACB_2N, PACB_2O, PACB_2P, PACB_2Q, PACB_2R, PACB_2S, PACB_2T, PACB_2U, PACB_2W, PACB_2X, PACB_3A, PACB_3B, PACB_3C, PACB_3D, PACB_3E, PACB_3F, PACB_3G, PACB_3H, PACB_3I, PACB_3J, PACB_3K, PACB_3L, PACB_3M, PACB_3N, PACB_3O, PACB_3P, PACB_3Q, PACB_3R, PACB_3S, PACB_3T, PACB_3U, PACB_3W, PACB_3X

Description : Cette variable permet de calculer le nombre de fois que la personne a participé, au cours du dernier mois, à une activité physique de plus de 15 minutes. Il convient de souligner que les questions se rapportent à une période de trois mois, mais que la variable se rapporte à une période d'un mois (la fréquence totale est divisée par trois).

Source : Enquête sur la santé des Ontariens

Site Internet : www.chass.utoronto.ca/datalib/codebooks/utm/ohs/ohs90.htm

Reformatages temporaires

Reformatage	Explication
Si (PACB_3A = 1, SO, NSP, R, ND) alors PACRO2A = 0	Établir toutes les valeurs pour PACB_3 (le temps consacré à chaque activité) à 0 si PACB_3 est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a participé à aucune activité), ou
Si (PACB_3B = 1, SO, NSP, R, ND) alors PACRO2B = 0	
Si (PACB_3C = 1, SO, NSP, R, ND) alors PACRO2C = 0	

Si (PACB_3D = 1, SO, NSP, R, ND) alors PACRQ2D = 0 Si (PACB_3E = 1, SO, NSP, R, ND) alors PACRQ2E = 0 Si (PACB_3F = 1, SO, NSP, R, ND) alors PACRQ2F = 0 Si (PACB_3G = 1, SO, NSP, R, ND) alors PACRQ2G = 0 Si (PACB_3H = 1, SO, NSP, R, ND) alors PACRQ2H = 0 Si (PACB_3I = 1, SO, NSP, R, ND) alors PACRQ2I = 0 Si (PACB_3J = 1, SO, NSP, R, ND) alors PACRQ2J = 0 Si (PACB_3K = 1, SO, NSP, R, ND) alors PACRQ2K = 0 Si (PACB_3L = 1, SO, NSP, R, ND) alors PACRQ2L = 0 Si (PACB_3M = 1, SO, NSP, R, ND) alors PACRQ2M = 0 Si (PACB_3N = 1, SO, NSP, R, ND) alors PACRQ2N = 0 Si (PACB_3O = 1, SO, NSP, R, ND) alors PACRQ2O = 0 Si (PACB_3P = 1, SO, NSP, R, ND) alors PACRQ2P = 0 Si (PACB_3Q = 1, SO, NSP, R, ND) alors PACRQ2Q = 0 Si (PACB_3R = 1, SO, NSP, R, ND) alors PACRQ2R = 0 Si (PACB_3S = 1, SO, NSP, R, ND) alors PACRQ2S = 0 Si (PACB_3T = 1, SO, NSP, R, ND) alors PACRQ2T = 0 Si (PACB_3U = 1, SO, NSP, R, ND) alors PACRQ2U = 0 Si (PACB_3W = 1, SO, NSP, R, ND) alors PACRQ2W = 0 Si (PACB_3X = 1, SO, NSP, R, ND) alors PACRQ2X = 0	NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question).
--	---

Valeur de PACBDFM	Condition(s)	Explication
0	PACB_1V = 1	Aucune activité physique.
ND	(PACB_1V = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
(PACRQ2A + PACRQ2B + PACRQ2C + PACRQ2D + PACRQ2E + PACRQ2F + PACRQ2G + PACRQ2H + PACRQ2I + PACRQ2J + PACRQ2K + PACRQ2L + PACRQ2M + PACRQ2N + PACRQ2O + PACRQ2P + PACRQ2Q + PACRQ2R + PACRQ2S + PACRQ2T + PACRQ2U + PACRQ2W + PACRQ2X) / 3 (min : 0; max : 995) (valeur arrondie au nombre entier près)	0 <= PACRQ2A < SO et 0 <= PACRQ2B < SO et 0 <= PACRQ2C < SO et 0 <= PACRQ2D < SO et 0 <= PACRQ2E < SO et 0 <= PACRQ2F < SO et 0 <= PACRQ2G < SO et 0 <= PACRQ2H < SO et 0 <= PACRQ2I < SO et 0 <= PACRQ2J < SO et 0 <= PACRQ2K < SO et 0 <= PACRQ2L < SO et 0 <= PACRQ2M < SO et 0 <= PACRQ2N < SO et 0 <= PACRQ2O < SO et 0 <= PACRQ2P < SO et 0 <= PACRQ2Q < SO et 0 <= PACRQ2R < SO et 0 <= PACRQ2S < SO et 0 <= PACRQ2T < SO et 0 <= PACRQ2U < SO et 0 <= PACRQ2W < SO et 0 <= PACRQ2X < SO	Total des fréquences des activités physiques d'une durée de plus de 15 minutes au cours de trois mois divisé par trois.

4) Fréquence de toutes les activités physiques d'une durée de plus de 15 minutes

Nom de la variable : PACBDFR

Basée sur : PACBDFM

Description : Cette variable permet de classer les répondants d'après la moyenne de la fréquence mensuelle de leurs activités physiques de plus de 15 minutes.

Valeur de PACBDFR	Condition(s)	Explication
ND	PACBDFM = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul.
1	$12 \leq \text{PACBDFM} < \text{SO}$	Le répondant fait de l'exercice régulièrement.
2	$4 \leq \text{PACBDFM} < 12$	Le répondant fait de l'exercice à l'occasion.
3	$\text{PACBDFM} < 4$	Le répondant fait de l'exercice peu fréquemment.

5) Participation quotidienne à des activités physiques d'une durée de plus de 15 minutes

Nom de la variable : PACBFD

Basée sur : PACBDFM

Description : Cette variable indique si le répondant a participé quotidiennement à une activité physique.

Valeur de PACBFD	Condition(s)	Explication
ND	PACBDFM = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul.
1	$30 \leq \text{PACBDFM} < \text{SO}$	Le répondant fait de l'exercice tous les jours.
2	$\text{PACBDFM} < 30$	Le répondant ne fait pas d'exercice tous les jours.

6) Indice de l'activité physique

Nom de la variable : PACBDPAI

Basée sur : PACBDEE

Description : Les valeurs de la dépense d'énergie utilisée pour classer les personnes sont les mêmes que celles utilisées pour l'Enquête sur la santé des Ontariens (ESO) et l'Enquête Campbell sur le bien-être au Canada.

Site Internet : Enquête Campbell sur le bien-être au Canada : www.cflri.ca/cflri/pa/surveys/88survey.html

Valeur de PACBDPAI	Condition(s)	Explication
ND	PACBDEE = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul.
1	$3.0 \leq \text{PACBDEE} < \text{SO}$	Actif
2	$1.5 \leq \text{PACBDEE} < 3.0$	Modérément actif
3	$0 \leq \text{PACBDEE} < 1.5$	Inactif

Bien-être psychologique (1 VD)

1) Échelle de manifestation du bien-être psychologique (EMMBEP)

Nom de la variable : PWBBDPW

Basée sur : PWBB_01, PWBB_02, PWBB_03, PWBB_04, PWBB_05, PWBB_06, PWBB_07, PWBB_08, PWBB_09, PWBB_10, PWBB_11, PWBB_12, PWBB_13, PWBB_14, PWBB_15, PWBB_16, PWBB_17, PWBB_18, PWBB_19, PWBB_20, PWBB_21, PWBB_22, PWBB_23, PWBB_24, PWBB_25

Description : Cette échelle, qui évalue le bien-être psychologique, est fondée sur les questions proposées par Raymond Massé. Le bien-être est d'autant plus grand que la cote est élevée.

Source : Raymond Massé (Université de Laval)

« Élaboration et validation d'un outil de mesure du bien-être psychologique : L'ÉMMBEP » R. Massé, C. Poulin, C. Dassa, J. Lambert, S. Bélair, M.A. Battaglini. Revue Canadienne de Santé Publique, Vol. 89. No. 5, pp. 352-357.

Reformatages temporaires

Reformatage	Explication
Si PWBB_01 <= 5 alors PWBRQ01 = 5 - PWBB_01 Si PWBB_02 <= 5 alors PWBRQ02 = 5 - PWBB_02 Si PWBB_03 <= 5 alors PWBRQ03 = 5 - PWBB_03 Si PWBB_04 <= 5 alors PWBRQ04 = 5 - PWBB_04 Si PWBB_05 <= 5 alors PWBRQ05 = 5 - PWBB_05 Si PWBB_06 <= 5 alors PWBRQ06 = 5 - PWBB_06 Si PWBB_07 <= 5 alors PWBRQ07 = 5 - PWBB_07 Si PWBB_08 <= 5 alors PWBRQ08 = 5 - PWBB_08 Si PWBB_09 <= 5 alors PWBRQ09 = 5 - PWBB_09 Si PWBB_10 <= 5 alors PWBRQ10 = 5 - PWBB_10 Si PWBB_11 <= 5 alors PWBRQ11 = 5 - PWBB_11 Si PWBB_12 <= 5 alors PWBRQ12 = 5 - PWBB_12 Si PWBB_13 <= 5 alors PWBRQ13 = 5 - PWBB_13 Si PWBB_14 <= 5 alors PWBRQ14 = 5 - PWBB_14 Si PWBB_15 <= 5 alors PWBRQ15 = 5 - PWBB_15 Si PWBB_16 <= 5 alors PWBRQ16 = 5 - PWBB_16 Si PWBB_17 <= 5 alors PWBRQ17 = 5 - PWBB_17 Si PWBB_18 <= 5 alors PWBRQ18 = 5 - PWBB_18 Si PWBB_19 <= 5 alors PWBRQ19 = 5 - PWBB_19 Si PWBB_20 <= 5 alors PWBRQ20 = 5 - PWBB_20 Si PWBB_21 <= 5 alors PWBRQ21 = 5 - PWBB_21 Si PWBB_22 <= 5 alors PWBRQ22 = 5 - PWBB_22 Si PWBB_23 <= 5 alors PWBRQ23 = 5 - PWBB_23 Si PWBB_24 <= 5 alors PWBRQ24 = 5 - PWBB_24 Si PWBB_25 <= 5 alors PWBRQ25 = 5 - PWBB_25	Coder inversement toutes les réponses de sorte que les cotes les plus élevées reflètent les niveaux les plus élevés de bien-être. Modifier l'échelle pour passer de 1 à 5 à 0 à 4 de sorte que l'échelle sommative varie de 0 à 100.

Valeur de PWBBDPWB	Condition(s)	Explication
ND	(PWBB_01 = NSP, R, ND) ou (PWBB_02 = NSP, R, ND) ou (PWBB_03 = NSP, R, ND) ou (PWBB_04 = NSP, R, ND) ou (PWBB_05 = NSP, R, ND) ou (PWBB_06 = NSP, R, ND) ou (PWBB_07 = NSP, R, ND) ou (PWBB_08 = NSP, R, ND) ou (PWBB_09 = NSP, R, ND) ou (PWBB_10 = NSP, R, ND) ou (PWBB_11 = NSP, R, ND) ou (PWBB_12 = NSP, R, ND) ou (PWBB_13 = NSP, R, ND) ou (PWBB_14 = NSP, R, ND) ou (PWBB_15 = NSP, R, ND) ou (PWBB_16 = NSP, R, ND) ou (PWBB_17 = NSP, R, ND) ou (PWBB_18 = NSP, R, ND) ou (PWBB_19 = NSP, R, ND) ou (PWBB_20 = NSP, R, ND) ou (PWBB_21 = NSP, R, ND) ou (PWBB_22 = NSP, R, ND) ou (PWBB_23 = NSP, R, ND) ou (PWBB_24 = NSP, R, ND) ou (PWBB_25 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
PWBRQ01 + PWBRQ02 + PWBRQ03 + PWBRQ04 + PWBRQ05 + PWBRQ06 + PWBRQ07 + PWBRQ08 + PWBRQ09 + PWBRQ10 + PWBRQ11 + PWBRQ12 + PWBRQ13 + PWBRQ14 + PWBRQ15 + PWBRQ16 + PWBRQ17 + PWBRQ18 + PWBRQ19 + PWBRQ20 + PWBRQ21 + PWBRQ22 + PWBRQ23 + PWBRQ24 + PWBRQ25 (min : 0; max : 100)	1 <= PWBB_01 <= 5 et 1 <= PWBB_02 <= 5 et 1 <= PWBB_03 <= 5 et 1 <= PWBB_04 <= 5 et 1 <= PWBB_05 <= 5 et 1 <= PWBB_06 <= 5 et 1 <= PWBB_07 <= 5 et 1 <= PWBB_08 <= 5 et 1 <= PWBB_09 <= 5 et 1 <= PWBB_10 <= 5 et 1 <= PWBB_11 <= 5 et 1 <= PWBB_12 <= 5 et 1 <= PWBB_13 <= 5 et 1 <= PWBB_14 <= 5 et 1 <= PWBB_15 <= 5 et 1 <= PWBB_16 <= 5 et 1 <= PWBB_17 <= 5 et 1 <= PWBB_18 <= 5 et 1 <= PWBB_19 <= 5 et 1 <= PWBB_20 <= 5 et 1 <= PWBB_21 <= 5 et 1 <= PWBB_22 <= 5 et 1 <= PWBB_23 <= 5 et 1 <= PWBB_24 <= 5 et 1 <= PWBB_25 <= 5	Cote du répondant sur l'échelle de bien-être psychologique. Les cotes les plus élevées reflètent les niveaux les plus élevés de bien-être.

Détresse (3 VD)

Les questions et les cotes utilisées pour calculer l'échelle de détresse s'appuient sur les travaux de Kessler et Mroczek (de l'Université du Michigan). L'indice se fonde sur un sous-ensemble de questions de la « Composite International Diagnostic Interview » (CIDI). La CIDI est un instrument de diagnostics structuré qui a été conçu pour produire des diagnostics conformes aux définitions et critères du DSM-III-R et des critères diagnostiques pour la recherche de la Classification internationale des maladies, 10e révision (CIM-10). La détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée.

Le DSM réfère au Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders utilisé par l'American Psychiatric Association. Il s'agit d'une classification des troubles mentaux internationalement reconnue qui existe en plusieurs versions.

Les troubles ou problèmes mentaux que l'on trouve dans l'ESCC sont partiellement opérationnalisés selon les définitions et les classifications du DSM-IV et DSM-III-R.

Reformatages temporaires

Reformatage	Explication
Si DISB_10A <= 5 alors DISRQ01A = 5 – DISB_10A Si DISB_10B <= 5 alors DISRQ01B = 5 – DISB_10B Si DISB_10C <= 5 alors DISRQ01C = 5 – DISB_10C Si DISB_10D <= 5 alors DISRQ01D = 5 – DISB_10D Si DISB_10E <= 5 alors DISRQ01E = 5 – DISB_10E Si DISB_10F <= 5 alors DISRQ01F = 5 – DISB_10F Si DISB_10G <= 5 alors DISRQ01G = 5 – DISB_10G Si DISB_10H <= 5 alors DISRQ01H = 5 – DISB_10H Si DISB_10I <= 5 alors DISRQ01I = 5 – DISB_10I Si DISB_10J <= 5 alors DISRQ01J = 5 – DISB_10J	Modifier l'échelle et inverser les réponses aux questions DISB_10A à DISB_10J de 1 à 5, à 4 à 0 de sorte que 0 = jamais, et 4 = tout le temps.

1) Échelle de détresse – K10

Nom de la variable : DISBDDSX

Basée sur : DISB_10A, DISB_10B, DISB_10C, DISB_10D, DISB_10E, DISB_10F, DISB_10G, DISB_10H, DISB_10I, DISB_10J

Description : La variable qui suit détermine le niveau de détresse du répondant sur une échelle de dix questions. La détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée.

Nota : DISBDDSX est similaire à l'échelle de détresse de l'ESCC 1.1 et les enquêtes antérieures de l'ENSP. Cette variable dérivée est fondée sur dix questions et est connue sous le nom de K10.

Site Internet : « National Comorbidity Survey » : www.hcp.med.harvard.edu/ncs/

« Composite International Diagnostic Interview » (CIDI) : www.who.int/msa/cidi/index.htm

Valeur de DISBDDSX	Condition(s)	Explication
ND	(DISB_10A = NSP, R, ND) ou (DISB_10B = NSP, R, ND) ou (DISB_10C = NSP, R, ND) ou (DISB_10D = NSP, R, ND) ou (DISB_10E = NSP, R, ND) ou (DISB_10F = NSP, R, ND) ou (DISB_10G = NSP, R, ND) ou (DISB_10H = NSP, R, ND) ou (DISB_10I = NSP, R, ND) ou (DISB_10J = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

DISRQ01A + DISRQ01B + DISRQ01C + DISRQ01D + DISRQ01E + DISRQ01F + DISRQ01G + DISRQ01H + DISRQ01I + DISRQ01J (min : 0; max : 40)	DISRQ01A <= 4 et DISRQ01B <= 4 et DISRQ01C <= 4 et DISRQ01D <= 4 et DISRQ01E <= 4 et DISRQ01F <= 4 et DISRQ01G <= 4 et DISRQ01H <= 4 et DISRQ01I <= 4 et DISRQ01J <= 4	Résultat obtenu par le répondant sur l'échelle de détresse - K10. La détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée.
--	---	---

2) Échelle de détresse – K6

Nom de la variable : DISBDK6

Basée sur : DISB_10B, DISB_10D, DISB_10E, DISB_10H, DISB_10I, DISB_10J

Description : La variable qui suit détermine le niveau de détresse du répondant sur une échelle à six questions. La détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée.

Nota : DISBDK6 est identique à l'échelle de détresse utilisée dans les enquêtes précédentes de l'ESCC 1.1 et l'ENSP. La variable a été renommée pour la distinguer de la variable K10.

Site Internet : « National Comorbidity Survey » : www.hcp.med.harvard.edu/ncs/

« Composite International Diagnostic Interview » (CIDI) : www.who.int/msa/cidi/index.htm

Valeur de DISBDK6	Condition(s)	Explication
ND	(DISB_10B = NSP, R, ND) ou (DISB_10D = NSP, R, ND) ou (DISB_10E = NSP, R, ND) ou (DISB_10H = NSP, R, ND) ou (DISB_10I = NSP, R, ND) ou (DISB_10J = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
DISRQ01B + DISRQ01D + DISRQ01E + DISRQ01H + DISRQ01I + DISRQ01J (min : 0; max : 24)	(DISRQ01B <= 4) et (DISRQ01D <= 4) et (DISRQ01E <= 4) et (DISRQ01H <= 4) et (DISRQ01I <= 4) et (DISRQ01J <= 4)	Résultat obtenu par le répondant sur l'échelle de détresse - K6. La détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée.

3) Échelle de chronicité de la détresse et de l'affaiblissement lié à la détresse

Nom de la variable : DISBDCHR

Basée sur : DISB_10K, DISB_10L, DISB_10M

Description : Les variables DISB_10K, DISB_10L et DISB_10M, qui évaluent la chronicité de la détresse et de l'affaiblissement lié à la détresse au cours du derniers mois, sont appariées avec le résultat obtenu par le répondant sur l'échelle de détresse (DISB_10A, DISB_10B, DISB_10C, DISB_10D, DISB_10E, DISB_10F, DISB_10G, DISB_10H, DISB_10I, DISB_10J).

Nota : Cette variable a la même opérationnalisation que la variable DISADCH de l'ESCC 1.1. Toutefois, puisque les sentiments de référence se réfèrent maintenant à dix variables plutôt qu'aux six variables utilisées dans l'ESCC 1.1 et antérieurement dans l'ENSP, elle a été renommée.

Site Internet : « National Comorbidity Survey » : www.hcp.med.harvard.edu/ncs/

« Composite International Diagnostic Interview » (CIDI) : www.who.int/msa/cidi/index.htm

Valeur de DISBDCHR	Condition(s)	Explication
ND	(DISB_10K = NSP, R, ND) ou (DISB_10L = NSP, R, ND) ou (DISB_10M = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
1	DISB_10L = 1	Beaucoup plus souvent qu'à l'habitude

2	DISB_10L = 2	Plus souvent qu'à l'habitude
3	DISB_10L = 3	Un peu plus souvent qu'à l'habitude
4	DISB_10K = 3	Sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude
5	DISB_10M = 3	Un peu moins souvent qu'à l'habitude
6	DISB_10M = 2	Plutôt moins souvent qu'à l'habitude
7	DISB_10M = 1	Beaucoup moins souvent qu'à l'habitude
8	DISB_10K = 4	N'a jamais ressenti ces sentiments

Épisode dépressif majeur (30 VD)

Pour les besoins de l'ESCC 1.2, l'épisode dépressif majeur est une période de deux semaines ou plus durant laquelle persiste une humeur dépressive ou une perte d'intérêt ou de plaisir pour les activités normales, associée à des symptômes tels qu'une réduction de l'énergie, un changement du sommeil et de l'appétit, des difficultés à se concentrer et un sentiment de culpabilité, de désespoir et des idées suicidaires.

Les questions sur l'épisode dépressif majeur sont fondées sur une version reconnue du «World Mental Health du Composite International Diagnostic Interview» (WMH-CIDI) et modifiée pour les besoins du cycle 1.2 de l'ESCC. L'instrument WMH-CIDI, qui fait partie du projet «World Mental Health 2000» (WMH2000), est une initiative de l'Organisation mondiale de la santé destinée à évaluer la prévalence de divers troubles mentaux dans plusieurs pays à travers le monde.

Le WMH-CIDI est un questionnaire normalisé pour l'évaluation des troubles mentaux conformément à une opérationnalisation des définitions et critères du DSM-IV et de la CIM-10. L'abréviation DSM désigne le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié par l'American Psychiatric Association. Il s'agit d'une classification des troubles mentaux reconnue à l'échelle internationale dont il existe plusieurs versions. Les troubles ou problèmes mentaux étudiés dans le cadre de l'ESCC 1.2 sont codés de façon partielle selon le DSM-IV ou le DSM-III-R. L'ESCC 1.2 n'offre aucun soutien vis-à-vis les algorithmes de la CIM-10.

Le projet WMH2000 a été adapté à plusieurs versions IPAO (interview sur place assistée par ordinateur) et IPC (interview papier et crayon) du questionnaire WMH-CIDI. Les responsables du projet ont déjà créé un groupe de travail qui examinera les différences méthodologiques pour s'assurer que les comparaisons entre pays soient faites de façon appropriée.

L'épisode dépressif majeur est l'un des cinq états de santé mentale du projet WMH2000 visés par cette enquête. Celle-ci est conçue pour évaluer le diagnostic de l'épisode dépressif majeur au cours de la vie et au cours des 12 derniers mois. Un épisode au cours des 12 derniers mois s'entend des 12 mois qui ont précédé l'interview.

La documentation qui accompagne les données de l'ESCC 1.2 fournit des renseignements sur toutes les variables dérivées temporaires utilisées pour calculer les variables dérivées finales de troubles dont le profil est établi au cours de la vie et au cours des 12 derniers mois. Pour la plupart des utilisateurs des données, les variables dérivées finales et les variables dérivées ayant trait à la récence, à la durée, à l'âge au moment de l'apparition et à la perturbation associée au trouble suffiront pour réaliser les analyses.

En ce qui concerne l'épisode dépressif majeur, les variables d'intérêt sont :

Variable	Concept	Numéro de la variable
DEPBDDPS	Algorithme – vie	17
DEPBDDY	Algorithme - 12 mois	24
DEPBGON	Apparition	18
DEPBGREC	Récence	19
DEPBGPER	Persistance	20
DEPBG22B DEPBG23B DEPBG7CA DEPBG8AA DEPBG8BA DEPBG39A	Durée	1 à 6

DEPBDINT	Perturbation / trouble – 12 mois	29
DEPBFSLT DEPBFSYT DEPBFSLA DEPBFSYA	Variables sur le suicide	25 à 28

Les critères utilisés pour produire les variables dérivées finales associées à un épisode dépressif majeur, ainsi que leurs variables temporaires respectives sont opérationnalisés de façon à satisfaire partiellement aux définitions/classification du DSM-IV. Bien que le questionnaire et les algorithmes soient fondés sur des approches et une classification reconnues mondialement, cette méthode ne peut être utilisée pour poser le diagnostic du trouble chez les personnes présentant ce profil. Seuls des professionnels ayant la formation médicale requise peuvent le faire.

L'instrument de l'ESCC 1.2 permet de recueillir une foule d'informations sur le nombre de symptômes, la gravité, la durée et l'intensité globale du trouble. Toutefois, l'approche structurée utilisée pour l'instrument informatisé n'est pas conçue pour recueillir certains renseignements complexes utilisés par ceux ayant reçu une formation professionnelle pour poser le diagnostic final conformément à la classification du DSM-IV. Ainsi, il n'existe aucun algorithme pour appuyer la création de variables dérivées en rapport avec les spécificateurs/sous-types du trouble. En outre, bien que l'instrument soit conçu pour recueillir certains renseignements utilisés pour l'opérationnalisation des exclusions physiques/organiques et des règles hiérarchiques, Statistique Canada recommande que cette information soit utilisée par des spécialistes du DSM étant donné sa nature complexe.

En plus de l'information sur les états de santé mentale, le questionnaire WMH-CIDI permet de recueillir des renseignements sur un grand nombre de corrélats importants de la santé mentale, comme l'utilisation des services de santé et le soutien. Toutefois, les données de l'ESCC 1.2 recueillies sur les corrélats de la santé mentale ne sont pas fondées sur le questionnaire WMH-CIDI. Bien que les comparaisons internationales de ce genre de données soient importantes, après avoir consulté les divers intervenants, Statistique Canada a décidé que les données de l'ESCC 1.2 devraient appuyer et compléter l'information canadienne déjà recueillie dans le cadre de l'ESCC 1.1 et des cycles de l'ENSP réalisés antérieurement.

Pour simplifier la comparaison au DSM, les critères sont présentés plus ou moins selon le modèle du DSM-IV. Cette correspondance vise uniquement à faciliter l'interprétation des résultats en permettant un langage commun. Toutefois, il serait inapproprié de conclure à l'existence d'une correspondance directe entre nos critères et ceux du DSM-IV en raison de la nature complexe du sujet et des limites opérationnelles associées au questionnaire et aux algorithmes.

Pour les besoins de cette enquête, les répondants qui remplissent les critères ESCC 1.2/WMH-CIDI d'un épisode dépressif majeur au cours de la vie sont ceux qui déclarent :

1. une humeur dépressive ou une perte d'intérêt ou de plaisir d'une durée de deux semaines ou plus ET au moins cinq symptômes supplémentaires;
2. une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social ou professionnel;
3. que les symptômes ne sont pas mieux expliqués par un deuil.

Pour les besoins de cette enquête, les répondants qui remplissent les critères ESCC 1.2/WMH-CIDI d'un épisode dépressif majeur au cours des 12 derniers mois :

1. répondent aux critères diagnostiques d'un trouble dépressif majeur au cours de la vie;
2. déclarent un trouble au cours des 12 derniers mois;
3. déclarent une altération marquée du fonctionnement professionnel ou social.

Épisode dépressif majeur – Au cours de la vie

1) Durée du pire épisode dépressif - Variable groupée

Nom de la variable : DEPBG22B

Basée sur : DEPB_22C (JOURS), DEPB_22D (SEMAINES), DEPB_22E (MOIS), DEPB_22F (ANNÉES)

Description : La variable suivante indique la durée du pire épisode dépressif vécu par le répondant. Afin de s'assurer que les individus ne sont pas identifiables, des enregistrements ont été groupés.

Valeur de DEPBG22B	Condition(s)	Explication
SO	DEPB_22C = SO et DEPB_22D = SO et DEPB_22E = SO et DEPB_22F = SO	Sans objet
1	DEPB_22C <= 14 ou DEPB_22D = 2	2 semaines
2	15 <= DEPB_22C <= 21 ou DEPB_22D = 3	3 semaines (15 à 21 jours)
3	22 <= DEPB_22C <= 31 ou DEPB_22D = 4 ou DEPB_22E = 1	1 mois
4	32 <= DEPB_22C <= 60 ou 5 <= DEPB_22D <= 8 ou DEPB_22E = 2	2 mois
5	61 <= DEPB_22C <= 91 ou 9 <= DEPB_22D <= 13 ou DEPB_22E = 3	3 mois
6	92 <= DEPB_22C <= 120 ou 14 <= DEPB_22D <= 17 ou DEPB_22E = 4	4 mois
7	121 <= DEPB_22C <= 151 ou 18 <= DEPB_22D <= 21 ou DEPB_22E = 5	5 mois
8	152 <= DEPB_22C <= 180 ou 22 <= DEPB_22D <= 26 ou DEPB_22E = 6	6 mois
9	181 <= DEPB_22C <= 211 ou 27 <= DEPB_22D <= 30 ou DEPB_22E = 7	7 mois
10	212 <= DEPB_22C <= 240 ou 31 <= DEPB_22D <= 34 ou DEPB_22E = 8	8 mois
11	241 <= DEPB_22C <= 271 ou 35 <= DEPB_22D <= 39 ou DEPB_22E = 9	9 mois
12	272 <= DEPB_22C <= 300 ou 40 <= DEPB_22D <= 44 ou DEPB_22E = 10	10 mois
13	301 <= DEPB_22C <= 331 ou 45 <= DEPB_22D <= 48 ou DEPB_22E = 11	11 mois
14	332 <= DEPB_22C <= 365 ou 49 <= DEPB_22D <= 52 ou DEPB_22E = 12 ou DEPB_22F = 1	1 an

15	366 <= DEPB_22C <= 900 et 53 <= DEPB_22D <= 104 ou 13 <= DEPB_22E <= 48 ou 2 <= DEPB_22F <= 4	2 à 4 ans
16	DEPB_22F > 4 et DEPB_22F <= SO	5 ans ou plus
ND	DEPB_22C = (NSP, R, ND) ou DEPB_22D = (NSP, R, ND) ou DEPB_22E = (NSP, R, ND) ou DEPB_22F = (NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

2) Durée de l'épisode dépressif le plus récent - Variable groupée

Nom de la variable : DEPBG23B

Basée sur : DEPB_23C (JOURS), DEPB_23D (SEMAINES), DEPB_23E (MOIS), DEPB_23F (ANNEES)

Description : Cette variable indique la longueur de l'épisode dépressif vécu le plus récemment par le répondant. Afin de s'assurer que les individus ne sont pas identifiables, des enregistrements ont été groupés.

Valeur de DEPBG23B	Condition(s)	Explication
SO	DEPB_23C = SO et DEPB_23D = SO et DEPB_23E = SO et DEPB_23F = SO	Sans objet
1	DEPB_23C <= 14 ou DEPB_23D = 2	2 semaines
2	15 <= DEPB_23C <= 21 ou DEPB_23D = 3	3 semaines (15 à 21 jours)
3	22 <= DEPB_23C <= 31 ou DEPB_23D = 4 ou DEPB_23E = 1	1 mois
4	32 <= DEPB_23C <= 60 ou 5 <= DEPB_23D <= 8 ou DEPB_23E = 2	2 mois
5	61 <= DEPB_23C <= 91 ou 9 <= DEPB_23D <= 13 ou DEPB_23E = 3	3 mois
6	92 <= DEPB_23C <= 120 ou 14 <= DEPB_23D <= 17 ou DEPB_23E = 4	4 mois
7	121 <= DEPB_23C <= 151 ou 18 <= DEPB_23D <= 21 ou DEPB_23E = 5	5 mois
8	152 <= DEPB_23C <= 180 ou 22 <= DEPB_23D <= 26 ou DEPB_23E = 6	6 mois
9	181 <= DEPB_23C <= 211 ou 27 <= DEPB_23D <= 30 ou DEPB_23E = 7	7 mois
10	212 <= DEPB_23C <= 240 ou 31 <= DEPB_23D <= 34 ou DEPB_23E = 8	8 mois
11	241 <= DEPB_23C <= 271 ou 35 <= DEPB_23D <= 39 ou DEPB_23E = 9	9 mois

12	272 <= DEPB_23C <= 300 ou 40 <= DEPB_23D <= 44 ou DEPB_23E = 10	10 mois
13	301 <= DEPB_23C <= 331 ou 45 <= DEPB_23D <= 48 ou DEPB_23E = 11	11 mois
14	332 <= DEPB_23C <= 365 ou 49 <= DEPB_23D <= 52 ou DEPB_23E = 12 ou DEPB_23F = 1	1 an
15	366 <= DEPB_23C <= 900 et 53 <= DEPB_23D <= 104 ou 13 <= DEPB_23E <= 48 ou 2 <= DEPB_23F <= 4	2 à 4 ans
16	DEPB_23F > 4 et DEPB_23F <= SO	5 ans ou plus
ND	DEPB_22C = (NSP, R, ND) ou DEPB_23D = (NSP, R, ND) ou DEPB_23E = (NSP, R, ND) ou DEPB_23F = (NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

3) Durée du premier épisode dépressif - Variable groupée

Nom de la variable : DEPBG7CA

Basée sur : DEPB_7CB (JOURS), DEPB_7CC (SEMAINES), DEPB_7CD (MOIS), DEPB_7CE (ANNEES)

Description : Cette variable indique la longueur (en années) du premier épisode dépressif vécu par le répondant.

Afin de s'assurer que les individus ne sont pas identifiables, des enregistrements ont été groupés.

Valeur de DEPBG7CA	Condition(s)	Explication
SO	DEPB_7CB = SO et DEPB_7CC = SO et DEPB_7CD = SO et DEPB_7CE = SO	Sans objet
1	DEPB_7CB <= 14 ou DEPB_7CC = 2	2 semaines
2	15 <= DEPB_7CB <= 21 ou DEPB_7CC = 3	3 semaines (15 à 21 jours)
3	22 <= DEPB_7CB <= 31 ou DEPB_7CD = 4 ou DEPB_7CE = 1	1 mois
4	32 <= DEPB_7CB <= 60 ou 5 <= DEPB_7CC <= 8 ou DEPB_7CD = 2	2 mois
5	61 <= DEPB_7CB <= 91 ou 9 <= DEPB_7CC <= 13 ou DEPB_7CD = 3	3 mois
6	92 <= DEPB_7CB <= 120 ou 14 <= DEPB_7CC <= 17 ou DEPB_7CD = 4	4 mois
7	121 <= DEPB_7CB <= 151 ou 18 <= DEPB_7CC <= 21 ou DEPB_7CD = 5	5 mois
8	152 <= DEPB_7CB <= 180 ou 22 <= DEPB_7CC <= 26 ou DEPB_7CD = 6	6 mois

9	181 <= DEPB_7CB <= 211 ou 27 <= DEPB_7CC <= 30 ou DEPB_7CD = 7	7 mois
10	212 <= DEPB_7CB <= 240 ou 31 <= DEPB_7CC <= 34 ou DEPB_7CD = 8	8 mois
11	241 <= DEPB_7CB <= 271 ou 35 <= DEPB_7CC <= 39 ou DEPB_7CD = 9	9 mois
12	272 <= DEPB_7CB <= 300 ou 40 <= DEPB_7CC <= 44 ou DEPB_7CD = 10	10 mois
13	301 <= DEPB_7CB <= 331 ou 45 <= DEPB_7CC <= 48 ou DEPB_7CD = 11	11 mois
14	332 <= DEPB_7CB <= 365 ou 49 <= DEPB_7CC <= 52 ou DEPB_7CD = 12 ou DEPB_7CE = 1	1 an
15	366 <= DEPB_7CB <= 900 et 53 <= DEPB_7CC <= 104 ou 13 <= DEPB_7CD <= 48 ou 2 <= DEPB_7CE <= 4	2 à 4 ans
16	DEPB_7CB > 4 et DEPB_7CB <= SO	5 ans ou plus
ND	DEPB_7CB = (NSP, R, ND) ou DEPB_7CC = (NSP, R, ND) ou DEPB_7CD = (NSP, R, ND) ou DEPB_7CE = (NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

4) Durée de l'unique épisode dépressif au cours des 12 derniers mois – Variable groupée

Nom de la variable : DEPBG8AA

Basée sur : DEPB_8AB (JOURS), DEPB_8AC (SEMAINES), DEPB_8AD (MOIS), DEPB_8AE (ANNEES)

Description : Cette variable indique la durée de l'unique épisode dépressif vécu par le répondant au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.

Afin de s'assurer que les individus ne sont pas identifiables, des enregistrements ont été groupés.

Valeur de DEPBG8AA	Condition(s)	Explication
SO	DEPB_8AB = SO et DEPB_8AC = SO et DEPB_8AD = SO et DEPB_8AE = SO	Sans objet
1	DEPB_8AB <= 14 ou DEPB_8AC = 2	2 semaines
2	15 <= DEPB_8AB <= 21 ou DEPB_8AC = 3	3 semaines (15 à 21 jours)
3	22 <= DEPB_8AB <= 31 ou DEPB_8AC = 4 ou DEPB_8AD = 1	1 mois
4	32 <= DEPB_8AB <= 60 ou 5 <= DEPB_8AC <= 8 ou DEPB_8AD = 2	2 mois

5	61 <= DEPB_8AB <= 91 ou 9 <= DEPB_8AC <= 13 ou DEPB_8AD = 3	3 mois
6	92 <= DEPB_8AB <= 120 ou 14 <= DEPB_8AC <= 17 ou DEPB_8AD = 4	4 mois
7	121 <= DEPB_8AB <= 151 ou 18 <= DEPB_8AC <= 21 ou DEPB_8AD = 5	5 mois
8	152 <= DEPB_8AB <= 180 ou 22 <= DEPB_8AC <= 26 ou DEPB_8AD = 6	6 mois
9	181 <= DEPB_8AB <= 211 ou 27 <= DEPB_8AC <= 30 ou DEPB_8AD = 7	7 mois
10	212 <= DEPB_8AB <= 240 ou 31 <= DEPB_8AC <= 34 ou DEPB_8AD = 8	8 mois
11	241 <= DEPB_8AB <= 271 ou 35 <= DEPB_8AC <= 39 ou DEPB_8AD = 9	9 mois
12	272 <= DEPB_8AB <= 300 ou 40 <= DEPB_8AC <= 44 ou DEPB_8AD = 10	10 mois
13	301 <= DEPB_8AB <= 331 ou 45 <= DEPB_8AC <= 48 ou DEPB_8AD = 11	11 mois
14	332 <= DEPB_8AB <= 365 ou 49 <= DEPB_8AC <= 52 ou DEPB_8AD = 12 ou DEPB_8AE = 1	1 an
15	366 <= DEPB_8AB <= 900 et 53 <= DEPB_8AC <= 104 ou 13 <= DEPB_8AD <= 48 ou 2 <= DEPB_8AE <= 4	2 à 4 ans
16	DEPB_8AE > 4 et DEPB_8AE <= SO	5 ans ou plus
ND	DEPB_8AB = (NSP, R, ND) ou DEPB_8AC = (NSP, R, ND) ou DEPB_8AD = (NSP, R, ND) ou DEPB_8AE = (NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

5) Durée du premier de plusieurs épisodes dépressifs au cours des 12 derniers mois - Variable groupée

Nom de la variable : DEPBG8BA

Basée sur : DEPB_8BB (JOURS), DEPB_8BC (SEMAINES), DEPB_8BD (MOIS), DEPB_8BE (ANNEES)

Description : Cette variable indique la durée du premier de plusieurs épisodes dépressifs vécu par le répondant au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.

Afin de s'assurer que les individus ne sont pas identifiables, des enregistrements ont été groupés.

Valeur de DEPBG8BA	Condition(s)	Explication
SO	DEPB_8BB = SO et DEPB_8BC = SO et DEPB_8BD = SO et DEPB_8BE = SO	Sans objet

1	DEPB_8BB =< 14 ou DEPB_8BC = 2	2 semaine
2	15 <= DEPB_8BB <= 21 ou DEPB_8BC = 3	3 semaine (15 à 21 jours)
3	22 <= DEPB_8BB <= 31 ou DEPB_8BC = 4 ou DEPB_8BD = 1	1 mois
4	32 <= DEPB_8BB <= 60 ou 5 <= DEPB_8BC <= 8 ou DEPB_8BD = 2	2 mois
5	61 <= DEPB_8BB <= 91 ou 9 <= DEPB_8BC <= 13 ou DEPB_8BD = 3	3 mois
6	92 <= DEPB_8BB <= 120 ou 14 <= DEPB_8BC <= 17 ou DEPB_8BD = 4	4 mois
7	121 <= DEPB_8BB <= 151 ou 18 <= DEPB_8BC <= 21 ou DEPB_8BD = 5	5 mois
8	152 <= DEPB_8BB <= 180 ou 22 <= DEPB_8BC <= 26 ou DEPB_8BD = 6	6 mois
9	181 <= DEPB_8BB <= 211 ou 27 <= DEPB_8BC <= 30 ou DEPB_8BD = 7	7 mois
10	212 <= DEPB_8BB <= 240 ou 31 <= DEPB_8BC <= 34 ou DEPB_8BD = 8	8 mois
11	241 <= DEPB_8BB <= 271 ou 35 <= DEPB_8BC <= 39 ou DEPB_8BD = 9	9 mois
12	272 <= DEPB_8BB <= 300 ou 40 <= DEPB_8BC <= 44 ou DEPB_8BD = 10	10 mois
13	301 <= DEPB_8BB <= 331 ou 45 <= DEPB_8BC <= 48 ou DEPB_8BD = 11	11 mois
14	332 <= DEPB_8BB <= 365 ou 49 <= DEPB_8BC <= 52 ou DEPB_8BD = 12 ou DEPB_8BE = 1	1 an
15	366 <= DEPB_8BB <= 900 et 53 <= DEPB_8BC <= 104 ou 13 <= DEPB_8BD <= 48 ou 2 <= DEPB_8BE <= 4	2 à 4 ans
16	DEPB_8BE > 4 et DEPB_8BE <= SO	5 ans ou plus
ND	DEPB_8BB = (NSP, R, ND) ou DEPB_8BC = (NSP, R, ND) ou DEPB_8BD = (NSP, R, ND) ou DEPB_8BE = (NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

6) Durée de l'épisode dépressif le plus long – Variable groupée

Nom de la variable : DEPB39A

Basée sur : DEPB_39B (JOURS), DEPB_39C (SEMAINES), DEPB_39D (MOIS), DEPB_39E (ANNEES)

Description : Cette variable indique la durée du plus long épisode dépressif majeur. Il convient de souligner que cette question n'a pas été posée à tous les répondants (par exemple, ceux qui n'ont déclaré qu'un seul épisode dépressif majeur au cours de la vie).

Afin de s'assurer que les individus ne sont pas identifiables, des enregistrements ont été groupés.

Valeur de DEPB39A	Condition(s)	Explication
SO	DEPB_39B = SO et DEPB_39C = SO et DEPB_39D = SO et DEPB_39E = SO	Sans objet
1	DEPB_39B <= 14 ou DEPB_39C = 2	2 semaines
2	15 <= DEPB_39B <= 21 ou DEPB_39C = 3	3 semaines (15 à 21 jours)
3	22 <= DEPB_39B <= 31 ou DEPB_39C = 4 ou DEPB_39D = 1	1 mois
4	32 <= DEPB_39B <= 60 ou 5 <= DEPB_39C <= 8 ou DEPB_39D = 2	2 mois
5	61 <= DEPB_39B <= 91 ou 9 <= DEPB_39C <= 13 ou DEPB_39D = 3	3 mois
6	92 <= DEPB_39B <= 120 ou 14 <= DEPB_39C <= 17 ou DEPB_39D = 4	4 mois
7	121 <= DEPB_39B <= 151 ou 18 <= DEPB_39C <= 21 ou DEPB_39D = 5	5 mois
8	152 <= DEPB_39B <= 180 ou 22 <= DEPB_39C <= 26 ou DEPB_39D = 6	6 mois
9	181 <= DEPB_39B <= 211 ou 27 <= DEPB_39C <= 30 ou DEPB_39D = 7	7 mois
10	212 <= DEPB_39B <= 240 ou 31 <= DEPB_39C <= 34 ou DEPB_39D = 8	8 mois
11	241 <= DEPB_39B <= 271 ou 35 <= DEPB_39C <= 39 ou DEPB_39D = 9	9 mois
12	272 <= DEPB_39B <= 300 ou 40 <= DEPB_39C <= 44 ou DEPB_39D = 10	10 mois
13	301 <= DEPB_39B <= 331 ou 45 <= DEPB_39C <= 48 ou DEPB_39D = 11	11 mois
14	332 <= DEPB_39B <= 365 ou 49 <= DEPB_39C <= 52 ou DEPB_39D = 12 ou DEPB_39E = 1	1 an

15	366 <= DEPB_39B <= 900 et 53 <= DEPB_39C <= 104 ou 13 <= DEPB_39D <= 48 ou 2 <= DEPB_39E <= 4	2 à 4 ans
16	DEPB_39E > 4 et DEPB_39E <= SO	5 ans ou plus
ND	DEPB_39B = (NSP, R, ND) ou DEPB_39C = (NSP, R, ND) ou DEPB_39D = (NSP, R, ND) ou DEPB_39E = (NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

7) Épisode dépressif majeur au cours de la vie - critère A, partie 1

Nom de la variable : DEPBDA1

Basée sur : DEPB_09, DEPB_12, DEPB_24A, DEPB_24B, DEPB_24C, DEPB_24D, DEPB_24E, DEPB_24F

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré l'apparition au cours de leur vie des symptômes de dépression qui ont persisté durant une même période de deux semaines et au moins un des symptômes est :

1. une humeur déprimée ou
2. une perte d'intérêt ou de plaisir.

Valeur de DEPBDA1	Condition(s)	Explication
1	(DEPB_09 = 1 ou DEPB_12 = 1) et (DEPB_24A = 1 ou DEPB_24B = 1 ou DEPB_24C = 1 ou DEPB_24D = 1 ou DEPB_24E = 1 ou DEPB_24F = 1)	Le répondant remplit le critère A, partie 1 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours de la vie. Le répondant a déclaré que les symptômes ont persisté durant une même période de deux semaines et qu'au moins un des symptômes était une humeur déprimée ou une perte d'intérêt ou de plaisir.
2	(DEPB_09 = 2, SO) et (DEPB_12 = 2, SO) ou (DEPB_24A = 2, SO) et (DEPB_24C = 2, SO) et (DEPB_24E = 2, SO) et (DEPB_24F = 2, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère A, partie 1 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré que les symptômes ont persisté durant une même période de deux semaines et qu'au moins un des symptômes était une humeur déprimée ou une perte d'intérêt ou de plaisir.
ND	(DEPB_09 = NSP, R, ND) ou (DEPB_12 = NSP, R, ND) ou (DEPB_24A = NSP, R, ND) ou (DEPB_24B = NSP, R, ND) ou (DEPB_24C = NSP, R, ND) ou (DEPB_24D = NSP, R, ND) ou (DEPB_24E = NSP, R, ND) ou (DEPB_24F = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

8) Épisode dépressif majeur au cours de la vie - critère A, partie 2

Nom de la variable : DEPBDA2

Basée sur : DEPBDA21, DEPBDA22, DEPBDA23, DEPBDA24, DEPBDA25, DEPBDA26, DEPBDA27, DEPBDA28, DEPBDA29

Description : Cette variable indique si le répondant a déclaré au moins cinq des neuf symptômes associés à la dépression. Ces symptômes doivent représenter un changement par rapport au fonctionnement antérieur. Les symptômes sont :

1. une humeur dépressive;
2. une diminution de l'intérêt pour les passe-temps ou les activités;
3. une perte ou un gain de poids significatif ou un changement de l'appétit;
4. une insomnie ou une hypersomnie;
5. une agitation ou un ralentissement psychomoteur;
6. une fatigue ou une perte d'énergie;
7. un sentiment de dévalorisation;
8. une diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer;
9. des pensées de mort récurrentes.

Les valeurs pour ces symptômes sont calculées ci-après, puis utilisées pour évaluer le critère.

8a) Symptôme 1 – humeur dépressive

Nom de la variable : DEPBDA21

Basée sur : DEPB_24A, DEPB_24B, DEPB_24C, DEPB_24D

Description : Cette variable identifie les répondants qui déclarent une humeur dépressive la majeure partie de la journée.

Valeur de DEPBDA21	Condition(s)	Explication
1	DEPB_24A = 1 ou DEPB_24B = 1 ou DEPB_24C = 1 ou DEPB_24D = 1	Le répondant a déclaré une humeur dépressive.
2	(DEPB_24A = 2, SO) et (DEPB_24C = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré d'humeur dépressive. Nota : DEPB_24B et DEPB_24D sont sautées si DEPB_24A et DEPB_24C = Non.
ND	(DEPB_24A = NSP, R, ND) ou (DEPB_24B = NSP, R, ND) ou (DEPB_24C = NSP, R, ND) ou (DEPB_24D = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

8b) Symptôme 2 – diminution de l'intérêt ou du plaisir pour la plupart des activités

Nom de la variable : DEPBDA22

Basée sur : DEPB_24E, DEPB_24F

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré une diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir pour toutes, ou presque toutes, les activités la majeure partie de la journée, presque tous les jours.

Valeur de DEPBDA22	Condition(s)	Explication
1	DEPB_24E = 1 ou DEPB_24F = 1	Le répondant a déclaré une diminution de l'intérêt ou du plaisir pour la plupart des activités.

2	(DEPB_24E = 2, SO) et (DEPB_24F = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré de diminution de l'intérêt ou du plaisir pour la plupart des activités.
ND	(DEPB_24E = NSP, R, ND) ou (DEPB_24F = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

8c) Symptôme 3 – perte ou gain de poids significatif ou changement de l'appétit

Nom de la variable : DEPBDA23

Basée sur : DEPB_26A, DEPB_26B, DEPB_26C, DEPB_261, DEPB_26D, DEPB_262, DEPB_26E, DEPB_263, DEPB_26F, DEPB_264

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré une perte ou un gain de poids significatif en l'absence d'un régime, ou une diminution ou une augmentation de l'appétit presque tous les jours. Un changement significatif de poids est défini comme correspondant à 10 livres/4 kg. Sont exclus les gains de poids dû à la grossesse et la perte de poids due à une maladie.

Valeur de DEPBDA23	Condition(s)	Explication
1	DEPB_26A = 1 ou DEPB_26B = 1 ou (DEPB_26C = 1 et DEPB_261 = 2 et 10 <= DEPB_26D <= 300 et DEPB_262 = 1) ou (DEPB_26C = 1 et DEPB_261 = 2 et 4 <= DEPB_26D <= 300 et DEPB_262 = 2) ou (DEPB_26E = 1 et DEPB_263 = 2 et 10 <= DEPB_26F <= 300 et DEPB_264 = 1) ou (DEPB_26E = 1 et DEPB_263 = 2 et 4 <= DEPB_26F <= 300 et DEPB_264 = 2)	Le répondant a déclaré une perte ou un gain significatif de poids ou un changement d'appétit.
2	(DEPB_26A = 2, SO) et (DEPB_26B = 2, SO) et [(DEPB_26C = 2, SO) et (DEPB_26E = 2, SO) ou DEPB_261 = 1 ou (DEPB_26D < 10 et DEPB_262 = 1) ou (DEPB_26D < 4 et DEPB_262 = 2) ou DEPB_263 = 1 ou (DEPB_26F < 10 et DEPB_264 = 1) ou (DEPB_26F < 4 et DEPB_264 = 2)]	Le répondant n'a pas déclaré de perte ni de gain significatif de poids ni un changement d'appétit.

ND	(DEPB_26A = NSP, R, ND) ou (DEPB_26B = NSP, R, ND) ou (DEPB_26C = NSP, R, ND) ou (DEPB_261 = NSP, R, ND) ou (DEPB_26D = NSP, R, ND) ou (DEPB_26E = NSP, R, ND) ou (DEPB_263 = NSP, R, ND) ou (DEPB_26F = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
----	---	--

8d) Symptôme 4 - insomnie ou hypersomnie**Nom de la variable :** DEPBDA24**Basée sur :** DEPB_26G, DEPB_26H

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré souffrir d'insomnie (difficulté à s'endormir ou à demeurer endormi ou réveil précoce) ou d'hypersomnie (sommeil plus long qu'à l'ordinaire) associée à la dépression.

Valeur de DEPBDA24	Condition(s)	Explication
1	DEPB_26G = 1 ou DEPB_26H = 1	Le répondant a déclaré une insomnie ou une hypersomnie.
2	(DEPB_26G = 2, SO) et (DEPB_26H = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré d'insomnie ni d'hypersomnie.
ND	(DEPB_26G = NSP, R, ND) ou (DEPB_26H = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

8e) Symptôme 5 – agitation ou ralentissement psychomoteur**Nom de la variable :** DEPBDA25**Basée sur :** DEPB_26M, DEPB_26O

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré des modifications psychomotrices comprenant une agitation (p. ex., impossibilité de rester en place) ou un ralentissement (p. ex., lenteur du discours ou des mouvements) observables par les autres.

Valeur de DEPBDA25	Condition(s)	Explication
1	DEPB_26M = 1 ou DEPB_26O = 1	Le répondant a déclaré une agitation ou un ralentissement psychomoteur.
2	(DEPB_26M = 2, SO) et (DEPB_26O = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré d'agitation ni de ralentissement psychomoteur.
ND	(DEPB_26M = NSP, R, ND) ou (DEPB_26O = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

8f) Symptôme 6 – fatigue ou perte d'énergie**Nom de la variable :** DEPBDA26**Basée sur :** DEPB_26J**Description :** Cette variable identifie les répondants qui déclarent une fatigue ou une diminution de l'énergie presque tous les jours.

Valeur de DEPBDA26	Condition(s)	Explication
1	DEPB_26J = 1	Le répondant a déclaré une fatigue ou une diminution de l'énergie.
2	(DEPB_26J = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré de fatigue ni de diminution de l'énergie.
ND	(DEPB_26J = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

8g) Symptôme 7 – sentiment de dévalorisation**Nom de la variable :** DEPBDA27**Basée sur :** DEPB_26V**Description :** Cette variable identifie les répondants qui déclarent un sentiment de dévalorisation pratiquement tous les jours.

Valeur de DEPBDA27	Condition(s)	Explication
1	DEPB_26V = 1	Le répondant a déclaré un sentiment de dévalorisation.
2	(DEPB_26V = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré de sentiment de dévalorisation.
ND	(DEPB_26V = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

8h) Symptôme 8 – diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer**Nom de la variable :** DEPBDA28**Basée sur :** DEPB_26P, DEPB_26R, DEPB_26S**Description :** Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré une diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer presque tous les jours.

Valeur de DEPBDA28	Condition(s)	Explication
1	DEPB_26P = 1 ou DEPB_26R = 1 ou DEPB_26S = 1	Le répondant a déclaré une diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer.
2	(DEPB_26P = 2, SO) et (DEPB_26R = 2, SO) et (DEPB_26S = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré de diminution de l'aptitude à penser ni à se concentrer.
ND	(DEPB_26P = NSP, R, ND) ou (DEPB_26R = NSP, R, ND) ou (DEPB_26S = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

8i) Symptôme 9 – pensées de mort récurrentes**Nom de la variable :** DEPBDA29**Basée sur :** DEPB_6A, DEPB_6B, DEPB_6C**Description :** Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré des pensées de mort récurrentes.

Valeur de DEPBDA29	Condition(s)	Explication
1	DEPB_6A = 1 ou DEPB_6B = 1 ou DEPB_6C = 1	Le répondant a déclaré des pensées de mort récurrentes.
2	(DEPB_6A = 2, SO) et (DEPB_6B = 2, SO) et (DEPB_6C = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré de pensées de mort récurrentes.
ND	(DEPB_6A = NSP, R, ND) ou (DEPB_6B = NSP, R, ND) ou (DEPB_6C = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

Évaluation du critère A, partie 2

Valeur de DEPBDA2	Condition(s)	Explication
1	Au moins 5 de (DEPBDA21, DEPBDA22, DEPBDA23, DEPBDA24, DEPBDA25, DEPBDA26, DEPBDA27, DEPBDA28 ou DEPBDA29) = 1	Le répondant remplit le critère A, partie 2 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours de la vie. Le répondant a déclaré au moins cinq symptômes associés à la dépression qui représentent un changement par rapport au fonctionnement antérieur.
2	Au moins 5 de (DEPBDA21, DEPBDA22, DEPBDA23, DEPBDA24, DEPBDA25, DEPBDA26, DEPBDA27, DEPBDA28 ou DEPBDA29) = 2	Le répondant ne répond pas au critère A, partie 2 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré au moins cinq symptômes associés à la dépression.
ND	DEPBDA21 = ND ou DEPBDA22 = ND ou DEPBDA23 = ND ou DEPBDA24 = ND ou DEPBDA25 = ND ou DEPBDA26 = ND ou DEPBDA27 = ND ou DEPBDA28 = ND ou DEPBDA29 = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

9) Épisode dépressif majeur au cours de la vie - critère A (parties 1 et 2 combinées)**Nom de la variable :** DEPBDA**Basée sur :** DEPBDA1, DEPBDA2**Description :** Cette variable indique si le répondant remplit le critère A de l'algorithme ESCC 1.2/WMH-CIDI d'un épisode dépressif majeur au cours de la vie. Le critère est rempli si le répondant déclare :

1. une humeur dépressive ou une perte d'intérêt ou de plaisir ayant persisté au moins deux semaines et
2. au moins cinq symptômes associés à la dépression qui représentent un changement de fonctionnement.

Valeur de DEPBDA	Condition(s)	Explication
1	DEPBDA1 = 1 et DEPBDA2 = 1	Le répondant remplit le critère A de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours de la vie. Le répondant a déclaré une humeur dépressive ou une perte d'intérêt ou de plaisir ayant persisté pendant deux semaines ou plus et au moins cinq symptômes associés à la dépression.
2	DEPBDA1 = 2 ou DEPBDA2 = 2	Le répondant ne répond pas au critère A de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré d'humeur dépressive ni de perte d'intérêt ou de plaisir ayant persisté pendant deux semaines ou plus, ou n'a pas déclaré au moins cinq symptômes associés à la dépression.
ND	DEPBDA1 = ND ou DEPBDA2 = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

10) Épisode dépressif majeur au cours de la vie - critère C, partie 1**Nom de la variable :** DEPBDC1**Basée sur :** DEPB_17, DEPB_18, DEPB_19, DEPB_24B**Description :** Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré que leurs symptômes dépressifs au cours de la vie ont causé une détresse cliniquement significative.

Valeur de DEPBDC1	Condition(s)	Explication
1	(DEPB_17 = 2, 3, 4) ou (DEPB_18 = 1, 2) ou (DEPB_19 = 1, 2, 3) ou DEPB_24B = 1	Le répondant remplit le critère C, partie 1 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours de la vie. Le répondant a déclaré que les symptômes causent une détresse cliniquement significative.

2	(DEPB_17 = 1, SO) et (DEPB_18 = 3, 4, SO) et (DEPB_19 = 4, SO) et (DEPB_24B = 2, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère C, partie 1 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré que les symptômes causent une détresse cliniquement significative.
ND	(DEPB_17 = NSP, R, ND) ou (DEPB_18 = NSP, R, ND) ou (DEPB_19 = NSP, R, ND) ou (DEPB_21 = NSP, R, ND) ou (DEPB_24B = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

11) Épisode dépressif majeur au cours de la vie - critère C, partie 2

Nom de la variable : DEPBDC2

Basée sur : DEPB_19, DEPB_28, DEPB_281, DEPB_28A, DEPB_68, DEPBDC64

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré que leurs symptômes dépressifs au cours de la vie ont induit une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.

11a) Perturbation sociale et professionnelle

Nom de la variable : DEPBDC64

Basée sur : DEPB_66A, DEPB_661, DEPB_662, DEPB_66C, DEPB_66D

Description : Cette variable indique si, durant la période d'un mois ou plus au cours des 12 derniers mois avant l'interview où les symptômes ont été les plus sévères, les sentiments dépressifs du répondant ont significativement troublé sa capacité vis-à-vis ses responsabilités au niveau des tâches ménagères, à l'école ou au travail, ou au niveau de sa capacité à établir et maintenir des relations proches avec les autres ou au niveau de sa vie sociale.

Valeur de DEPBDC64	Condition(s)	Explication
1	4 <= DEPB_66A <= 10 ou 4 <= DEPB_661 <= 10 ou 4 <= DEPB_662 <= 10 ou 4 <= DEPB_66C <= 10 ou 4 <= DEPB_66D <= 10	Le répondant a éprouvé une perturbation vis-à-vis ses responsabilités au niveau des tâches ménagères, à l'école ou au travail, ou au niveau de sa capacité à établir et maintenir des relations proches avec les autres ou au niveau de sa vie sociale.
2	[0 <= DEPB_66A <= 3 ou DEPB_66A = SO] et [0 <= DEPB_661 <= 3 ou (DEPB_661 = 11, SO)] et [0 <= DEPB_662 <= 3 ou (DEPB_662 = 11, SO)] et [0 <= DEPB_66C <= 3 ou DEPB_66C = SO] et [0 <= DEPB_66D <= 3 ou DEPB_66D = SO]	Le répondant n'a pas éprouvé de perturbation significative vis-à-vis ses responsabilités au niveau des tâches ménagères, à l'école ni au travail, ni au niveau de sa capacité à établir et maintenir des relations proches avec les autres ou au niveau de sa vie sociale.
ND	(DEPB_66A = NSP, R, ND) ou (DEPB_661 = NSP, R, ND) ou (DEPB_662 = NSP, R, ND) ou (DEPB_66C = NSP, R, ND) ou (DEPB_66D = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

Évaluation du critère C, partie 2

Valeur de DEPBDC2	Condition(s)	Explication
1	(DEPB_19 = 1, 2, 3) ou (DEPB_28 = 3, 4, 5) ou (DEPB_281 = 3, 4, 5) ou (DEPB_28A = 1, 2, 3) ou DEPBD664 = 1 ou $5 \leq \text{DEPB_68} < \text{SO}$	Le répondant remplit le critère C, partie 2 au cours de la vie. Le répondant a déclaré que les symptômes ont causé une altération de son fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.
2	(DEPB_19 = 4, SO) et (DEPB_28 = 1 ou DEPB_281 = 1 ou DEPB_28 = 2 et DEPB_28A = 4 ou DEPB_281 = 2 et DEPB_28A = 4 ou DEPB_28 = SO et DEPB_281 = SO) et [((DEPB_38 = 2, SO) ou DEPBD664 = 2) et ($0 \leq \text{DEPB_68} < 5$ ou DEPB_68 = SO)]	Le répondant ne remplit pas le critère C, partie 2 au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré d'altération de son fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.
ND	(DEPB_19 = NSP, R, ND) ou (DEPB_28 = NSP, R, ND) ou (DEPB_281 = NSP, R, ND) ou (DEPB_28A = NSP, R, ND) ou DEPBD664 = ND ou (DEPB_68 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul ou le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul.

12) Épisode dépressif majeur au cours de la vie - critère C, (parties 1 et 2 combinées)

Nom de la variable : DEPBDC

Basée sur : DEPBDC1, DEPBDC2

Description : Cette variable indique si le répondant remplit le critère C de l'algorithme de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours de la vie. Le critère est rempli si le répondant déclare :

1. que les symptômes ont causé une détresse cliniquement significative ou
2. une altération de son fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.

Valeur de DEPBDC	Condition(s)	Explication
1	DEPBDC1 = 1 ou DEPBDC2 = 1	Le répondant remplit le critère C, au cours de la vie. Le répondant a déclaré que les symptômes ont causé une détresse cliniquement significative ou une altération de son fonctionnement.

2	DEPBDC1 = 2 et DEPBDC2 = 2	Le répondant ne remplit pas le critère C, au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré que les symptômes ont causé une détresse cliniquement significative ou une altération de son fonctionnement.
ND	DEPBDC1 = ND ou DEPBDC2 = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

13) Épisode dépressif majeur au cours de la vie - critère E, partie 1

Nom de la variable : DEPBDE1

Basée sur : DEPB_30, DEPB_30A

Description : Le critère E, partie 1 est que les épisodes dépressifs majeurs au cours de la vie n'ont pas été toujours expliqués par le deuil (p. ex, précédés par le décès d'une personne proche). Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré que leurs symptômes n'ont pas toujours été précédés par le décès d'une personne proche.

Valeur de DEPBDE1	Condition(s)	Explication
1	DEPB_30 = 2 ou DEPB_30A = 2	Le répondant remplit le critères E, partie 1 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré que les symptômes étaient toujours associés à un deuil.
2	(DEPB_30A = 1, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère E, partie 1 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours de la vie. Le répondant a déclaré que les symptômes ont toujours été associés à un deuil ou la question ne lui a pas été posée
ND	(DEPB_30 = NSP, R, ND) ou (DEPB_30A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

14) Épisode dépressif majeur au cours de la vie - critère E, partie 2

Nom de la variable : DEPBDE2

Basée sur : DEPBDE21, DEPBDE22, DEPBDE23, DEPBDE24, DEPBDE25, DEPBDE26

Description : Le critère E, partie 2 est que, s'il y a eu un deuil, les symptômes ont duré plus de deux mois. Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré au cours de leur vie un épisode dépressif qui a duré plus de deux mois. Pour évaluer cela, on commence par créer une variable pour chaque épisode (p. ex., le pire, le premier, au cours des 12 derniers mois, le plus récent, le plus long) pour déterminer s'il a duré plus de deux mois.

14a) Pire épisode dépressif de plus de deux mois**Nom de la variable :** DEPBDE21**Basée sur :** DEPB_22B, DEPB_22C, DEPB_22D, DEPB_22E**Description :** Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré un pire épisode dépressif qui a duré plus de deux mois.

Valeur de DEPBDE21	Condition(s)	Explication
1	(DEPB_22B = 1 et $60 < \text{DEPB_22C} \leq 900$) ou (DEPB_22B = 2 et $8 < \text{DEPB_22D} \leq 104$) ou (DEPB_22B = 3 et $2 < \text{DEPB_22E} \leq 36$) ou DEPB_22B = 4	Le répondant a déclaré un pire épisode dépressif qui a duré plus de deux mois.
2	(DEPB_22B = 1 et $0 \leq \text{DEPB_22C} \leq 60$) ou (DEPB_22B = 2 et $0 \leq \text{DEPB_22D} \leq 8$) ou (DEPB_22B = 3 et $0 \leq \text{DEPB_22E} \leq 2$) ou DEPB_22B = SO	Le répondant n'a pas déclaré de pire épisode dépressif ayant duré plus de deux mois.
ND	(DEPB_22B = NSP, R, ND) ou (DEPB_22C = NSP, R, ND) ou (DEPB_22D = NSP, R, ND) ou (DEPB_22E = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

14b) Plus récent épisode dépressif de plus de deux mois**Nom de la variable :** DEPBDE22**Basée sur :** DEPB_23B, DEPB_23C, DEPB_23D, DEPB_23E**Description :** Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré un plus récent épisode dépressif ayant duré plus de deux mois.

Valeur de DEPBDE22	Condition(s)	Explication
1	(DEPB_23B = 1 et $60 < \text{DEPB_23C} \leq 900$) ou (DEPB_23B = 2 et $8 < \text{DEPB_23D} \leq 104$) ou (DEPB_23B = 3 et $2 < \text{DEPB_23E} \leq 36$) ou DEPB_23B = 4	Le répondant a déclaré que le plus récent épisode dépressif avait duré plus de deux mois.
2	(DEPB_23B = 1 et $0 \leq \text{DEPB_23C} \leq 60$) ou (DEPB_23B = 2 et $0 \leq \text{DEPB_23D} \leq 8$) ou (DEPB_23B = 3 et $0 \leq \text{DEPB_23E} \leq 2$) ou DEPB_23B = SO	Le répondant n'a pas déclaré que le plus récent épisode dépressif avait duré plus de deux mois.
ND	(DEPB_23B = NSP, R, ND) ou (DEPB_23C = NSP, R, ND) ou (DEPB_23D = NSP, R, ND) ou (DEPB_23E = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

14c) Premier épisode dépressif de plus de deux mois**Nom de la variable :** DEPBDE23**Basée sur :** DEPB_7CA, DEPB_7CB, DEPB_7CC, DEPB_7CD**Description :** Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré un tout premier épisode dépressif ayant duré plus de deux mois.

Valeur de DEPBDE23	Condition(s)	Explication
1	(DEPB_7CA = 1 et $60 < \text{DEPB_7CB} \leq 900$) ou (DEPB_7CA = 2 et $8 < \text{DEPB_7CC} \leq 104$) ou (DEPB_7CA = 3 et $2 < \text{DEPB_7CD} \leq 36$) ou DEPB_7CA = 4	Le répondant a déclaré que le tout premier épisode dépressif avait duré plus de deux mois.
2	(DEPB_7CA = 1 et $0 \leq \text{DEPB_7CB} \leq 60$) ou (DEPB_7CA = 2 et $0 \leq \text{DEPB_7CC} \leq 8$) ou (DEPB_7CA = 3 et $0 \leq \text{DEPB_7CD} \leq 2$) ou DEPB_7CA = SO	Le répondant n'a pas déclaré que le tout premier épisode dépressif avait duré plus de deux mois.
ND	(DEPB_7CA = NSP, R, ND) ou (DEPB_7CB = NSP, R, ND) ou (DEPB_7CC = NSP, R, ND) ou (DEPB_7CD = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

14d) Un seul épisode dépressif de plus de deux mois au cours des 12 derniers mois**Nom de la variable :** DEPBDE24**Basée sur :** DEPB_8AA, DEPB_8AB, DEPB_8AC, DEPB_8AD**Description :** Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré un seul épisode dépressif au cours des 12 derniers mois qui a duré plus de deux mois.

Valeur de DEPBDE24	Condition(s)	Explication
1	(DEPB_8AA = 1 et $60 < \text{DEPB_8AB} \leq 900$) ou (DEPB_8AA = 2 et $8 < \text{DEPB_8AC} \leq 104$) ou (DEPB_8AA = 3 et $2 < \text{DEPB_8AD} \leq 36$) ou DEPB_8AA = 4	Le répondant a déclaré un seul épisode dépressif au cours des 12 derniers mois qui a duré plus de deux mois.
2	(DEPB_8AA = 1 et $0 \leq \text{DEPB_8AB} \leq 60$) ou (DEPB_8AA = 2 et $0 \leq \text{DEPB_8AC} \leq 8$) ou (DEPB_8AA = 3 et $0 \leq \text{DEPB_8AD} \leq 2$) ou DEPB_8AA = SO	Le répondant n'a pas déclaré d'épisode dépressif au cours des 12 derniers mois qui a duré plus de deux mois.
ND	(DEPB_8AA = NSP, R, ND) ou (DEPB_8AB = NSP, R, ND) ou (DEPB_8AC = NSP, R, ND) ou (DEPB_8AD = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

14e) Plus récent épisode dépressif de plus de deux mois au cours des 12 derniers mois**Nom de la variable :** DEPBDE25**Basée sur :** DEPB_8BA, DEPB_8BB, DEPB_8BC, DEPB_8BD**Description :** Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré le plus récent épisode dépressif au cours des 12 derniers mois qui a duré plus de deux mois.

Valeur de DEPBDE25	Condition(s)	Explication
1	(DEPB_8BA = 1 et $60 < \text{DEPB_8BB} \leq 900$) ou (DEPB_8BA = 2 et $8 < \text{DEPB_8BC} \leq 104$) ou (DEPB_8BA = 3 et $2 < \text{DEPB_8BD} \leq 36$) ou DEPB_8BA = 4	Le répondant a déclaré le plus récent épisode dépressif au cours des 12 derniers mois qui a duré plus de deux mois.
2	(DEPB_8BA = 1 et $0 \leq \text{DEPB_8BB} \leq 60$) ou (DEPB_8BA = 2 et $0 \leq \text{DEPB_8BC} \leq 8$) ou (DEPB_8BA = 3 et $0 \leq \text{DEPB_8BD} \leq 2$) ou DEPB_8BA = SO	Le répondant n'a pas déclaré un plus récent épisode dépressif au cours des 12 derniers mois qui a duré plus de deux mois.
ND	(DEPB_8BA = NSP, R, ND) ou (DEPB_8BB = NSP, R, ND) ou (DEPB_8BC = NSP, R, ND) ou (DEPB_8BD = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

14f) Plus long épisode dépressif de plus de deux mois**Nom de la variable :** DEPBDE26**Basée sur :** DEPB_39A, DEPB_39B, DEPB_39C, DEPB_39D**Description :** Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré que leur épisode dépressif le plus long avait duré plus de deux mois.

Valeur de DEPBDE26	Condition(s)	Explication
1	(DEPB_39A = 1 et $60 < \text{DEPB_39B} \leq 900$) ou (DEPB_39A = 2 et $8 < \text{DEPB_39C} \leq 104$) ou (DEPB_39A = 3 et $2 < \text{DEPB_39D} \leq 36$) ou DEPB_39A = 4	Le répondant a déclaré que l'épisode dépressif le plus long a duré plus de deux mois.
2	(DEPB_39A = 1 et $0 \leq \text{DEPB_39B} \leq 60$) ou (DEPB_39A = 2 et $0 \leq \text{DEPB_39C} \leq 8$) ou (DEPB_39A = 3 et $0 \leq \text{DEPB_39D} \leq 2$) ou DEPB_39A = SO	Le répondant n'a pas déclaré que l'épisode dépressif le plus long a duré plus de deux mois.
ND	(DEPB_39A = NSP, R, ND) ou (DEPB_39B = NSP, R, ND) ou (DEPB_39C = NSP, R, ND) ou (DEPB_39D = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

Évaluation du critère E, partie 2

Valeur de DEPBDE2	Condition(s)	Explication
1	DEPBDE21 = 1 ou DEPBDE22 = 1 ou DEPBDE23 = 1 ou DEPBDE24 = 1 ou DEPBDE25 = 1 ou DEPBDE26 = 1	Le répondant remplit le critère E, partie 2 au cours de la vie. Le répondant a déclaré un épisode dépressif ayant duré plus de deux mois.
2	DEPBDE21 = 2 et DEPBDE22 = 2 et DEPBDE23 = 2 et DEPBDE24 = 2 et DEPBDE25 = 2 et DEPBDE26 = 2	Le répondant ne remplit pas le critère E, partie 2 au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré d'épisode dépressif ayant duré plus de deux mois.
ND	DEPBDE21 = ND ou DEPBDE22 = ND ou DEPBDE23 = ND ou DEPBDE24 = ND ou DEPBDE25 = ND ou DEPBDE26 = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

15) Épisode dépressif majeur au cours de la vie - critère E, partie 3

Nom de la variable : DEPBDE3

Basée sur : DEPBDE3A, DEPBDE3B, DEPBDE3C, DEPBDE3E

Description : Le critère E, partie 3 est que, s'il existe un deuil, les symptômes au cours de la vie sont caractérisés par :

1. une altération marquée du fonctionnement,
2. des préoccupations morbides de dévalorisation,
3. des idées suicidaires et
4. un ralentissement psychomoteur.

Pour procéder à cette évaluation, on commence par créer des variables pour les diverses composantes.

15a) Perturbation sociale et professionnelle

Nom de la variable : DEPBD667

Basée sur : DEPB_66A, DEPB_661, DEPB_662, DEPB_66C, DEPB_66D

Description : Cette variable indique les répondants qui ont déclaré que les sentiments associés à la dépression troublaient significativement leurs activités à la maison, à l'école ou au travail ou au niveau de sa capacité à établir et maintenir des relations proches avec les autres ou au niveau de sa vie sociale.

Valeur de DEPBD667	Condition(s)	Explication
1	7 <= DEPB_66A <= 10 ou 7 <= DEPB_661 <= 10 ou 7 <= DEPB_662 <= 10 ou 7 <= DEPB_66C <= 10 ou 7 <= DEPB_66D <= 10	Le répondant a déclaré un trouble significatif de ses activités à la maison, au travail ou à l'école ou au niveau de sa capacité à établir et maintenir des relations proches avec les autres ou au niveau de sa vie sociale.

2	(0 <= DEPB_66A <= SO ou DEPB_66A = SO) et [0 <= DEPB_661 <= SO ou (DEPB_661 = 11, SO)] et [0 <= DEPB_662 <= SO ou (DEPB_662 = 11, SO)] et (0 <= DEPB_66C <= SO ou DEPB_66C = SO) et (0 <= DEPB_66D <= SO ou DEPB_66D = SO)	Le répondant n'a pas déclaré un trouble significatif de ses activités à la maison, au travail ou à l'école ni de ses au niveau de sa capacité à établir et maintenir des relations proches avec les autres ou au niveau de sa vie sociale.
ND	(DEPB_66A = NSP, R, ND) ou (DEPB_661 = NSP, R, ND) ou (DEPB_662 = NSP, R, ND) ou (DEPB_66C = NSP, R, ND) ou (DEPB_66D = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

15b) Altération du fonctionnement**Nom de la variable :** DEPBDE3A**Basée sur :** DEPB_19, DEPB_28, DEPB_281, DEPB_28A, DEPB667, DEPB_68**Description :** Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré une altération marquée du fonctionnement associée à la dépression.

Valeur de DEPBDE3A	Condition(s)	Explication
1	DEPB_19 = 1 ou (DEPB_28 = 4, 5) ou (DEPB_281 = 4, 5) ou (DEPB_28A = 1, 2) ou DEPB667 = 1 ou 10 <= DEPB_68 < SO	Le répondant a déclaré une altération marquée de son fonctionnement associée à la dépression.
2	(DEPB_19 = 2, 3, 4, SO) et ((DEPB_28 = 1 ou (DEPB_28 = 2, 3) et (DEPB_28A = 3, 4)) ou (DEPB_281 = 1 ou (DEPB_281 = 2, 3) et (DEPB_28A = 3, 4)) ou DEPB_28 = SO et DEPB_281 = SO) et DEPB667 = 2 et (DEPB_68 < 10 ou DEPB_68 = SO)	Le répondant n'a pas déclaré d'altération marquée de son fonctionnement associée à la dépression.
ND	(DEPB_19 = NSP, R, ND) ou (DEPB_28 = NSP, R, ND) ou (DEPB_281 = NSP, R, ND) ou (DEPB_28A = NSP, R, ND) ou (DEPB667 = NSP, R, ND) ou (DEPB_68 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul ou le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul.

15c) Préoccupations de dévalorisation**Nom de la variable :** DEPBDE3B**Basée sur :** DEPB_26V**Description :** Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré des préoccupations de dévalorisation associées à la dépression.

Valeur de DEPBDE3B	Condition(s)	Explication
1	DEPB_26V = 1	Le répondant a déclaré des préoccupations de dévalorisation associées à la dépression.
2	(DEPB_26V = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré de préoccupations de dévalorisation.
ND	(DEPB_26V = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

15d) Idées suicidaires**Nom de la variable :** DEPBDE3C**Basée sur :** DEPB_A**Description :** Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré des idées suicidaires.

Valeur de DEPBDE3C	Condition(s)	Explication
1	DEPB_A = 1	Le répondant a déclaré des idées suicidaires.
2	(DEPB_A = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré d'idées suicidaires.
ND	(DEPB_A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

15e) Ralentissement psychomoteur**Nom de la variable :** DEPBDE3E**Basée sur :** DEPB_26L, DEPB_26M**Description :** Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré un ralentissement psychomoteur associé à la dépression.

Valeur de DEPBDE3E	Condition(s)	Explication
1	DEPB_26L = 1 ou DEPB_26M = 1	Le répondant a déclaré un ralentissement psychomoteur.
2	(DEPB_26L = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré de ralentissement psychomoteur. Nota : Si DEPB_26L est Non (2), DEPB_26M est sautée.
ND	(DEPB_26L = NSP, R, ND) ou (DEPB_26M = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

Évaluation du critère E, partie 3

Valeur de DEPBDE3	Condition(s)	Explication
1	DEPBDE3A = 1 ou DEPBDE3B = 1 ou DEPBDE3C = 1 ou DEPBDE3E = 1	Le répondant remplit le critères E, partie 3 de dépression au cours de la vie. Le répondant a déclaré une altération marquée du fonctionnement, des préoccupations de dévalorisation, des idées suicidaires ou un ralentissement psychomoteur associés à la dépression.
2	DEPBDE3A = 2 et DEPBDE3B = 2 et DEPBDE3C = 2 et DEPBDE3E = 2	Le répondant ne remplit pas le critère E, partie 3 de dépression au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré d'altération marquée du fonctionnement, de préoccupations de dévalorisation, d'idées suicidaires, ni de ralentissement psychomoteur.
ND	DEPBDE3A = ND ou DEPBDE3B = ND ou DEPBDE3C = ND ou DEPBDE3E = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

16) Épisode dépressif majeur au cours de la vie - critère E (parties 1, 2, et 3 combinées)

Nom de la variable : DEPBDE

Basée sur : DEPBDE1, DEPBDE2, DEPBDE3

Description : Cette variable indique si le répondant remplit le critère E de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI d'un épisode dépressif majeur au cours de la vie. Le critère est rempli si le répondant déclare :

1. que ses épisodes dépressifs n'étaient pas tous associés à un deuil (p. ex., survenus après la mort d'une personne proche), ou
2. qu'il a vécu un épisode dépressif ayant duré plus de deux mois ou
3. qu'un épisode a été caractérisé par une altération marquée du fonctionnement, des préoccupations de dévalorisation, des idées suicidaires ou un ralentissement psychomoteur.

Valeur de DEPBDE	Condition(s)	Explication
1	DEPBDE1 = 1 ou DEPBDE2 = 1 ou DEPBDE3 = 1	Le répondant remplit le critère E de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours de la vie. Le répondant a déclaré (1) que les épisodes ne sont pas tous associés à un deuil, ou (2) que les symptômes persistent pendant plus de deux mois, ou (3) que les symptômes sont caractérisés par une altération marquée du fonctionnement, des préoccupations de dévalorisation, des idées suicidaires ou un ralentissement psychomoteur.
2	DEPBDE1 = 2 et DEPBDE2 = 2 et DEPBDE3 = 2	Le répondant ne remplit pas le critère E de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours de la vie. Le répondant a déclaré (1) un deuil et (2) qu'aucun épisode n'a duré plus de deux mois et (3) que les symptômes ne sont pas caractérisés par une altération marquée du fonctionnement, des préoccupations morbides de dévalorisation, des idées suicidaires ou un ralentissement psychomoteur.
ND	DEPBDE1 = ND ou DEPBDE2 = ND ou DEPBDE3 = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

17) Algorithme pour un épisode dépressif majeur au cours de la vie

Nom de la variable : DEPBDDPS

Basée sur : DEPBDA, DEPBDC, DEPBDE

Description : Il s'agit de la variable finale qui indique si les répondants remplissent ou non les critères de l'algorithme l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un épisode dépressif majeur au cours de la vie. Les répondants qui remplissent les critères ont déclaré :

1. une humeur déprimée ou une perte d'intérêt ou de plaisir d'une durée de deux semaines ou plus et au moins cinq symptômes associés à la dépression qui représentent un changement par rapport au fonctionnement antérieur,
2. que les symptômes induisent une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants et
3. que les symptômes ne sont pas mieux expliqués par un deuil, ou qu'ils persistent pendant plus de deux mois ou qu'ils s'accompagnent d'une altération marquée du fonctionnement, de préoccupations morbides de dévalorisation, d'idées suicidaires ou d'un ralentissement psychomoteur.

Valeur de DEPBDDPS	Condition(s)	Explication
1	DEPBDA = 1 et DEPBDC = 1 et DEPBDE = 1	Le répondant remplit les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un épisode dépressif majeur au cours de la vie.
2	DEPBDA = 2 ou DEPBDC = 2 ou DEPBDE = 2	Le répondant ne remplit pas les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un épisode dépressif majeur au cours de la vie.
ND	DEPBDA = ND ou DEPBDC = ND ou DEPBDE = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

18) Épisode dépressif majeur - âge au moment de l'apparition - Variable groupée

Nom de la variable : DEPBGON

Basée sur : DEPB_22, DEPB_22A, DEPB_23A, DEPB_37A, DEPB_37B, DEPBDDPS

Description : L'âge de l'apparition de l'épisode dépressif majeur est l'âge qu'avait le répondant au début du premier épisode déclaré de dépression. La variable est calculée uniquement pour les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un épisode dépressif majeur.

Des enregistrements ont été regroupés par tranche d'âge afin d'assurer la confidentialité. Voir dictionnaire de données

Valeur de DEPBGON	Condition(s)	Explication
SO	(DEPBDDPS = 2)	Le répondant ne remplit pas les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un épisode dépressif majeur.
ND	(DEPB_37B = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
Valeur minimale à (DEPB_22A, DEPB_37A, DEPB_37B) (min : 0; max : Âge actuel)	DEPBDDPS = 1 et DEPB_22 = 1 et (DEPB_22A < 996 ou DEPB_37A < 996 ou DEPB_37B < 996)	Âge du répondant au moment du premier épisode dépressif majeur.

Valeur minimale à (DEPB_23A, DEPB_37A, DEPB_37B) (min : 0; max : Âge actuel)	DEPBDDPS = 1 et (DEPB_22 = 2, NSP, R, ND) et (DEPB_23A < SO ou DEPB_37A < SO ou DEPB_37B < SO)	Âge du répondant au moment du premier épisode dépressif majeur.
ND	DEPBDDPS = ND ou (DEPB_22 = NSP, R, ND) ou (DEPB_22A = NSP, R, ND) ou (DEPB_23A = NSP, R, ND) ou (DEPB_37B = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non- réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

19) Épisode dépressif majeur - âge lors du plus récent - Variable groupée

Nom de la variable : DEPBGREC

Basée sur : DEPB_22A, DEPB_23A, DEPB_37A, DEPB_38, DEPB_38C, DEPBDDPS, DHHB_AGE

Description : Cette variable indique l'âge du répondant lors de l'épisode dépressif majeur le plus récent. La valeur de la variable n'est calculée que pour les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un épisode dépressif majeur.

Des enregistrements ont été regroupés par tranche d'âge afin d'assurer la confidentialité. Voir dictionnaire de données.

Valeur de DEPBGREC	Condition(s)	Explication
SO	(DEPBDDPS = 2)	Le répondant ne remplit pas les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un épisode dépressif majeur.
ND	(DEPB_23A = NSP, R, ND) et (DEPB_38C = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
DHHB_AGE	DEPB_38 = 1 et DEPBDDPS = 1	L'âge au moment du plus récent épisode est l'âge courant.
Valeur maximale à (DEPB_22A, DEPB_23A, DEPB_37A, DEPB_37B, DEPB_38C) lorsque < SO (min : 0; max : Âge actuel)	DEPBDDPS = 1 et (DEPB_38 = 2, NSP, R) et (DEPB_22A < SO ou DEPB_23A < SO ou DEPB_37A < SO ou DEPB_37B < SO ou DEPB_38C < SO)	L'âge au moment du plus récent épisode est l'âge le plus récent pour tous les épisodes dépressifs rapportés.
ND	DEPBDDPS = ND ou (DEPB_22A = NSP, R, ND) ou (DEPB_23A = NSP, R, ND) ou (DEPB_37A = NSP, R, ND) ou (DEPB_37B = NSP, R, ND) ou (DEPB_38C = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non- réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

20) Épisode dépressif majeur - persistance de la dépression (en années) - Variable groupée

Nom de la variable : DEPBGP

Basée sur : DEPBG22B, DEPBG23B, DEPBG7CA, DEPBG8AA, DEPBG8BA, DEPBG39A, DEPBDDPS

Description : Cette variable indique le plus long épisode de dépression majeur vécu par le répondant. Sa valeur est calculée uniquement pour les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un épisode dépressif majeur.

Des enregistrements ont été regroupés par tranche de durée afin d'assurer la confidentialité. Voir dictionnaire de données.

Valeur de DEPBGP	Condition(s)	Explication
SO	(DEPBDDPS = 2)	Le répondant ne remplit pas les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'épisode dépressif majeur.
ND	DEPBG39A = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul.
Valeur maximale à (DEPBG22B, DEPBG23B, DEPBG7CA, DEPBG8AA, DEPBG8BA, DEPBG39A) (min : 0; max : Âge actuel)	DEPBDDPS = 1 et (DEPBG22B < SO ou DEPBG23B < SO ou DEPBG7CA < SO ou DEPBG8AA < SO ou DEPBG8BA < SO ou DEPBG39A < SO)	Durée de l'épisode dépressif le plus long vécu par le répondant. Minimum de 2 semaines jusqu'à un maximum de 5 ans ou plus.
ND	DEPBDDPS = ND ou DEPBG22B = ND ou DEPBG23B = ND ou DEPBG7CA = ND ou DEPBG8AA = ND ou DEPBG8BA = ND ou DEPBG39A = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

Épisode dépressif majeur– 12 derniers mois

21) Épisode dépressif majeur au cours des 12 derniers mois - critère A

Nom de la variable : DEPBDA

Basée sur : DEPBDDPS

Description : Cette variable identifie les répondants qui remplissent les critères de l'épisode dépressif majeur au cours de la vie.

Valeur de DEPBDA	Condition(s)	Explication
1	DEPBDDPS = 1	Le répondant remplit le critère A de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours des 12 derniers mois. Le répondant remplit les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un épisode dépressif majeur au cours de la vie.
2	DEPBDDPS = 2	Le répondant ne remplit pas le critère A de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours des 12 derniers mois. Le répondant ne remplit pas les critères pour un épisode dépressif majeur au cours de la vie.

ND	DEPBDDPS = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul.
----	---------------	--

22) Épisode dépressif majeur au cours des 12 derniers mois - critère B

Nom de la variable : DEPBDYB

Basée sur : DEPB_22A, DEPB_23A, DEPB_37A, DEPB_37B, DEPB_38, DEPB_38C, DHHB_AGE

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir vécu un épisode dépressif majeur au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.

Valeur de DEPBDYB	Condition(s)	Explication
1	DEPB_38 = 1 ou DEPB_22A = DHHB_AGE ou DEPB_23A = DHHB_AGE ou DEPB_37A = DHHB_AGE ou DEPB_37B = DHHB_AGE ou DEPB_38C = DHHB_AGE	Le répondant remplit le critère B de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours des 12 derniers mois. Le répondant a déclaré avoir vécu un épisode dépressif majeur au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.
2	(DEPB_38 = 2, SO) et DEPB_22A < DHHB_AGE ou DEPB_22A = SO et DEPB_23A < DHHB_AGE ou DEPB_23A = SO et DEPB_37A < DHHB_AGE ou DEPB_37A = SO et DEPB_37B < DHHB_AGE ou DEPB_37B = SO et DEPB_38C < DHHB_AGE ou DEPB_38C = SO	Le répondant ne remplit pas le critère B de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours des 12 derniers mois. Le répondant n'a pas déclaré avoir vécu un épisode dépressif majeur au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.
ND	(DEPB_38 = NSP, R, ND) ou (DEPB_22A = NSP, R, ND) ou (DEPB_23A = NSP, R, ND) ou (DEPB_37A = NSP, R, ND) ou (DEPB_37B = NSP, R, ND) ou (DEPB_38C = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

23) Épisode dépressif au cours des 12 derniers mois - critère C

Nom de la variable : DEPBDYC

Basée sur : DEPB_64A, DEPB_64B, DEPB_64C, DEPB_65A, DEPB_65B, DEPB_65C, DEPB_65D, DEPB_66A, DEPB_661, DEPB_662, DEPB_66C, DEPB_66D, DEPB_68, DEPB_86

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré des symptômes qui induisent une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.

Valeur de DEPBDYC	Condition(s)	Explication
1	[DEPB_64A = 3, 4) ou (DEPB_64B = 1, 2) ou (DEPB_64C = 3, 4) ou (DEPB_65A = 3, 4) ou (DEPB_65B = 3, 4) ou (DEPB_65C = 3, 4) ou (DEPB_65D = 3, 4)] ou (4 ≤ DEPB_66A ≤ 10 ou 4 ≤ DEPB_661 ≤ 10 ou 4 ≤ DEPB_662 ≤ 10 ou 4 ≤ DEPB_66C ≤ 10 ou 4 ≤ DEPB_66D ≤ 10 ou 5 ≤ DEPB_68 ≤ 365 ou DEPB_86 = 1)	Le répondant remplit le critère C de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un épisode au cours des 12 derniers mois. Le répondant a déclaré une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.
2	(DEPB_64A = 1, 2, SO) et (DEPB_64B = 3, 4, SO) et (DEPB_64C = 1, 2, SO) et (DEPB_65A = 1, 2, SO) et (DEPB_65B = 1, 2, SO) et (DEPB_65C = 1, 2, SO) et (DEPB_65D = 1, 2, SO) et (0 ≤ DEPB_66A ≤ 3 ou DEPB_66A = SO) et (0 ≤ DEPB_661 ≤ 3 ou DEPB_661 = 11, SO) et (0 ≤ DEPB_662 ≤ 3 ou DEPB_662 = 11, SO) et (0 ≤ DEPB_66C ≤ 3 ou DEPB_66C = SO) et (0 ≤ DEPB_66D ≤ 3 ou DEPB_66D = SO) et (0 ≤ DEPB_68 ≤ 4 ou DEPB_68 = SO) et (DEPB_86 = 2, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère C de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours des 12 derniers mois. Le répondant n'a pas déclaré de détresse cliniquement significative ni d'altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.

ND	(DEPB_64A = NSP, R, ND) ou (DEPB_64B = NSP, R, ND) ou (DEPB_64C = NSP, R, ND) ou (DEPB_65A = NSP, R, ND) ou (DEPB_65B = NSP, R, ND) ou (DEPB_65C = NSP, R, ND) ou (DEPB_65D = NSP, R, ND) ou (DEPB_66A = NSP, R, ND) ou (DEPB_661 = NSP, R, ND) ou (DEPB_662 = NSP, R, ND) ou (DEPB_66C = NSP, R, ND) ou (DEPB_66D = NSP, R, ND) ou (DEPB_68 = NSP, R, ND) ou (DEPB_86 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
----	---	--

24) Algorithme pour un épisode dépressif majeur au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : DEPBDDY

Basée sur : DEPBDDYA, DEPBDDYB, DEPBDDYC

Description : Il s'agit de la variable finale qui indique si le répondant remplit ou non les critères de l'algorithme l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un épisode dépressif majeur au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview. Les répondants qui remplissent les critères ont déclaré :

1. répondre aux critères d'un épisode dépressif majeur au cours de la vie,
2. avoir vécu un épisode dépressif majeur au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview et
3. une détresse cliniquement significative ou une altération de leur fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.

Valeur de DEPBDDY	Condition(s)	Explication
1	DEPBDDYA = 1 et DEPBDDYB = 1 et DEPBDDYC = 1	Tous les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI sont remplis pour l'épisode dépressif majeur au cours des 12 derniers mois. Le répondant a déclaré (1) remplir les critères pour le épisode dépressif majeur au cours de la vie, (2) avoir vécu un épisode dépressif majeur au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview, et (3) une détresse cliniquement significative ou une altération de son fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.

2	DEPBDYA = 2 ou DEPBDYB = 2 ou DEPBDYC = 2	Tous les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI ne sont pas remplis pour l'épisode dépressif majeur au cours des 12 derniers mois. Le répondant n'a pas déclaré (1) remplir les critères pour un épisode dépressif majeur au cours de la vie, (2) avoir vécu un épisode dépressif majeur au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview, ni (3) une détresse cliniquement significative ou une altération de son fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.
ND	DEPBDYA = ND ou DEPBDYB = ND ou DEPBDYC = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

25) Pensées suicidaires au cours de la vie

Nom de la variable : DEPBFSLT

Basée sur : DEPB_A, DEPB_A1

Description : Cette variable permet de classer le répondant selon qu'il a déjà pensé à se suicider au cours de sa vie.

Valeur de DEPBFSLT	Condition(s)	Explication
1	DEPB_A = 1 ou DEPB_A1 = 1	Le répondant a sérieusement pensé à se suicider.
2	DEPB_A1 = 2	Le répondant n'a jamais sérieusement pensé à se suicider. Nota : Si DEPB_A = 2, alors la question DEPB_A1 était posée.
ND	(DEPB_A1 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

26) Pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : DEPBFSYT

Basée sur : DEPB_A1A, DEPB_A1B, DEPBFSLT

Description : Cette variable permet de classer le répondant selon qu'il a pensé à se suicider au cours des 12 derniers mois.

Nota : Dans le questionnaire, la question demandant au répondant s'il avait pensé à se suicider au cours des 12 mois précédents n'a pas été posée à certains répondants. Pour ces répondants, une procédure d'imputation a été utilisée pour attribuer les valeurs pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois. La variable qui indique quels répondants ont fait l'objet de cette procédure d'imputation est IMPBFSYT. Pour plus d'information, voir le guide de l'utilisateur.

Valeur de DEPBFSYT	Condition(s)	Explication
1	DEPB_A1A = 1 ou DEPB_A1B = 1	Le répondant a sérieusement pensé à se suicider au cours des 12 derniers mois.

2	DEPBFSLT = 2 ou DEPB_A1A = 2 ou DEPB_A1B = 2	Le répondant n'a jamais sérieusement pensé à se suicider au cours des 12 derniers mois.
ND	(DEPB_A1A = NSP, R, ND) ou (DEPB_A1B = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
ND	DEPB_A1A = SO et DEPB_A1B = SO et DEPBFSLT = 1	Les questions nécessaires à ce calcul n'ont pas été posées au répondant à cause d'une erreur dans les spécifications du questionnaire.

27) Tentative de suicide au cours de la vie

Nom de la variable : DEPBFSLA

Basée sur : DEPB_C, DEPB_CB, DEPB_C1, DEPBFSLT

Description : Cette variable permet de classer le répondant selon qu'il a déjà fait une tentative de suicide au cours de sa vie.

Valeur de DEPBFSLA	Condition(s)	Explication
1	DEPB_C = 1 ou DEPB_CB = 1 ou DEPB_C1 = 1	Le répondant a déjà fait une tentative de suicide.
2	DEPBFSLT = 2 ou DEPB_CB = 2 ou DEPB_C1 = 2	Le répondant n'a jamais fait de tentative de suicide. Nota : Si DEPB_C = 2, alors la question DEPB_CB était posée.
ND	(DEPB_C = NSP, R, ND) ou (DEPB_CB = NSP, R, ND) ou (DEPB_C1 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

28) Tentative de suicide au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : DEPBFSYA

Basée sur : DEPB_C1A

Description : Cette variable permet de classer le répondant selon qu'il a déjà fait une tentative de suicide au cours des 12 derniers mois.

Nota : Dans le questionnaire, la question demandant au répondant s'il avait fait une tentative de suicide au cours des 12 mois précédents n'a pas été posée à certains répondants. Pour ces répondants, une procédure d'imputation a été utilisée pour attribuer les valeurs de tentatives de suicide au cours des 12 derniers mois. La variable qui indique quels répondants ont fait l'objet de cette procédure d'imputation est IMPBFSYA. Pour plus d'information, voir le guide de l'utilisateur.

Valeur de DEPBFSYA	Condition(s)	Explication
ND	DEPB_A = 1 et DEPB_C = 1 et DEPB_CA = 2	Les questions nécessaires à ce calcul n'ont pas été posées au répondant à cause d'une erreur dans les spécifications du questionnaire.
1	DEPB_C1A = 1	Le répondant a fait une tentative de suicide au cours des 12 derniers mois.
2	(DEPB_C1A = 2, SO)	Le répondant n'a pas fait de tentative de suicide au cours des 12 derniers mois.

ND	(DEPB_C1A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
----	-------------------------	--

29) Trouble attribuable à l'épisode dépressif majeur – Moyenne

Nom de la variable : DEPBDINT

Basée sur : DEPB_66A, DEPB_661, DEPB_662, DEPB_66C, DEPB_66D, DEPBDDY

Description : Cette variable décrit le trouble que l'épisode dépressif majeur a entraîné sur les activités et les responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s'agit d'une moyenne des cinq items. Cette variable n'est calculée que pour les répondants qui remplissent les critères d'un épisode dépressif majeur au cours des 12 derniers mois.

Valeur de DEPBDINT	Condition(s)	Explication
SO	DEPBDDY = 2	Le répondant ne remplissait pas les critères de dépression au cours des 12 derniers mois.
ND	DEPB_66A = SO et DEPB_661 = SO et DEPB_662 = SO et DEPB_66C = SO et DEPB_66D = SO	Le répondant a répondu avoir vécu un épisode de dépression majeure au cours des 12 derniers mois qui ont précédé l'interview mais les questions concernant l'épisode n'ont pas été posées au répondant parce qu'il y avait incohérence dans ses réponses.
ND	DEPBDDY = ND ou (DEPB_66A = NSP, R, ND) ou (DEPB_661 = NSP, R, ND) ou (DEPB_662 = NSP, R, ND) ou (DEPB_66C = NSP, R, ND) ou (DEPB_66D = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
$(DEPB_66A + DEPB_661 + DEPB_662 + DEPB_66C + DEPB_66D) / 5$ (min : 0.0; max : 10.0) (arrondir à .1)	DEPBDDY = 1 et $0 \leq DEPB_66A \leq 10$ et $0 \leq DEPB_661 \leq 10$ et $0 \leq DEPB_662 \leq 10$ et $0 \leq DEPB_66C \leq 10$ et $0 \leq DEPB_66D \leq 10$	Trouble = moyenne des cinq items. Le répondant a répondu aux cinq questions.
$(DEPB_66A + DEPB_662 + DEPB_66C + DEPB_66D) / 4$ (min : 0.0; max : 10.0) (arrondir à .1)	DEPBDDY = 1 et DEPB_661 = 11 et $0 \leq DEPB_662 \leq 10$ et $0 \leq DEPB_66A \leq 10$ et $0 \leq DEPB_66C \leq 10$ et $0 \leq DEPB_66D \leq 10$	Trouble = moyenne de quatre items qui s'appliquaient au répondant. DEPB_661 ne s'appliquait pas (c.-à-d. que le répondant n'a pas fréquenté l'école au cours des 12 derniers mois).
$(DEPB_66A + DEPB_661 + DEPB_66C + DEPB_66D) / 4$ (min : 0.0; max : 10.0) (arrondir à .1)	DEPBDDY = 1 et $0 \leq DEPB_661 \leq 10$ et DEPB_662 = 11 et $0 \leq DEPB_66A \leq 10$ et $0 \leq DEPB_66C \leq 10$ et $0 \leq DEPB_66D \leq 10$	Trouble = moyenne de quatre items qui s'appliquaient au répondant. DEPB_662 ne s'appliquait pas (c.-à-d. que le répondant n'a pas travaillé au cours des 12 derniers mois).

(DEPB_66A + DEPB_66C + DEPB_66D) / 3 (min : 0.0; max : 10.0) (arrondir à .1)	DEPBDDY = 1 et DEPB_661 = 11 et DEPB_662 = 11 et 0 <= DEPB_66A <= 10 et 0 <= DEPB_66C <= 10 et 0 <= DEPB_66D <= 10	Trouble = moyenne de trois items qui s'appliquaient au répondant. DEPB_661 et DEPB_662 ne s'appliquaient pas (c.-à-d. que le répondant n'a pas fréquenté l'école et n'a pas travaillé au cours des 12 derniers mois).
--	---	---

30) Indicateur du trouble attribuable à l'épisode dépressif majeur

Nom de la variable : DEPBFINT

Basée sur : DEPB_66A, DEPB_661, DEPB_662, DEPB_66C, DEPB_66D, DEPBDDY

Description : Cette variable décrit le trouble que l'épisode de dépression majeure a entraîné sur les activités et les responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s'agit d'une classification indiquant si l'épisode de dépression majeure perturbe de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires) ou les activités sociales ou les relations personnelles.

Cette variable n'est calculée que pour les répondants qui remplissent les critères d'un épisode dépressif majeur au cours des 12 derniers mois.

Valeur de DEPBFINT	Condition(s)	Explication
SO	DEPBDDY = 2	Le répondant ne remplissait pas les critères d'un épisode de dépression majeure au cours des 12 derniers mois.
ND	DEPB_66A = SO et DEPB_661 = SO et DEPB_662 = SO et DEPB_66C = SO et DEPB_66D = SO	Le répondant a répondu avoir vécu un épisode dépressif majeur au cours des 12 derniers mois qui ont précédé l'interview mais les questions concernant l'épisode n'ont pas été posées au répondant parce qu'il y avait incohérence dans ses réponses.
1	DEPBDDY = 1 et (4 <= DEPB_66A <= 10 ou 4 <= DEPB_661 <= 10 ou 4 <= DEPB_662 <= 10 ou 4 <= DEPB_66C <= 10 ou 4 <= DEPB_66D <= 10)	L'épisode dépressif majeur a troublé de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires) ou les activités sociales ou les relations personnelles au cours des 12 derniers mois.
2	DEPBDDY = 1 et 0 <= DEPB_66A <= 3 et (0 <= DEPB_661 <= 3 ou DEPB_661 = 11) et (0 <= DEPB_662 <= 3 ou DEPB_662 = 11) et 0 <= DEPB_66C <= 3 et 0 <= DEPB_66D <= 3	L'épisode dépressif majeur n'a pas troublé de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires) ou les activités sociales ou les relations personnelles au cours des 12 derniers mois.
ND	DEPBDDY = ND ou (DEPB_66A = NSP, R, ND) ou (DEPB_661 = NSP, R, ND) ou (DEPB_662 = NSP, R, ND) ou (DEPB_66C = NSP, R, ND) ou (DEPB_66D = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

Épisode de manie (Manie) (24 VD)

Pour les besoins de l'ESCC 1.2, un épisode de manie est caractérisé par des sentiments exagérés de bien-être, d'énergie et de confiance en soi qui peuvent mener la personne à perdre la notion de la réalité. Les symptômes de la manie incluent la fuite des idées ou la sensation que les pensées défilent trop vite, l'augmentation de l'estime de soi, la réduction du besoin de sommeil, le désir de parler constamment et l'irritabilité.

Les questions sur la manie sont fondées sur une version reconnue du World Mental Health du Composite International Diagnostic Interview (WMH-CIDI) et modifiée pour les besoins du cycle 1.2 de l'ESCC. L'instrument WMH-CIDI, qui fait partie du projet «World Mental Health 2000» (WMH2000), est une initiative de l'Organisation mondiale de la santé destinée à évaluer la prévalence de divers troubles mentaux dans plusieurs pays à travers le monde.

Le WMH-CIDI est un questionnaire normalisé pour l'évaluation des troubles mentaux conformément à une opérationnalisation des définitions et critères du DSM-IV et de la CIM-10. L'abréviation DSM désigne le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié par l'American Psychiatric Association. Il s'agit d'une classification des troubles mentaux reconnue à l'échelle internationale dont il existe plusieurs versions. Les troubles ou problèmes mentaux étudiés dans le cadre de l'ESCC 1.2 sont codés de façon partielle selon le DSM-IV ou le DSM-III-R. L'ESCC 1.2 offre aucun soutien vis-à-vis les algorithmes de la CIM-10.

Le projet WMH2000 a été adapté à plusieurs versions IPAO (interview sur place assistée par ordinateur) et IPC (interview papier et crayon) du questionnaire WMH-CIDI. Les responsables du projet ont déjà créé un groupe de travail qui examinera les différences méthodologiques pour s'assurer que les comparaisons entre pays soient faites de façon appropriée.

La manie est l'un des cinq états de santé mentale du projet WMH2000 visés par cette enquête. Celle-ci est conçue pour évaluer le diagnostic de manie au cours de la vie et au cours des 12 derniers mois. Un épisode au cours des 12 derniers mois s'entend des 12 mois qui ont précédé l'interview.

La documentation qui accompagne les données de l'ESCC 1.2 fournit des renseignements sur toutes les variables dérivées temporaires utilisées pour calculer les variables dérivées finales de troubles dont le profil est établi au cours de la vie et au cours des 12 derniers mois. Pour la plupart des utilisateurs des données, les variables dérivées finales et les variables dérivées ayant trait à la récence, à la durée, à l'âge au moment de l'apparition et à la perturbation associée au trouble suffiront pour réaliser les analyses.

En ce qui concerne la manie, les variables d'intérêt sont :

Variable	Concept	Numéro de la variable
MIABDEPS	Algorithme – vie	15
MIABDEY	Algorithme - 12 mois	22
MIABGON	Apparition	16
MIABGEC	Récence	17
MIABGPER	Persistance	18
MIABG3B MIABG3D MIABG6B MIABG6D MIABG18D MIABG22	Durée	1 à 6
MIABDINT	Perturbation / trouble – 12 mois	23

Les critères utilisés pour produire les variables dérivées finales associées du trouble mental, ainsi que leurs variables temporaires respectives sont opérationnalisées de façon à satisfaire partiellement aux définitions/classification du DSM-IV. Bien que le questionnaire et les algorithmes soient fondés sur des approches et une classification reconnues mondialement, cette méthode ne peut être utilisée pour poser le diagnostic du trouble chez les personnes présentant ce profil. Seuls des professionnels ayant la formation médicale requise peuvent le faire.

L'instrument de l'ESCC 1.2 permet de recueillir une foule d'informations sur le nombre de symptômes, la gravité, la durée et l'intensité globale du trouble. Toutefois, l'approche structurée utilisée pour l'instrument informatisé n'est pas conçue pour recueillir certains renseignements complexes utilisés par ceux ayant reçu une formation professionnelle pour poser le diagnostic final conformément à la classification du DSM-IV. Ainsi, il n'existe aucun algorithme pour appuyer la création de variables dérivées en rapport avec les spécificateurs/sous-types du trouble. En outre, bien que l'instrument soit conçu pour recueillir certains renseignements utilisés pour l'opérationnalisation des exclusions physiques/organiques et des règles hiérarchiques, Statistique Canada recommande que cette information soit utilisée par des spécialistes du DSM étant donné sa nature complexe.

En plus de l'information sur les états de santé mentale, le questionnaire WMH-CIDI permet de recueillir des renseignements sur un grand nombre de corrélats importants de la santé mentale, comme l'utilisation des services de santé et le soutien. Toutefois, les données de l'ESCC 1.2 recueillies sur les corrélats de la santé mentale ne sont pas fondées sur le questionnaire WMH-CIDI. Bien que les comparaisons internationales de ce genre de données soient importantes, après avoir consulté les divers intervenants, Statistique Canada a décidé que les données de l'ESCC 1.2 devraient appuyer et compléter l'information canadienne déjà recueillie dans le cadre de l'ESCC 1.1 et des cycles de l'ENSP réalisés antérieurement.

Pour simplifier la comparaison au DSM, les critères sont présentés plus ou moins selon le modèle du DSM-IV. Cette correspondance vise uniquement à faciliter l'interprétation des résultats en permettant un langage commun. Toutefois, il serait inapproprié de conclure à l'existence d'une correspondance directe entre nos critères et ceux du DSM-IV en raison de la nature complexe du sujet et des limites opérationnelles associées au questionnaire et aux algorithmes.

Pour les besoins de cette enquête, les répondants qui remplissent les critères ESCC 1.2/WMH-CIDI d'un épisode de manie au cours de la vie sont ceux qui déclarent :

1. une période nettement délimitée d'élévation de l'humeur ou d'humeur expansive ou irritable persistant pendant au moins une semaine, ou de n'importe quelle durée si l'hospitalisation a été requise;
2. au moins trois des sept symptômes (ou au moins quatre si l'humeur est seulement irritable);
3. une altération marquée du fonctionnement professionnel ou social, ou l'existence de caractéristiques psychotiques, ou qu'une hospitalisation a été nécessaire

Pour les besoins de cette enquête, les répondants qui remplissent les critères ESCC 1.2/WMH-CIDI d'un épisode de manie au cours des 12 derniers mois :

1. remplissent les critères de diagnostic d'un épisode maniaque au cours de la vie,
2. déclarent un épisode au cours des 12 derniers mois et
3. déclarent une altération marquée du fonctionnement professionnel ou social.

Manie au cours de la vie

1) Durée du pire épisode maniaque (excité et plein d'énergie) – Variable groupée

Nom de la variable : MIABG3B

Basée sur : MIAB_3B1 (HEURES), MIAB_3B2 (JOURS), MIAB_3B3 (SEMAINES), MIAB_3B4 (MOIS), MIAB_3B5 (ANNÉES)

Description : Cette variable indique la durée du pire épisode maniaque vécu par le répondant durant lequel il s'est senti plein d'énergie et plus excité que d'habitude. Il convient de souligner que, à ceux de ces répondants qui ne pouvaient isoler un pire épisode, on a posé à la place les questions au sujet du plus récent épisode. Des enregistrements ont été regroupés par tranche de durée afin d'assurer la confidentialité. Voir dictionnaire de données.

Valeur de MIABG3B	Condition(s)	Explication
SO	MIAB_3B1 = SO et MIAB_3B2 = SO et MIAB_3B3 = SO et MIAB_3B4 = SO et MIAB_3B5 = SO	Sans objet
1	1 <= MIAB_3B1 <= 23	Moins d'un jour
2	24 <= MIAB_3B1 <= 72 ou 1 <= MIAB_3B2 <= 3	1 à 3 jours
3	4 <= MIAB_3B2 <= 7 ou MIAB_3B3 = 1	1 semaine (4 à 7 jours)
4	8 <= MIAB_3B2 <= 14 ou MIAB_3B3 = 2	2 semaines (8 à 14 jours)
5	15 <= MIAB_3B2 <= 21 ou MIAB_3B3 = 3	3 semaines (15 à 21 jours)
6	22 <= MIAB_3B2 <= 31 ou MIAB_3B3 = 4 ou MIAB_3B4 = 1	1 mois
7	32 <= MIAB_3B2 <= 60 ou 5 <= MIAB_3B3 <= 8 ou MIAB_3B4 = 2	2 mois
8	61 <= MIAB_3B2 <= 91 ou 9 <= MIAB_3B3 <= 13 ou MIAB_3B4 = 3	3 mois
9	92 <= MIAB_3B2 <= 120 ou 14 <= MIAB_3B3 <= 17 ou MIAB_3B4 = 4	4 mois

10	121 <= MIAB_3B2 <= 151 ou 18 <= MIAB_3B3 <= 21 ou MIAB_3B4 = 5	5 mois
11	152 <= MIAB_3B2 <= 180 ou 22 <= MIAB_3B3 <= 26 ou MIAB_3B4 = 6	6 mois
12	181 <= MIAB_3B2 <= 211 ou 27 <= MIAB_3B3 <= 30 ou MIAB_3B4 = 7	7 mois
13	212 <= MIAB_3B2 <= 240 ou 31 <= MIAB_3B3 <= 34 ou MIAB_3B4 = 8	8 mois
14	241 <= MIAB_3B2 <= 271 ou 35 <= MIAB_3B3 <= 39 ou MIAB_3B4 = 9	9 mois
15	272 <= MIAB_3B2 <= 300 ou 40 <= MIAB_3B3 <= 44 ou MIAB_3B4 = 10	10 mois
16	301 <= MIAB_3B2 <= 331 ou 45 <= MIAB_3B3 <= 48 ou MIAB_3B4 = 11	11 mois
17	332 <= MIAB_3B2 <= 365 ou 49 <= MIAB_3B3 <= 52 ou MIAB_3B4 = 12 ou MIAB_3B5 = 1	1 an
18	366 <= MIAB_3B2 <= 900 ou 53 <= MIAB_3B3 <= 104 ou 13 <= MIAB_3B4 <= 48 ou 2 <= MIAB_3B5 <= 4	2 à 4 ans
19	MIAB_3B5 > 4 et MIAB_3B5 < SO	5 ans ou plus
ND	MIAB_3B1 = (NSP, R, ND) ou MIAB_3B2 = (NSP, R, ND) ou MIAB_3B3 = (NSP, R, ND) ou MIAB_3B4 = (NSP, R, ND) ou MIAB_3B5 = (NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

2) Durée du plus récent épisode maniaque (excité et plein d'énergie) – Variable groupée

Nom de la variable : MIABG3D

Basée sur : MIAB_3D1 (HEURES), MIAB_3D2 (JOURS), MIAB_3D3 (SEMAINES), MIAB_3D4 (MOIS), MIAB_3D5 (ANNÉES)

Description : Cette variable indique la durée du plus récent épisode vécu par le répondant durant lequel il s'est senti plein d'énergie et plus excité que d'habitude. Il convient de souligner que cette question a été posée uniquement aux répondants qui ne pouvaient isoler un épisode particulier comme étant le pire épisode. Des enregistrements ont été regroupés par tranche de durée afin d'assurer la confidentialité. Voir dictionnaire de données.

Valeur de MIABG3D	Condition(s)	Explication
SO	MIAB_3D1 = SO et MIAB_3D2 = SO et MIAB_3D3 = SO et MIAB_3D4 = SO et MIAB_3D5 = SO	Sans Objet

1	1 <= MIAB_3D1 <= 23	Moins d'un jour
2	24 <= MIAB_3D1 <= 72 ou 1 <= MIAB_3D2 <= 3	1 à 3 jours
3	4 <= MIAB_3D2 <= 7 ou MIAB_3D3 = 1	1 semaine (4 à 7 jours)
4	8 <= MIAB_3D2 <= 14 ou MIAB_3D3 = 2	2 semaines (8 à 14 jours)
5	15 <= MIAB_3D2 <= 21 ou MIAB_3D3 = 3	3 semaines (15 à 21 jours)
6	22 <= MIAB_3D2 <= 31 ou MIAB_3D3 = 4 Ou MIAB_3D4 = 1	1 mois
7	32 <= MIAB_3D2 <= 60 ou 5 <= MIAB_3D3 <= 8 ou MIAB_3D4 = 2	2 mois
8	61 <= MIAB_3D2 <= 91 ou 9 <= MIAB_3D3 <= 13 ou MIAB_3D4 = 3	3 mois
9	92 <= MIAB_3D2 <= 120 ou 14 <= MIAB_3D3 <= 17 ou MIAB_3D4 = 4	4 mois
10	121 <= MIAB_3D2 <= 151 ou 18 <= MIAB_3D3 <= 21 ou MIAB_3D4 = 5	5 mois
11	152 <= MIAB_3D2 <= 180 ou 22 <= MIAB_3D3 <= 26 ou MIAB_3D4 = 6	6 mois
12	181 <= MIAB_3D2 <= 211 ou 27 <= MIAB_3D3 <= 30 ou MIAB_3D4 = 7	7 mois
13	212 <= MIAB_3D2 <= 240 ou 31 <= MIAB_3D3 <= 34 ou MIAB_3D4 = 8	8 mois
14	241 <= MIAB_3D2 <= 271 ou 35 <= MIAB_3D3 <= 39 ou MIAB_3D4 = 9	9 mois
15	272 <= MIAB_3D2 <= 300 ou 40 <= MIAB_3D3 <= 44 ou MIAB_3D4 = 10	10 mois
16	301 <= MIAB_3D2 <= 331 ou 45 <= MIAB_3D3 <= 48 ou MIAB_3D4 = 11	11 mois
17	332 <= MIAB_3D2 <= 365 ou 49 <= MIAB_3D3 <= 52 ou MIAB_3D4 = 12 ou MIAB_3D5 = 1	1 an
18	366 <= MIAB_3D2 <= 900 ou 53 <= MIAB_3D3 <= 104 ou 13 <= MIAB_3D4 <= 48 ou 2 <= MIAB_3D5 <= 4	2 à 4 ans
19	MIAB_3D5 > 4 et MIAB_3D5 < SO	5 ans ou plus
ND	MIAB_3D1 = (NSP, R, ND) ou MIAB_3D2 = (NSP, R, ND) ou MIAB_3D3 = (NSP, R, ND) ou	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au

	MIAB_3D4 = (NSP, R, ND) ou MIAB_3D5 = (NSP, R, ND)	calcul.
--	---	---------

3) Durée du pire récent épisode maniaque (irritable ou grincheux) – Variable groupée

Nom de la variable : MIABG6B

Basée sur : MIAB_6B1 (HEURES), MIAB_6B2 (JOURS), MIAB_6B3 (SEMAINES), MIAB_6B4 (MOIS), MIAB_6B5 (ANNEES)

Description : Cette variable indique la durée du pire épisode maniaque vécu par le répondant durant lequel il s'est senti irritable ou grincheux. Il convient de souligner que cette question a été posée uniquement aux répondants qui ne pouvaient isoler un épisode particulier comme étant le pire épisode.

Des enregistrements ont été regroupés par tranche de durée afin d'assurer la confidentialité. Voir dictionnaire de données.

Valeur de MIABG6B	Condition(s)	Explication
SO	MIAB_6B1 = SO et MIAB_6B2 = SO et MIAB_6B3 = SO et MIAB_6B4 = SO et MIAB_6B5 = SO	Sans objet
1	1 <= MIAB_6B1 <= 23	Moins d'un jour
2	24 <= MIAB_6B1 <= 72 ou 1 <= MIAB_6B2 <= 3	1 à 3 jours
3	4 <= MIAB_6B2 <= 7 ou MIAB_6B3 = 1	1 semaine (4 à 7 jours)
4	8 <= MIAB_6B2 <= 14 ou MIAB_6B3 = 2	2 semaines (8 à 14 jours)
5	15 <= MIAB_6B2 <= 21 ou MIAB_6B3 = 3	3 semaines (15 à 21 jours)
6	22 <= MIAB_6B2 <= 31 ou MIAB_6B3 = 4 Ou MIAB_6B4 = 1	1 mois
7	32 <= MIAB_6B2 <= 60 ou 5 <= MIAB_6B3 <= 8 ou MIAB_6B4 = 2	2 mois
8	61 <= MIAB_6B2 <= 91 ou 9 <= MIAB_6B3 <= 13 ou MIAB_6B4 = 3	3 mois
9	92 <= MIAB_6B2 <= 120 ou 14 <= MIAB_6B3 <= 17 ou MIAB_6B4 = 4	4 mois
10	121 <= MIAB_6B2 <= 151 ou 18 <= MIAB_6B3 <= 21 ou MIAB_6B4 = 5	5 mois
11	152 <= MIAB_6B2 <= 180 ou 22 <= MIAB_6B3 <= 26 ou MIAB_6B4 = 6	6 mois
12	181 <= MIAB_6B2 <= 211 ou 27 <= MIAB_6B3 <= 30 ou MIAB_6B4 = 7	7 mois

13	212 <= MIAB_6B2 <= 240 ou 31 <= MIAB_6B3 <= 34 ou MIAB_6B4 = 8	8 mois
14	241 <= MIAB_6B2 <= 271 ou 35 <= MIAB_6B3 <= 39 ou MIAB_6B4 = 9	9 mois
15	272 <= MIAB_6B2 <= 300 ou 40 <= MIAB_6B3 <= 44 ou MIAB_6B4 = 10	10 mois
16	301 <= MIAB_6B2 <= 331 ou 45 <= MIAB_6B3 <= 48 ou MIAB_6B4 = 11	11 mois
17	332 <= MIAB_6B2 <= 365 ou 49 <= MIAB_6B3 <= 52 ou MIAB_6B4 = 12 ou MIAB_6B5 = 1	1 an
18	366 <= MIAB_6B2 <= 900 ou 53 <= MIAB_6B3 <= 104 ou 13 <= MIAB_6B4 <= 48 ou 2 <= MIAB_6B5 <= 4	2 à 4 ans
19	MIAB_6B5 > 4 et MIAB_6B5 < SO	5 ans ou plus
ND	MIAB_6B1 = (NSP, R, ND) ou MIAB_6B2 = (NSP, R, ND) ou MIAB_6B3 = (NSP, R, ND) ou MIAB_6B4 = (NSP, R, ND) ou MIAB_6B5 = (NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

4) Durée du plus récent épisode maniaque (irritable ou grincheux) – Variable groupée

Nom de la variable : MIABG6D

Basée sur : MIAB_6D1 (HEURES), MIAB_6D2 (JOURS), MIAB_6D3 (SEMAINES), MIAB_6D4 (MOIS), MIAB_6D5 (ANNEES)

Description : Cette variable indique la durée du plus récent épisode maniaque vécu par le répondant durant lequel il s'est senti irritable ou grincheux. Il convient de souligner que cette question a été posée uniquement aux répondants qui ne pouvaient isoler un épisode particulier comme étant le pire épisode.

Des enregistrements ont été regroupés par tranche de durée afin d'assurer la confidentialité. Voir dictionnaire de données.

Valeur de MIABG6D	Condition(s)	Explication
SO	MIAB_6D1 = SO et MIAB_6D2 = SO et MIAB_6D3 = SO et MIAB_6D4 = SO et MIAB_6D5 = SO	Sans objet
1	1 <= MIAB_6D1 <= 23	Moins d'un jour
2	24 <= MIAB_6D1 <= 72 ou 1 <= MIAB_6D2 <= 3	1 à 3 jours
3	4 <= MIAB_6D2 <= 7 ou MIAB_6D3 = 1	1 semaine (4 à 7 jours)
4	8 <= MIAB_6D2 <= 14 ou MIAB_6D3 = 2	2 semaines (8 à 14 jours)
5	15 <= MIAB_6D2 <= 21 ou	3 semaines (15 à 21 jours)

	MIAB_6D3 = 3	
6	22 <= MIAB_6D2 <= 31 ou MIAB_6D3 = 4 Ou MIAB_6D4 = 1	1 mois
7	32 <= MIAB_6D2 <= 60 ou 5 <= MIAB_6D3 <= 8 ou MIAB_6D4 = 2	2 mois
8	61 <= MIAB_6D2 <= 91 ou 9 <= MIAB_6D3 <= 13 ou MIAB_6D4 = 3	3 mois
9	92 <= MIAB_6D2 <= 120 ou 14 <= MIAB_6D3 <= 17 ou MIAB_6D4 = 4	4 mois
10	121 <= MIAB_6D2 <= 151 ou 18 <= MIAB_6D3 <= 21 ou MIAB_6D4 = 5	5 mois
11	152 <= MIAB_6D2 <= 180 ou 22 <= MIAB_6D3 <= 26 ou MIAB_6D4 = 6	6 mois
12	181 <= MIAB_6D2 <= 211 ou 27 <= MIAB_6D3 <= 30 ou MIAB_6D4 = 7	7 mois
13	212 <= MIAB_6D2 <= 240 ou 31 <= MIAB_6D3 <= 34 ou MIAB_6D4 = 8	8 mois
14	241 <= MIAB_6D2 <= 271 ou 35 <= MIAB_6D3 <= 39 ou MIAB_6D4 = 9	9 mois
15	272 <= MIAB_6D2 <= 300 ou 40 <= MIAB_6D3 <= 44 ou MIAB_6D4 = 10	10 mois
16	301 <= MIAB_6D2 <= 331 ou 45 <= MIAB_6D3 <= 48 ou MIAB_6D4 = 11	11 mois
17	332 <= MIAB_6D2 <= 365 ou 49 <= MIAB_6D3 <= 52 ou MIAB_6D4 = 12 ou MIAB_6D5 = 1	1 an
18	366 <= MIAB_6D2 <= 900 ou 53 <= MIAB_6D3 <= 104 ou 13 <= MIAB_6D4 <= 48 ou 2 <= MIAB_6D5 <= 4	2 à 4 ans
19	MIAB_6D5 > 4 et MIAB_6D5 < SO	5 ans ou plus
ND	MIAB_6D1 = (NSP, R, ND) ou MIAB_6D2 = (NSP, R, ND) ou MIAB_6D3 = (NSP, R, ND) ou MIAB_6D4 = (NSP, R, ND) ou MIAB_6D5 = (NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

5) Durée du premier épisode maniaque – Variable groupée

Nom de la variable : MIABG18D

Basée sur : MIAB_1D1, MIAB_1D2, MIAB_1D3, MIAB_1D4, MIAB_1D5

Description : Cette variable indique la durée du premier épisode maniaque vécu par le répondant.

Des enregistrements ont été regroupés par tranche de durée afin d'assurer la confidentialité. Voir dictionnaire de données.

Valeur de MIABG18D	Condition(s)	Explication
SO	MIAB_1D1 = SO et MIAB_1D2 = SO et MIAB_1D3 = SO et MIAB_1D4 = SO et MIAB_1D5 = SO	Sans objet
1	1 <= MIAB_1D1 <= 23	Moins d'un jour
2	24 <= MIAB_1D1 <= 72 ou 1 <= MIAB_1D2 <= 3	1 à 3 jours
3	4 <= MIAB_1D2 <= 7 ou MIAB_1D3 = 1	1 semaine (4 à 7 jours)
4	8 <= MIAB_1D2 <= 14 ou MIAB_1D3 = 2	2 semaines (8 à 14 jours)
5	15 <= MIAB_1D2 <= 21 ou MIAB_1D3 = 3	3 semaines (15 à 21 jours)
6	22 <= MIAB_1D2 <= 31 ou MIAB_1D3 = 4 Ou MIAB_1D4 = 1	1 mois
7	32 <= MIAB_1D2 <= 60 ou 5 <= MIAB_1D3 <= 8 ou MIAB_1D4 = 2	2 mois
8	61 <= MIAB_1D2 <= 91 ou 9 <= MIAB_1D3 <= 13 ou MIAB_1D4 = 3	3 mois
9	92 <= MIAB_1D2 <= 120 ou 14 <= MIAB_1D3 <= 17 ou MIAB_1D4 = 4	4 mois
10	121 <= MIAB_1D2 <= 151 ou 18 <= MIAB_1D3 <= 21 ou MIAB_1D4 = 5	5 mois
11	152 <= MIAB_1D2 <= 180 ou 22 <= MIAB_1D3 <= 26 ou MIAB_1D4 = 6	6 mois
12	181 <= MIAB_1D2 <= 211 ou 27 <= MIAB_1D3 <= 30 ou MIAB_1D4 = 7	7 mois
13	212 <= MIAB_1D2 <= 240 ou 31 <= MIAB_1D3 <= 34 ou MIAB_1D4 = 8	8 mois
14	241 <= MIAB_1D2 <= 271 ou 35 <= MIAB_1D3 <= 39 ou MIAB_1D4 = 9	9 mois
15	272 <= MIAB_1D2 <= 300 ou 40 <= MIAB_1D3 <= 44 ou MIAB_1D4 = 10	10 mois
16	301 <= MIAB_1D2 <= 331 ou 45 <= MIAB_1D3 <= 48 ou	11 mois

	MIAB_1D4 = 11	
17	332 <= MIAB_1D2 <= 365 ou 49 <= MIAB_1D3 <= 52 ou MIAB_1D4 = 12 ou MIAB_1D5 = 1	1 an
18	366 <= MIAB_1D2 <= 900 ou 53 <= MIAB_1D3 <= 104 ou 13 <= MIAB_1D4 <= 48 ou 2 <= MIAB_1D5 <= 4	2 à 4 ans
19	MIAB_1D5 > 4 et MIAB_1D5 < SO	5 ans ou plus
ND	MIAB_1D1 = (NSP, R, ND) ou MIAB_1D2 = (NSP, R, ND) ou MIAB_1D3 = (NSP, R, ND) ou MIAB_1D4 = (NSP, R, ND) ou MIAB_1D5 = (NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

6) Durée du plus long épisode maniaque – Variable groupée

Nom de la variable : MIABG22

Basée sur : MIAB_221, MIAB_222, MIAB_223, MIAB_224, MIAB_225

Description : Cette variable indique la durée du plus long épisode maniaque vécu par le répondant.

Des enregistrements ont été regroupés par tranche de durée afin d'assurer la confidentialité. Voir dictionnaire de données.

Valeur de MIABG22	Condition(s)	Explication
SO	MIAB_221 = SO et MIAB_222 = SO et MIAB_223 = SO et MIAB_224 = SO et MIAB_225 = SO	Sans objet
1	1 <= MIAB_221 <= 23	Moins d'un jour
2	24 <= MIAB_221 <= 72 ou 1 <= MIAB_222 <= 3	1 à 3 jours
3	4 <= MIAB_222 <= 7 ou MIAB_223 = 1	1 semaine (4 à 7 jours)
4	8 <= MIAB_222 <= 14 ou MIAB_223 = 2	2 semaines (8 à 14 jours)
5	15 <= MIAB_222 <= 21 ou MIAB_223 = 3	3 semaines (15 à 21 jours)
6	22 <= MIAB_222 <= 31 ou MIAB_223 = 4 Ou MIAB_224 = 1	1 mois
7	32 <= MIAB_222 <= 60 ou 5 <= MIAB_223 <= 8 ou MIAB_224 = 2	2 mois
8	61 <= MIAB_222 <= 91 ou 9 <= MIAB_223 <= 13 ou MIAB_224 = 3	3 mois
9	92 <= MIAB_222 <= 120 ou 14 <= MIAB_223 <= 17 ou MIAB_224 = 4	4 mois
10	121 <= MIAB_222 <= 151 ou	5 mois

	18 <= MIAB_223 <= 21 ou MIAB_224 = 5	
11	152 <= MIAB_222 <= 180 ou 22 <= MIAB_223 <= 26 ou MIAB_224 = 6	6 mois
12	181 <= MIAB_222 <= 211 ou 27 <= MIAB_223 <= 30 ou MIAB_224 = 7	7 mois
13	212 <= MIAB_222 <= 240 ou 31 <= MIAB_223 <= 34 ou MIAB_224 = 8	8 mois
14	241 <= MIAB_222 <= 271 ou 35 <= MIAB_223 <= 39 ou MIAB_224 = 9	9 mois
15	272 <= MIAB_222 <= 300 ou 40 <= MIAB_223 <= 44 ou MIAB_224 = 10	10 mois
16	301 <= MIAB_222 <= 331 ou 45 <= MIAB_223 <= 48 ou MIAB_224 = 11	11 mois
17	332 <= MIAB_222 <= 365 ou 49 <= MIAB_223 <= 52 ou MIAB_224 = 12 ou MIAB_225 = 1	1 an
18	366 <= MIAB_222 <= 900 ou 53 <= MIAB_223 <= 104 ou 13 <= MIAB_224 <= 48 ou 2 <= MIAB_225 <= 4	2 à 4 ans
19	MIAB_225 > 4 et MIAB_225 < SO	5 ans ou plus
ND	MIAB_221 = (NSP, R, ND) ou MIAB_222 = (NSP, R, ND) ou MIAB_223 = (NSP, R, ND) ou MIAB_224 = (NSP, R, ND) ou MIAB_225 = (NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

7) Manie au cours de la vie - critère A, partie 1

Nom de la variable : MIABDA1

Basée sur : MIAB_01, MIAB_05

Description : Cette variable indique si le répondant a déclaré une période distincte durant laquelle son humeur a été élevée, expansive ou irritable de façon anormale et persistante au cours de sa vie.

Valeur de MIABDA1	Condition(s)	Explication
1	MIAB_01 = 1 ou MIAB_05 = 1	Le répondant remplit le critère A, partie 1 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de manie au cours de la vie. Le répondant a déclaré une période nettement délimitée où son humeur était élevée, expansive ou irritable de façon anormale et persistante.
2	MIAB_01 = 2 ou MIAB_05 = 2 ou (MIAB_01 = SO et MIAB_05 = SO)	Le répondant ne remplit pas le critère A, partie 1 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de manie au cours de la vie.

		Le répondant n'a pas déclaré de période nettement délimitée où son humeur était élevée, expansive ou irritable de façon anormale et persistante. Remarque concernant l'ESCC : le répondant a répondu à la question MIAB_01 ou MIAB_05.
ND	(MIAB_01 = NSP, R, ND) ou (MIAB_05 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

8) Manie au cours de la vie - critère A, partie 2

Nom de la variable : MIABDA2

Basée sur : MIABT3BD, MIABT3DD, MIABT6BD, MIABT6DD, MIABT22D, MIAB_20, MIAB_48

Description : Cette variable indique si le répondant a déclaré avoir déjà eu une période nettement délimitée durant laquelle son humeur était élevée, expansive ou irritable de façon anormale et persistante, qui a duré au moins une semaine ou qui a nécessité une hospitalisation.

8a) Variable temporaire— Durée du pire épisode maniaque (excité et plein d'énergie) en jours

Nom de la variable : MIABT3BD

Basée sur : MIAB_03B, MIAB_3B1, MIAB_3B2, MIAB_3B3, MIAB_3B4, MIAB_3B5

Description : Cette variable indique la durée (en jours) du pire épisode maniaque vécu par le répondant durant lequel il s'est senti plein d'énergie et plus excité que d'habitude. Il convient de souligner que, à ceux de ces répondants qui ne pouvaient isoler un pire épisode, on a posé à la place les questions au sujet du plus récent épisode.

Valeur de MIABT3BD	Condition(s)	Explication
SO	MIAB_03B = SO	Les questions nécessaires à ce calcul n'ont pas été posées au répondant.
ND	(MIAB_03B = NSP, R, ND) ou (MIAB_3B1 = NSP, R, ND) ou (MIAB_3B2 = NSP, R, ND) ou (MIAB_3B3 = NSP, R, ND) ou (MIAB_3B4 = NSP, R, ND) ou (MIAB_3B5 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
Valeur à MIAB_3B1 / 24 (arrondir à .1)	MIAB_03B = 1	Durée du pire épisode maniaque vécu par le répondant (en jours).
Valeur à MIAB_3B2	MIAB_03B = 2	Durée du pire épisode maniaque vécu par le répondant (en jours).
Valeur à MIAB_3B3 * 7	MIAB_03B = 3	Durée du pire épisode maniaque vécu par le répondant (en jours).
Valeur à MIAB_3B4 * 30	MIAB_03B = 4	Durée du pire épisode maniaque vécu par le répondant (en jours).
Valeur à MIAB_3B5 * 365	MIAB_03B = 5	Durée du pire épisode maniaque vécu par le répondant (en jours).

8b) Variable temporaire – Durée du plus récent épisode maniaque (excité et plein d'énergie) en jours**Nom de la variable :** MIABT3DD**Basée sur :** MIAB_03D, MIAB_3D1, MIAB_3D2, MIAB_3D3, MIAB_3D4, MIAB_3D5**Description :** Cette variable indique la durée (en jours) du plus récent épisode vécu par le répondant durant lequel il s'est senti plein d'énergie et plus excité que d'habitude. Il convient de souligner que cette question a été posée uniquement aux répondants qui ne pouvaient isoler un épisode particulier comme étant le pire épisode.

Valeur de MIABT3DD	Condition(s)	Explication
SO	MIAB_03D = SO	Les questions nécessaires à ce calcul n'ont pas été posées au répondant.
ND	(MIAB_03D = NSP, R, ND) ou (MIAB_3D1 = NSP, R, ND) ou (MIAB_3D2 = NSP, R, ND) ou (MIAB_3D3 = NSP, R, ND) ou (MIAB_3D4 = NSP, R, ND) ou (MIAB_3D5 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
Valeur à MIAB_3D1 / 24 (arrondir à .1)	MIAB_03D = 1	Durée de l'épisode maniaque le plus récent (en jours).
Valeur à MIAB_3D2	MIAB_03D = 2	Durée de l'épisode maniaque le plus récent (en jours).
Valeur à MIAB_3D3 * 7	MIAB_03D = 3	Durée de l'épisode maniaque le plus récent (en jours).
Valeur à MIAB_3D4 * 30	MIAB_03D = 4	Durée de l'épisode maniaque le plus récent (en jours).
Valeur à MIAB_3D5 * 365	MIAB_03D = 5	Durée de l'épisode maniaque le plus récent (en jours).

8c) Variable temporaire – Durée du pire épisode maniaque (irritable ou grincheux) en jours**Nom de la variable :** MIABT6BD**Basée sur :** MIAB_06B, MIAB_6B1, MIAB_6B2, MIAB_6B3, MIAB_6B4, MIAB_6B5**Description :** Cette variable indique la durée (en jours) du pire épisode maniaque vécu par le répondant durant lequel il s'est senti irritable ou grincheux. Il convient de souligner que, à ceux de ces répondants qui ne pouvaient isoler un pire épisode, on a posé à la place les questions au sujet de l'épisode le plus récent.

Valeur de MIABT6BD	Condition(s)	Explication
SO	MIAB_06B = SO	Les questions nécessaires à ce calcul n'ont pas été posées au répondant.
ND	(MIAB_06B = NSP, R, ND) ou (MIAB_6B1 = NSP, R, ND) ou (MIAB_6B2 = NSP, R, ND) ou (MIAB_6B3 = NSP, R, ND) ou (MIAB_6B4 = NSP, R, ND) ou (MIAB_6B5 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
Valeur à MIAB_6B1 / 24 (arrondir à .1)	MIAB_06B = 1	Durée du pire épisode maniaque vécu par le répondant (en jours).
Valeur à MIAB_6B2	MIAB_06B = 2	Durée du pire épisode maniaque vécu par le répondant (en jours).
Valeur à MIAB_6B3 * 7	MIAB_06B = 3	Durée du pire épisode maniaque vécu par le répondant (en jours).
Valeur à MIAB_6B4 * 30	MIAB_06B = 4	Durée du pire épisode maniaque vécu par le répondant (en jours).

		vécu par le répondant (en jours).
Valeur à MIAB_6B5 * 365	MIAB_06B = 5	Durée du pire épisode maniaque vécu par le répondant (en jours).

8d) Variable temporaire – Durée du plus récent épisode maniaque (irritable ou grincheux) en jours

Nom de la variable : MIABT6DD

Basée sur : MIAB_06D, MIAB_6D1, MIAB_6D2, MIAB_6D3, MIAB_6D4, MIAB_6D5

Description : Cette variable indique la durée (en jours) du plus récent épisode maniaque vécu par le répondant durant lequel il s'est senti irritable ou grincheux. Il convient de souligner que cette question a été posée uniquement aux répondants qui ne pouvaient isoler un épisode particulier comme étant le pire épisode.

Valeur de MIABT6DD	Condition(s)	Explication
SO	MIAB_06D = SO	Les questions nécessaires à ce calcul n'ont pas été posées au répondant.
ND	(MIAB_06D = NSP, R, ND) ou (MIAB_6D1 = NSP, R, ND) ou (MIAB_6D2 = NSP, R, ND) ou (MIAB_6D3 = NSP, R, ND) ou (MIAB_6D4 = NSP, R, ND) ou (MIAB_6D5 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
Valeur à MIAB_6D1 / 24 (arrondir à .1)	MIAB_06D = 1	Durée du plus récent épisode maniaque (en jours).
Valeur à MIAB_6D2	MIAB_06D = 2	Durée du plus récent épisode maniaque (en jours).
Valeur à MIAB_6D3 * 7	MIAB_06D = 3	Durée du plus récent épisode maniaque (en jours).
Valeur à MIAB_6D4 * 30	MIAB_06D = 4	Durée du plus récent épisode maniaque (en jours).
Valeur à MIAB_6D5 * 365	MIAB_06D = 5	Durée du plus récent épisode maniaque (en jours).

8e) Variable temporaire – Durée du plus long épisode maniaque en jours

Nom de la variable : MIABT22D

Basée sur : MIAB_22, MIAB_221, MIAB_222, MIAB_223, MIAB_224, MIAB_225

Description : Cette variable indique la durée (en jours) du plus long épisode maniaque vécu par le répondant.

Valeur de MIABT22D	Condition(s)	Explication
SO	MIAB_22 = SO	Les questions nécessaires à ce calcul n'ont pas été posées au répondant.
ND	(MIAB_22 = NSP, R, ND) ou (MIAB_221 = NSP, R, ND) ou (MIAB_222 = NSP, R, ND) ou (MIAB_223 = NSP, R, ND) ou (MIAB_224 = NSP, R, ND) ou (MIAB_225 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
Valeur à MIAB_221 / 24 (arrondir à .1)	MIAB_22 = 1	Durée du plus long épisode maniaque vécu par le répondant (en jours).
Valeur à MIAB_222	MIAB_22 = 2	Durée du plus long épisode maniaque vécu par le répondant (en jours).

Valeur à MIAB_223 * 7	MIAB_22 = 3	Durée du plus long épisode maniaque vécu par le répondant (en jours).
Valeur à MIAB_224 * 30	MIAB_22 = 4	Durée du plus long épisode maniaque vécu par le répondant (en jours).
Valeur à MIAB_225 * 365	MIAB_22 = 5	Durée du plus long épisode maniaque vécu par le répondant (en jours).

Évaluation du critère A, partie 2

Valeur de MIABDA2	Condition(s)	Explication
1	7 <= MIABT3BD < SO ou 7 <= MIABT3DD < SO ou 7 <= MIABT6BD < SO ou 7 <= MIABT6DD < SO ou 7 <= MIABT22D < SO ou 1 <= MIAB_20 < SO ou MIAB_48 = 1	Le répondant remplit le critère A, partie 2 de manie au cours de la vie. Le répondant a déclaré une période durant laquelle son humeur était élevée, expansive ou irritable de façon anormale et persistante qui a duré au moins une semaine ou qui a nécessité une hospitalisation.
2	[MIABT3BD < 7 ou MIABT3DD < 7 ou MIABT6BD < 7 ou MIABT6DD < 7 ou (MIABT3BD = SO et MIABT3DD = SO et MIABT6BD = SO et MIABT6DD = SO)] et (MIABT22D < 7 ou MIABT22D = SO) et (MIAB_20 = 0, SO) et (MIAB_48 = 2, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère A, partie 2 de manie au cours de la vie. La durée déclarée est inférieure à une semaine ou l'épisode n'a pas nécessité d'hospitalisation.
ND	MIABT3BD = ND ou MIABT3DD = ND ou MIABT6BD = ND ou MIABT6DD = ND ou MIABT22D = ND ou (MIAB_20 = NSP, R, ND) ou (MIAB_48 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

9) Manie au cours de la vie - critère A (parties 1 et 2 combinées)**Nom de la variable :** MIABDA**Basée sur :** MIABDA1, MIABDA2

Description : Cette variable indique si le répondant remplit le critère A de l'algorithme L'ESCC 1.2/WMH-CIDI de manie au cours de la vie. Le critère A est rempli si le répondant déclare une période nettement délimitée durant laquelle son humeur était élevée, expansive ou irritable de façon anormale et persistante qui a duré au moins une semaine ou qui a nécessité une hospitalisation.

Valeur de MIABDA	Condition(s)	Explication
1	MIABDA1 = 1 et	Le répondant remplit le critère A de

	MIABDA2 = 1	<p>L'ESCC 1.2/WMH-CIDI de manie au cours de la vie.</p> <p>Le répondant a déclaré une période nettement délimitée durant laquelle son humeur était élevée, expansive ou irritable de façon anormale et persistante qui a duré au moins une semaine ou qui a nécessité une hospitalisation.</p>
2	MIABDA1 = 2 ou MIABDA2 = 2	<p>Le répondant ne remplit pas le critère A de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de manie au cours de la vie.</p> <p>Le répondant n'a pas déclaré de période nettement délimitée durant laquelle son humeur était élevée, expansive ou irritable de façon anormale et persistante, ou bien l'épisode a duré moins d'une semaine et n'a pas nécessité d'hospitalisation.</p>
ND	MIABDA1 = ND ou MIABDA2 = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

10) Manie au cours de la vie - critère B

Nom de la variable : MIABDB

Basée sur : MIABDB1, MIABDB2, MIABDB3, MIABDB4, MIABDB5, MIABDB6, MIABDB7, MIABDBI

Description : Cette variable indique si le répondant remplit le critère B de l'algorithme L'ESCC 1.2/WMH-CIDI de manie au cours de la vie. Le critère est rempli si au moins trois des sept symptômes (ou au moins quatre si l'humeur est seulement irritable) ont persisté durant la période de perturbation de l'humeur. Les symptômes sont :

1. une augmentation de l'estime de soi ou des idées de grandeur,
2. une réduction du besoin de sommeil,
3. une plus grande communicabilité que d'habitude ou un désir de parler constamment,
4. une fuite des idées ou des sensations subjectives que les pensées défilent,
5. de la distractivité,
6. une augmentation de l'activité orientée vers un but (social, professionnel ou scolaire) ou une agitation psychomotrice,
7. un engagement excessif dans des activités agréables mais à potentiel élevé de conséquences dommageables comme se lancer sans retenue dans des achats inconsidérés, des conduites sexuelles inconséquentes ou des investissements commerciaux déraisonnables.

10a) Symptôme 1 – augmentation de l'estime de soi ou idées de grandeur

Nom de la variable : MIABDB1

Basée sur : MIAB_07N, MIAB_07O

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir eu une confiance grandement exagérée en eux, avoir pensé qu'ils pouvaient faire des choses qu'ils ne pouvaient pas réellement faire, avoir pensé qu'ils étaient effectivement quelqu'un d'autre ou qu'ils avaient un lien particulier avec une personne célèbre alors qu'en réalité ce n'était pas le cas.

Valeur de MIABDB1	Condition(s)	Explication
1	MIAB_07N = 1 ou MIAB_07O = 1	Le répondant a déclaré avoir eu une augmentation de l'estime de soi ou des idées de grandeur durant la période de perturbation de l'humeur.
2	(MIAB_07N = 2, SO) et (MIAB_07O = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré d'augmentation de l'estime de soi ni d'idées de grandeur.
ND	(MIAB_07N = NSP, R, ND) ou (MIAB_07O = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

10b) Symptôme 2 – réduction du besoin de sommeil

Nom de la variable : MIABDB2

Basée sur : MIAB_07J

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir dormi moins que d'habitude sans pour autant se sentir fatigués ou somnolents.

Valeur de MIABDB2	Condition(s)	Explication
1	MIAB_07J = 1	Le répondant a déclaré une réduction du besoin de sommeil durant la période de perturbation de l'humeur.
2	(MIAB_07J = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré de réduction du besoin de sommeil durant la période de perturbation de l'humeur.
ND	(MIAB_07J = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

10c) Symptôme 3 – plus grande communicabilité que d'habitude ou désir de parler constamment

Nom de la variable : MIABDB3

Basée sur : MIAB_07F

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir parlé plus que d'habitude ou avoir ressenti le besoin de parler tout le temps.

Valeur de MIABDB3	Condition(s)	Explication
1	MIAB_07F = 1	Le répondant a déclaré avoir manifesté une plus grande communicabilité que d'habitude ou le désir de parler constamment durant la période de perturbation de l'humeur.
2	(MIAB_07F = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré une plus grande communicabilité que d'habitude ni le désir de parler constamment.
ND	(MIAB_07F = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

10d) Symptôme 4 – fuite des idées ou sensations subjectives que les pensées défilent**Nom de la variable :** MIABDB4**Basée sur :** MIAB_07I**Description :** Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré que leurs pensées semblaient passer d'une chose à l'autre ou défiler si vite dans leur esprit qu'ils ne pouvaient les suivre.

Valeur de MIABDB4	Condition(s)	Explication
1	MIAB_07I = 1	Le répondant a déclaré une fuite des idées ou la sensation que ses pensées défilaient durant la période de perturbation de l'humeur.
2	(MIAB_07I = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré de fuite des idées ni de sensation que ses pensées défilaient.
ND	(MIAB_07I = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

10e) Symptôme 5 – distractivité (p. ex., l'attention est trop facilement attirée par des stimulus extérieurs sans importance ou insignifiants)**Nom de la variable :** MIABDB5**Basée sur :** MIAB_07G, MIAB_07H**Description :** Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir constamment changé leurs projets ou leurs activités, ou avoir été si facilement distraits que la moindre interruption pouvait leur faire perdre le fil de leur pensée.

Valeur de MIABDB5	Condition(s)	Explication
1	MIAB_07G = 1 ou MIAB_07H = 1	Le répondant a déclaré de la distractivité durant la période de perturbation de l'humeur.
2	(MIAB_07G = 2, SO) et (MIAB_07H = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré de distractivité.
ND	(MIAB_07G = NSP, R, ND) ou (MIAB_07H = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

10f) Symptôme 6 – augmentation de l'activité orientée vers un but ou agitation psychomotrice**Nom de la variable :** MIABDB6**Basée sur :** MIAB_07A, MIAB_07B, MIAB_07D, MIAB_07E**Description :** Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré être devenus si nerveux et agités qu'ils bougeaient sans cesse ou qui ne pouvait pas tenir en place, être devenus trop amicaux ou trop familiers avec les gens, avoir eu beaucoup plus d'intérêt pour le sexe que d'habitude ou avoir voulu avoir des rencontres sexuelles avec des personnes qui, en temps normal, ne les auraient pas intéressées, ou avoir essayé des choses impossibles à faire, comme prendre une quantité irréaliste de travail.

Valeur de MIABDB6	Condition(s)	Explication
1	MIAB_07A = 1 ou MIAB_07B = 1 ou MIAB_07D = 1 ou MIAB_07E = 1	Le répondant a déclaré une augmentation de l'activité orientée vers un but ou une agitation psychomotrice durant la période de perturbation de l'humeur.

2	(MIAB_07A = 2, SO) et (MIAB_07B = 2, SO) et (MIAB_07D = 2, SO) et (MIAB_07E = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré d'augmentation de l'activité orientée vers un but ni d'agitation psychomotrice.
ND	(MIAB_07A = NSP, R, ND) ou (MIAB_07B = NSP, R, ND) ou (MIAB_07D = NSP, R, ND) ou (MIAB_07E = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

10g) Symptôme 7 – engagement excessif dans des activités agréables mais à potentiel élevé de conséquences dommageables

Nom de la variable : MIABDB7

Basée sur : MIAB_07K, MIAB_07L, MIAB_07M

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré s'être lancés dans des investissements insensés ou dans des projets pour gagner de l'argent, avoir dépensé tellement plus d'argent que d'habitude que cela leur a créé des problèmes financiers, ou avoir été motivés par la recherche de plaisir d'une manière qu'ils auraient habituellement jugé risquée, comme avoir des rapports sexuels à risque, faire des achats impulsifs ou conduire imprudemment un véhicule.

Valeur de MIABDB7	Condition(s)	Explication
1	MIAB_07K = 1 ou MIAB_07L = 1 ou MIAB_07M = 1	Le répondant a déclaré un engagement excessif dans des activités agréables mais à potentiel élevé de conséquences dommageables.
2	(MIAB_07K = 2, SO) et (MIAB_07L = 2, SO) et (MIAB_07M = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré d'engagement excessif dans les activités agréables mais à potentiel élevé de conséquences dommageables.
ND	(MIAB_07K = NSP, R, ND) ou (MIAB_07L = NSP, R, ND) ou (MIAB_07M = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

10h) Humeur irritable – détermine si l'humeur était uniquement irritable

Nom de la variable : MIABDBI

Basée sur : SCRB_24, SCRB_25, SCRB_25A

Description : Cette variable indique si le répondant a déclaré être irritable ou d'humeur grincheuse, mais n'a pas répondu affirmativement à la question filtre pour la manie concernant le fait de s'être senti plus excité et plein d'énergie et d'avoir eu le sentiment que les idées circulaient trop vite dans sa tête. Des deux façons de procéder au filtrage, la première est moins catégorique et il faut donc que quatre symptômes soient présents plutôt que trois pour que le critère B soit rempli.

Valeur de MIABDBI	Condition(s)	Explication
1	SCRB_24 <> 1 et SCRB_25A = 1	Le répondant a déclaré une humeur irritable, mais n'a pas déclaré d'excitation et d'énergie excessive ni de pensées circulant trop vite dans sa tête.
2	SCRB_24 = 1 ou (SCRB_24 = 2, NSP, R) et	Le répondant n'a pas déclaré d'humeur irritable uniquement ou

	[(SCRB_25 = 2, NSP, R) ou (SCRB_25A = 2, NSP, R)]	n'a pas été intégré par filtrage dans le module sur la manie.
--	---	---

Évaluation du critère B de manie au cours de la vie

Valeur de MIABDB	Condition(s)	Explication
1	MIABDBI = 1 et (4 ou plus de (MIABDB1, MIABDB2, MIABDB3, MIABDB4, MIABDB5, MIABDB6, MIABDB7) = 1) ou MIABDBI = 2 et (3 ou plus de (MIABDB1, MIABDB2, MIABDB3, MIABDB4, MIABDB5, MIABDB6, MIABDB7) = 1)	Le répondant remplit le critère B de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de manie au cours de la vie. Pendant la période de perturbation de l'humeur, au moins trois des sept symptômes (ou au moins quatre si l'humeur était uniquement irritable) se sont manifestés.
2	MIABDBI = 1 et (4 ou plus de (MIABDB1, MIABDB2, MIABDB3, MIABDB4, MIABDB5, MIABDB6, MIABDB7) = 2) ou MIABDBI = 2 et (5 ou plus de (MIABDB1, MIABDB2, MIABDB3, MIABDB4, MIABDB5, MIABDB6, MIABDB7) = 2)	Le répondant ne remplit pas le critère B de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de manie au cours de la vie. Moins de trois des sept symptômes (moins de quatre si l'humeur était uniquement irritable) se sont manifestés.
ND	MIABDB1 = ND ou MIABDB2 = ND ou MIABDB3 = ND ou MIABDB4 = ND ou MIABDB5 = ND ou MIABDB6 = ND ou MIABDB7 = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

11) Manie au cours de la vie - Critère D, partie 1**Nom de la variable :** MIABDD1**Basée sur :** MIAB_09, MIAB_09A, MIAB_29, MIAB_33, MIABD277**Description :** Cette variable indique si la perturbation de l'humeur survenue au cours de la vie était suffisamment sévère pour entraîner une altération marquée des activités quotidiennes normales, du fonctionnement professionnel ou des activités sociales, ou des relations avec les autres.**11a) Perturbation sociale et professionnelle****Nom de la variable :** MIABD277**Basée sur :** MIAB_27A, MIAB_271, MIAB_272, MIAB_27C, MIAB_27D**Description :** Cette variable indique si les sentiments maniaques les plus sévères éprouvés au cours des 12 derniers mois qui ont précédé l'interview ont perturbé les activités du répondant à la maison, au travail ou à l'école, ou au niveau de sa capacité à établir ou maintenir des relations proches avec les autres ou au niveau de sa vie sociale.

Valeur de MIABD277	Condition(s)	Explication
1	(7 <= MIAB_27A <= 10) ou (7 <= MIAB_271 <= 10) ou	Le répondant a déclaré une perturbation significative de ses

	(7 <= MIAB_272 <= 10) ou (7 <= MIAB_27C <= 10) ou (7 <= MIAB_27D <= 10)	activités à la maison, au travail ou au niveau de sa capacité à établir ou maintenir des relations proches avec les autres ou au niveau de sa vie sociale.
2	(MIAB_27A <= 6 ou MIAB_27A = SO) et (MIAB_271 <= 6 ou MIAB_271 = 11, SO) et (MIAB_272 <= 6 ou MIAB_272 = 11, SO) et (MIAB_27C <= 6 ou MIAB_27C = SO) et (MIAB_27D <= 6 ou MIAB_27D = SO)	Le répondant n'a pas déclaré de perturbation significative de ses activités à la maison, au travail ou à l'école ni de au niveau de sa capacité à établir ou maintenir des relations proches avec les autres ou au niveau de sa vie sociale.
ND	(MIAB_27A = NSP, R, ND) ou (MIAB_271 = NSP, R, ND) ou (MIAB_272 = NSP, R, ND) ou (MIAB_27C = NSP, R, ND) ou (MIAB_27D = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

Évaluation du critère D, partie 1 de manie au cours de la vie

Valeur de MIABDD1	Condition(s)	Explication
1	(MIAB_09 = 4, 5) ou (MIAB_09A = 1, 2) ou MIABD277 = 1 ou 5 <= MIAB_29 <= 365 ou MIAB_33 = 1	Le répondant remplit le critère D, partie 1 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours de la vie. La perturbation de l'humeur a été suffisamment sévère pour causer une altération marquée des activités quotidiennes normales, du fonctionnement professionnel ou des activités sociales habituelles, ou des relations avec les autres.
2	(MIAB_09 = 1, 2, SO) ou [(MIAB_09 = 3, SO) et (MIAB_09A = 3, 4, SO) et MIABD277 = 2 et (MIAB_29 < 5 ou MIAB_29 = SO) et (MIAB_33 = 2, SO)]	Le répondant ne remplit pas le critère D, partie 1 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré d'altération marquée de son fonctionnement professionnel ni de ses activités sociales habituelles ni de ses relations avec les autres.
ND	(MIAB_09 = NSP, R, ND) ou (MIAB_09A = NSP, R, ND) ou MIABD277 = ND ou (MIAB_29 = NSP, R, ND) ou (MIAB_33 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

12) Manie au cours de la vie - critère D, partie 2

Nom de la variable : MIABDD2

Basée sur : MIAB_33, MIAB_48

Description : Cette variable indique si la perturbation de l'humeur survenue au cours de la vie était suffisamment sévère pour nécessiter une hospitalisation afin d'empêcher que le répondant ne se fasse du tort.

Valeur de MIABDD2	Condition(s)	Explication
1	MIAB_48 = 1	Le répondant remplit le critère D, partie 2 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours de la vie. Le répondant a déclaré que la perturbation de l'humeur était suffisamment sévère pour nécessiter une hospitalisation afin d'empêcher qu'il ne se fasse du tort.
2	(MIAB_48 = 2, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère D, partie 2 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré que la perturbation de l'humeur était suffisamment sévère pour nécessiter une hospitalisation afin d'empêcher qu'il se fasse du tort.
ND	(MIAB_33 = NSP, R, ND) ou (MIAB_48 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

13) Manie au cours de la vie - critère D, partie 3

Nom de la variable : MIABDD3

Basée sur : MIAB_070

Description : Cette variable indique si le répondant a déclaré des caractéristiques psychotiques, comme penser qu'il était quelqu'un d'autre, ou penser qu'il avait un lien particulier avec une personne célèbre alors qu'en réalité ce n'était pas le cas.

Valeur de MIABDD3	Condition(s)	Explication
1	MIAB_070 = 1	Le répondant remplit le critère D, partie 3 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours de la vie. Le répondant a déclaré des caractéristiques psychotiques.
2	(MIAB_070 = 2, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère D, partie 3 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré de caractéristiques psychotiques.
ND	(MIAB_070 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

14) Manie au cours de la vie - critère D (parties 1, 2 et 3 combinées)

Nom de la variable : MIABDD

Basée sur : MIABDD1, MIABDD2, MIABDD3

Description : Cette variable indique si le répondant remplit le critère D de l'algorithme l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours de la vie. Le critère est rempli si le répondant déclare l'un des points suivants :

1. une altération marquée de ses activités quotidiennes normales, de son fonctionnement professionnel, de ses activités sociales habituelles, ou de ses relations avec les autres;
2. des caractéristiques psychotiques présentes durant la période de perturbation de l'humeur; ou
3. une perturbation de l'humeur étant suffisamment sévère pour nécessiter l'hospitalisation afin d'empêcher qu'il se fasse du tort.

Valeur de MIABDD	Condition(s)	Explication
1	MIABDD1 = 1 ou MIABDD2 = 1 ou MIABDD3 = 1	Le répondant remplit le critère D de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours de la vie. Le répondant a déclaré une altération marquée de son fonctionnement ou des caractéristiques psychotiques ou une hospitalisation.
2	MIABDD1 = 2 et MIABDD2 = 2 et MIABDD3 = 2	Le répondant ne remplit pas le critère D de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré d'altération marquée de son fonctionnement ni de caractéristiques psychotiques ni d'hospitalisation.
ND	MIABDD1 = ND ou MIABDD2 = ND ou MIABDD3 = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

15) Algorithme pour la manie au cours de la vie

Nom de la variable : MIABDEPS

Basée sur : MIABDA, MIABDB, MIABDD

Description : Cette variable indique si le répondant remplit ou non les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la manie au cours de la vie. Les répondants qui remplissent les critères déclarent :

1. une période nettement délimitée durant laquelle leur humeur était élevée, expansive ou irritable de façon anormale et persistante qui a duré au moins une semaine;
2. la manifestation d'au moins trois des sept symptômes (ou au moins quatre si l'humeur était seulement irritable) durant la période de perturbation de l'humeur. Les symptômes sont l'augmentation de l'estime de soi ou des idées de grandeur, la réduction du besoin de sommeil, une plus grande communicabilité que d'habitude ou le désir de parler constamment, la fuite des idées ou la sensation que les pensées défilent, la distractivité, l'augmentation de l'activité orientée vers un but ou une agitation psychomotrice, et un engagement excessif dans des activités agréables mais à potentiel élevé de conséquences dommageables;
3. une altération marquée des activités quotidiennes normales, du fonctionnement professionnel ou des activités sociales habituelles ou des relations avec les autres; ou que la perturbation de l'humeur présentait des caractéristiques psychotiques; ou que la perturbation de l'humeur a été suffisamment sévère pour nécessiter une hospitalisation.

Valeur de MIABDEPS	Condition(s)	Explication
1	MIABDA = 1 et MIABDB = 1 et MIABDD = 1	Le répondant remplit tous les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un épisode de manie au cours de la vie.
2	MIABDA = 2 ou MIABDB = 2 ou MIABDD = 2	Le répondant ne remplit pas tous les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un épisode de manie au cours de la vie.
ND	MIABDA = ND ou MIABDB = ND ou MIABDD = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

16) Manie – âge au moment de l'apparition - Variable groupée

Nom de la variable : MIABGON

Basée sur : MIAB_03A, MIAB_03C, MIAB_06A, MIAB_06C, MIAB_18A, MIAB_18B, MIAB_48A, MIABDEPS

Description : Cette variable indique l'âge qu'avait le répondant au début du premier épisode maniaque. Cette variable est calculée uniquement pour les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de manie au cours de la vie.

Des enregistrements ont été regroupés par tranche d'âge afin d'assurer la confidentialité. Voir dictionnaire de données.

Valeur de MIABGON	Condition(s)	Explication
SO	MIABDEPS = 2	Le répondant ne remplit pas les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de manie au cours de la vie.
Valeur minimale de (MIAB_03A, MIAB_03C, MIAB_06A, MIAB_06C, MIAB_18A, MIAB_18B, MIAB_48A) (min : 0; max : âge actuel)	MIABDEPS = 1 et (MIAB_03A < SO ou MIAB_03C < SO ou MIAB_06A < SO ou MIAB_06C < SO ou MIAB_18A < SO ou MIAB_18B < SO ou MIAB_48A < SO)	Âge du répondant au moment du premier épisode de manie.
ND	MIABDEPS = ND ou (MIAB_03A = NSP, R, ND) ou (MIAB_03C = NSP, R, ND) ou (MIAB_06A = NSP, R, ND) ou (MIAB_06C = NSP, R, ND) ou (MIAB_18A = NSP, R, ND) ou (MIAB_18B = NSP, R, ND) ou (MIAB_48A = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

Reformatages temporaires

Reformatage	Explication
Si (MIAB_03A = SO, NSP, R, ND) alors MIARQ03A = manquant Si (MIAB_03C = SO, NSP, R, ND) alors MIARQ03C = manquant Si (MIAB_06A = SO, NSP, R, ND) alors MIARQ06A = manquant Si (MIAB_06C = SO, NSP, R, ND) alors MIARQ06C = manquant Si (MIAB_18A = SO, NSP, R, ND) alors MIARQ18A = manquant	Non-réponse recodée à manquant.

Si (MIAB_18B = SO, NSP, R, ND) alors MIARQ8B = manquant	
Si (MIAB_19D = SO, NSP, R, ND) alors MIARQ19D = manquant	

17) Manie – âge lors du plus récent épisode - Variable groupée

Nom de la variable : MIABGREC

Basée sur : MIAB_03A, MIAB_03C, MIAB_06A, MIAB_06C, MIAB_18A, MIAB_18B, MIAB_19, MIAB_191, MIAB_19D, MIAB_48A, DHHB_AGE, MIABDEPS

Description : Cette variable indique l'âge du répondant lors du dernier épisode maniaque. La valeur de cette variable n'est calculée que pour les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI d'un épisode de manie.

Des enregistrements ont été regroupés par tranche d'âge afin d'assurer la confidentialité. Voir dictionnaire de données.

Valeur de MIABGREC	Condition(s)	Explication
SO	MIABDEPS = 2	Le répondant ne remplit pas les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de manie au cours de la vie.
Valeur de DHHB_AGE	MIABDEPS = 1 et (MIAB_19 = 1 ou MIAB_191 = 1)	L'âge au moment du plus récent épisode est l'âge courant si le répondant a déclaré un épisode au cours des 12 derniers mois.
ND	(MIAB_03C => SO et MIAB_06C => SO et MIAB_19D => SO) et Au moins une fois où (MIAB_03C, MIAB_06C, MIAB_19D = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (sans objet, ne sait pas, refus, non déclaré) aux questions indicatrices prévues de « l'épisode le plus récent. »
Valeur maximale à (MIAB_03A, MIAB_03C, MIAB_06A, MIAB_06C, MIAB_18A, MIAB_18B, MIAB_19D) (min : 0; max : âge actuel)	MIABDEPS = 1 et (MIAB_03A < SO ou MIAB_03C < SO ou MIAB_06A < SO ou MIAB_06C < SO ou MIAB_18A < SO ou MIAB_18B < SO ou MIAB_19D < SO)	L'âge au moment de l'épisode le plus récent est l'âge le plus avancé pour l'ensemble des épisodes maniaques déclarés.
ND	MIABDEPS = ND ou (MIAB_03A = NSP, R, ND) ou (MIAB_03C = NSP, R, ND) ou (MIAB_06A = NSP, R, ND) ou (MIAB_06C = NSP, R, ND) ou (MIAB_18A = NSP, R, ND) ou (MIAB_18B = NSP, R, ND) ou (MIAB_19D = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

18) Manie - Persistance de la manie - Variable groupée

Nom de la variable : MIABGPER

Basée sur : MIABG3B, MIABG3D, MIABG6B, MIABG6D, MIABG18D, MIABG22, MIABDEPS

Description : Cette variable indique la plus longue période de manie vécue par le répondant. Sa valeur est calculée selon le plus long épisode vécu. La valeur est calculée uniquement pour les répondants qui remplissent les critères de manie au cours de la vie.

Des enregistrements ont été regroupés par tranche de durées afin d'assurer la confidentialité. Voir dictionnaire de données.

Valeur de MIABGPER	Condition(s)	Explication
SO	MIABDEPS = 2	Le répondant ne remplit pas les critères d'un épisode maniaque au cours de sa vie.
ND	MIABG22 = ND	Le répondant n'a pas répondu (non déclaré) à la question indicatrice prévue de l'« épisode le plus long ».
Valeur maximale à (MIABG3B, MIABG3D, MIABG6B, MIABG6D, MIABG18D, MIABG22) (min : 0; max : âge actuel)	MIABDEPS = 1 et (MIABG3B < SO ou MIABG3D < SO ou MIABG6B < SO ou MIABG6D < SO ou MIABG18D < SO ou MIABG22 < SO)	La persistance est la durée de l'épisode maniaque le plus long déclaré par le répondant. Minimum de 2 semaines jusqu'à un maximum de 5 ans ou plus
ND	MIABDEPS = ND ou (MIABG3B = SO, ND) ou (MIABG3D = SO, ND) ou (MIABG6B = SO, ND) ou (MIABG6D = SO, ND) ou (MIABG18D = SO, ND) ou MIABG22 = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (sans objet, non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

Manie – Douze derniers mois

19) Manie au cours des 12 derniers mois - critère A

Nom de la variable : MIABDYA

Basée sur : MIABDEPS

Description : Cette variable identifie les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI d'un épisode maniaque au cours de la vie.

Valeur de MIABDYA	Condition(s)	Explication
1	MIABDEPS = 1	Le répondant remplit le critère A. Le répondant remplit les critères de diagnostic de manie au cours de la vie.
2	MIABDEPS = 2	Le répondant ne remplit pas le critère A. Le répondant ne remplit pas les critères de diagnostic de manie au cours de la vie.
ND	MIABDEPS = ND	Le répondant a une valeur de non-

		réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul.
--	--	---

20) Manie au cours des 12 derniers mois - critère B

Nom de la variable : MIABDYB

Basée sur : MIAB_19, MIAB_191, MIAB_03A, MIAB_03C, MIAB_06A, MIAB_06C, MIAB_18A, MIAB_18B, DHHB_AGE

Description : Cette variable identifie les répondants qui déclarent avoir vécu un épisode maniaque au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.

Valeur de MIABDYB	Condition(s)	Explication
1	MIAB_19 = 1 ou MIAB_191 = 1 ou MIAB_03A = DHHB_AGE ou MIAB_03C = DHHB_AGE ou MIAB_06A = DHHB_AGE ou MIAB_06C = DHHB_AGE ou MIAB_18A = DHHB_AGE ou MIAB_18B = DHHB_AGE	Le répondant remplit le critère B de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de manie au cours des 12 derniers mois. Le répondant a déclaré avoir vécu un épisode maniaque au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.
2	[MIAB_19 = 2 ou MIAB_191 = 2 ou (MIAB_19 = SO et MIAB_191 = SO)] et [MIAB_03A < DHHB_AGE ou MIAB_03C < DHHB_AGE ou MIAB_06A < DHHB_AGE ou MIAB_06C < DHHB_AGE ou (MIAB_03A = SO et MIAB_03C = SO et MIAB_06A = SO et MIAB_06C = SO)] et [MIAB_18A < DHHB_AGE ou MIAB_18B < DHHB_AGE ou (MIAB_18A = SO et MIAB_18B = SO)]	Le répondant ne remplit pas le critère B de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de manie au cours des 12 derniers mois. Le répondant n'a pas déclaré avoir vécu un épisode maniaque au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.
ND	(MIAB_19 = NSP, R, ND) ou (MIAB_191 = NSP, R, ND) ou (MIAB_03A = NSP, R, ND) ou (MIAB_03C = NSP, R, ND) ou (MIAB_06A = NSP, R, ND) ou (MIAB_06C = NSP, R, ND) ou (MIAB_18A = NSP, R, ND) ou (MIAB_18B = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

21) Manie au cours des 12 derniers mois - critère C**Nom de la variable :** MIABDYC**Basée sur :** MIAB_27A, MIAB_271, MIAB_272, MIAB_27C, MIAB_27D, MIAB_29, MIAB_47**Description :** Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré des symptômes maniaques qui induisent une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.

Valeur de MIABDYC	Condition(s)	Explication
1	$7 \leq \text{MIAB_27A} \leq 10$ ou $7 \leq \text{MIAB_271} \leq 10$ ou $7 \leq \text{MIAB_272} \leq 10$ ou $7 \leq \text{MIAB_27C} \leq 10$ ou $7 \leq \text{MIAB_27D} \leq 10$ ou $5 \leq \text{MIAB_29} \leq 365$ ou $\text{MIAB_47} = 1$	<p>Le répondant remplit le critère C de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours des 12 derniers mois.</p> <p>Le répondant a déclaré une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.</p>
2	$(0 \leq \text{MIAB_27A} < 7$ ou $\text{MIAB_27A} = \text{SO})$ et $[0 \leq \text{MIAB_271} < 7$ ou $(\text{MIAB_271} = 11, \text{SO})]$ et $[0 \leq \text{MIAB_272} < 7$ ou $(\text{MIAB_272} = 11, \text{SO})]$ et $(0 \leq \text{MIAB_27C} < 7$ ou $\text{MIAB_27C} = \text{SO})$ et $(0 \leq \text{MIAB_27D} < 7$ ou $\text{MIAB_27D} = \text{SO})$ et $(0 \leq \text{MIAB_29} < 5$ ou $\text{MIAB_29} = \text{SO})$ et $(\text{MIAB_47} = 2, \text{SO})$	<p>Le répondant ne remplit pas le critère C de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours des 12 derniers mois.</p> <p>Le répondant n'a pas déclaré de détresse cliniquement significative ni d'altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.</p>
ND	$(\text{MIAB_27A} = \text{NSP}, \text{R}, \text{ND})$ ou $(\text{MIAB_271} = \text{NSP}, \text{R}, \text{ND})$ ou $(\text{MIAB_272} = \text{NSP}, \text{R}, \text{ND})$ ou $(\text{MIAB_27C} = \text{NSP}, \text{R}, \text{ND})$ ou $(\text{MIAB_27D} = \text{NSP}, \text{R}, \text{ND})$ ou $(\text{MIAB_29} = \text{NSP}, \text{R}, \text{ND})$ ou $(\text{MIAB_47} = \text{NSP}, \text{R}, \text{ND})$	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

22) Algorithme pour la manie au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : MIABDEY

Basée sur : MIABDYA, MIABDYB, MIABDYC

Description : Il s'agit de la variable finale qui indique si le répondant remplit ou non les critères de L'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la manie au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview. Les répondants qui remplissent les critères déclarent :

1. répondre aux critères pour la manie au cours de la vie,
2. avoir vécu un épisode maniaque au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview et
3. une détresse cliniquement significative ou une altération de leur fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.

Valeur de MIABDEY	Condition(s)	Explication
1	MIABDYA = 1 et MIABDYB = 1 et MIABDYC = 1	Tous les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI sont remplis pour la manie au cours des 12 derniers mois. Le répondant a déclaré (1) remplir les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la manie au cours de la vie, (2) avoir vécu un épisode maniaque au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview, et (3) une détresse cliniquement significative ou une altération de son fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.
2	MIABDYA = 2 ou MIABDYB = 2 ou MIABDYC = 2	Tous les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI ne sont pas remplis pour la manie au cours des 12 derniers mois. Le répondant n'a pas déclaré (1) remplir les critères pour la manie au cours de la vie, (2) avoir vécu un épisode maniaque au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview, ou (3) une détresse cliniquement significative ou une altération de son fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.
ND	MIABDYA = ND ou MIABDYB = ND ou MIABDYC = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

23) Trouble attribuable à la manie – moyenne

Nom de la variable : MIABDINT

Basée sur : MIAB_27A, MIAB_271, MIAB_272, MIAB_27C, MIAB_27D, MIABDEY

Description : Cette variable décrit le trouble que la manie a entraîné sur les activités et les responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s'agit d'une moyenne des cinq items.

Nota : Cette variable n'est calculée que pour les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de manie au cours des 12 derniers mois.

Valeur de MIABDINT	Condition(s)	Explication
SO	MIABDEY = 2	Le répondant ne remplissait pas les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de manie au cours des 12 derniers mois.
ND	MIAB_27A = SO et MIAB_271 = SO et MIAB_272 = SO et MIAB_27C = SO et MIAB_27D = SO	Le répondant a répondu avoir vécu un épisode de manie au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview, mais les questions concernant le trouble n'ont pas été posées au répondant parce qu'il y avait incohérence dans ses réponses.
ND	MIABDEY = ND ou (MIAB_27A = NSP, R, ou ND) ou (MIAB_271 = NSP, R, ou ND) ou (MIAB_272 = NSP, R, ou ND) ou (MIAB_27C = NSP, R, ou ND) ou (MIAB_27D = NSP, R, ou ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
$(MIAB_27A + MIAB_271 + MIAB_272 + MIAB_27C + MIAB_27D) / 5$ (min : 0.0; max: 10.0) (arrondir à .1)	MIABDEY = 1 et 0 <= MIAB_271 <= 10 et 0 <= MIAB_272 <= 10 et 0 <= MIAB_27A <= 10 et 0 <= MIAB_27C <= 10 et 0 <= MIAB_27D <= 10	Trouble = moyenne des cinq items. Le répondant a répondu aux cinq questions.
$(MIAB_27A + MIAB_272 + MIAB_27C + MIAB_27D) / 4$ (min : 0.0; max: 10.0) (arrondir à .1)	MIABDEY = 1 et MIAB_271 = 11 et 0 <= MIAB_272 <= 10 et 0 <= MIAB_27A <= 10 et 0 <= MIAB_27C <= 10 et 0 <= MIAB_27D <= 10	Trouble = moyenne de quatre items qui s'appliquaient au répondant. MIAB_271 ne s'appliquait pas.
$(MIAB_27A + MIAB_271 + MIAB_27C + MIAB_27D) / 4$ (min : 0.0; max: 10.0) (arrondir à .1)	MIABDEY = 1 et 0 <= MIAB_271 <= 10 et MIAB_272 = 11 et 0 <= MIAB_27A <= 10 et 0 <= MIAB_27C <= 10 et 0 <= MIAB_27D <= 10	Trouble = moyenne de quatre items qui s'appliquaient au répondant. MIAB_272 ne s'appliquait pas.
$(MIAB_27A + MIAB_27C + MIAB_27D) / 3$ (min : 0.0; max: 10.0) (arrondir à .1)	MIABDEY = 1 et MIAB_271 = 11 et MIAB_272 = 11 et 0 <= MIAB_27A <= 10 et 0 <= MIAB_27C <= 10 et 0 <= MIAB_27D <= 10	Trouble = moyenne de trois items qui s'appliquaient au répondant. MIAB_271 et MIAB_272 ne s'appliquaient pas.

24) Indicateur du trouble attribuable à la manie

Nom de la variable : MIABFINT

Basée sur : MIAB_27A, MIAB_271, MIAB_272, MIAB_27C, MIAB_27D, MIABDEY

Description : Cette variable décrit le trouble que la manie a entraîné sur les activités et les responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s'agit d'une classification indiquant si la manie trouble de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires) ou les activités sociales ou les relations personnelles. Cette variable n'est calculée que pour les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de manie au cours des 12 derniers mois.

Valeur de MIABFINT	Condition(s)	Explication
SO	MIABDEY = 2	Le répondant ne remplissait pas les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de manie au cours des 12 derniers mois.
ND	MIAB_27A = SO et MIAB_271 = SO et MIAB_272 = SO et MIAB_27C = SO et MIAB_27D = SO	Le répondant a répondu avoir vécu un épisode de manie au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview, mais les questions concernant le trouble n'ont pas été posées au répondant parce qu'il y avait incohérence dans ses réponses.
1	MIABDEY = 1 et (7 <= MIAB_27A <= 10 ou 7 <= MIAB_271 <= 10 ou 7 <= MIAB_272 <= 10 ou 7 <= MIAB_27C <= 10 ou 7 <= MIAB_27D <= 10)	La manie a troublé de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires) ou les activités sociales ou les relations personnelles au cours des 12 derniers mois.
2	MIABDEY = 1 et [0 <= MIAB_27A <= 6 et (0 <= MIAB_271 <= 6 ou MIAB_271 = 11) et (0 <= MIAB_272 <= 6 ou MIAB_272 = 11) et 0 <= MIAB_27C <= 6 et 0 <= MIAB_27D <= 6]	La manie n'a pas perturbé de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires) ou les activités sociales ou les relations avec autrui de la personne au cours des 12 derniers mois.
ND	MIABDEY = ND ou (MIAB_27A = NSP, R, ou ND) ou (MIAB_271 = NSP, R, ou ND) ou (MIAB_272 = NSP, R, ou ND) ou (MIAB_27C = NSP, R, ou ND) ou (MIAB_27D = NSP, R, ou ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

Trouble panique (19 VD)

Pour les besoins de l'ESCC 1.2, le trouble panique est caractérisé par des attaques récurrentes et inattendues de crainte intense et d'anxiété en l'absence d'un vrai danger accompagnées de symptômes physiologiques, comme des palpitations, une douleur à la poitrine, une sensation d'étouffement, une sensation de vertige, de la transpiration, des nausées ou une gêne abdominale, des tremblements ou des bouffées de chaleur ou des frissons.

Les questions sur le trouble panique sont fondées sur une version reconnue du World Mental Health du Composite International Diagnostic Interview (WMH-CIDI) et modifiée pour les besoins du cycle 1.2 de l'ESCC. L'instrument WMH-CIDI, qui fait partie du projet «World Mental Health 2000» (WMH2000), est une initiative de l'Organisation mondiale de la santé destinée à évaluer la prévalence de divers troubles mentaux dans plusieurs pays à travers le monde.

Le WMH-CIDI est un questionnaire normalisé pour l'évaluation des troubles mentaux conformément à une opérationnalisation des définitions et critères du DSM-IV et de la CIM-10. L'abréviation DSM désigne le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié par l'American Psychiatric Association. Il s'agit d'une classification des troubles mentaux reconnue à l'échelle internationale dont il existe plusieurs versions. Les troubles ou problèmes mentaux étudiés dans le cadre de l'ESCC 1.2 sont codés de façon partielle selon le DSM-IV ou le DSM-III-R. L'ESCC 1.2 n'offre aucun soutien vis-à-vis les algorithmes de la CIM-10.

Le projet WMH2000 a été adapté à plusieurs versions IPAQ (interview sur place assistée par ordinateur) et IPC (interview papier et crayon) du questionnaire WMH-CIDI. Les responsables du projet ont déjà créé un groupe de travail qui examinera les différences méthodologiques pour s'assurer que les comparaisons entre pays soient faites de façon appropriée.

Le trouble panique est l'un des cinq états de santé mentale du projet WMH2000 visés par cette enquête. Celle-ci est conçue pour évaluer le diagnostic du trouble panique au cours de la vie et au cours des 12 derniers mois. Un épisode au cours des 12 derniers mois s'entend des 12 mois qui ont précédé l'interview.

La documentation qui accompagne les données de l'ESCC 1.2 fournit des renseignements sur toutes les variables dérivées temporaires utilisées pour calculer les variables dérivées finales de troubles dont le profil est établi au cours de la vie et au cours des 12 derniers mois. Pour la plupart des utilisateurs des données, les variables dérivées finales et les variables dérivées ayant trait à la récurrence, à la durée, à l'âge au moment de l'apparition et à la perturbation associée au trouble suffiront pour réaliser les analyses.

En ce qui concerne le trouble panique, les variables d'intérêt sont :

Variable	Concept	Numéro de la variable
PADBATT	Algorithme – vie- attaque	4
PADBDPDS	Algorithme – vie - trouble	8
PADBDATY	Algorithme - 12 mois - attaque	13
PADBDDY	Algorithme – 12 mois - trouble	17
PADBGONA	Apparition – attaque	9
PADBGON	Apparition - trouble	10

PADBGREC	Récence	11
PADBGPER	Persistance	12
PADBDINT	Perturbation / trouble – 12 mois	18

Les critères utilisés pour produire les variables dérivées finales ainsi que leurs variables temporaires respectives sont opérationnalisés de façon à satisfaire partiellement aux définitions/classification du DSM-IV. Bien que le questionnaire et les algorithmes soient fondés sur des approches et une classification reconnues mondialement, cette méthode ne peut être utilisée pour poser le diagnostic du trouble chez les personnes présentant ce profil. Seuls des professionnels ayant la formation médicale requise peuvent le faire.

L'instrument de l'ESCC 1.2 permet de recueillir une foule d'informations sur le nombre de symptômes, la gravité, la durée et l'intensité globale du trouble. Toutefois, l'approche structurée utilisée pour l'instrument informatisé n'est pas conçue pour recueillir certains renseignements complexes utilisés par ceux ayant reçu une formation professionnelle pour poser le diagnostic final conformément à la classification du DSM-IV. Ainsi, il n'existe aucun algorithme pour appuyer la création de variables dérivées en rapport avec les spécificateurs/sous-types du trouble. En outre, bien que l'instrument soit conçu pour recueillir certains renseignements utilisés pour l'opérationnalisation des exclusions physiques/organiques et des règles hiérarchiques, Statistique Canada recommande que cette information soit utilisée par des spécialistes du DSM étant donné sa nature complexe.

En plus de l'information sur les états de santé mentale, le questionnaire WMH-CIDI permet de recueillir des renseignements sur un grand nombre de corrélats importants de la santé mentale, comme l'utilisation des services de santé et le soutien. Toutefois, les données de l'ESCC 1.2 recueillies sur les corrélats de la santé mentale ne sont pas fondées sur le questionnaire WMH-CIDI. Bien que les comparaisons internationales de ce genre de données soient importantes, après avoir consulté les divers intervenants, Statistique Canada a décidé que les données de l'ESCC 1.2 devraient appuyer et compléter l'information canadienne déjà recueillie dans le cadre de l'ESCC 1.1 et des cycles de l'ENSP réalisés antérieurement.

Pour simplifier la comparaison au DSM, les critères sont présentés plus ou moins selon le modèle du DSM-IV. Cette correspondance vise uniquement à faciliter l'interprétation des résultats en permettant un langage commun. Toutefois, il serait inapproprié de conclure à l'existence d'une correspondance directe entre nos critères et ceux du DSM-IV en raison de la nature complexe du sujet et des limites opérationnelles associées au questionnaire et aux algorithmes.

Pour les besoins de cette enquête, les répondants qui remplissent les critères ESCC 1.2/WMH-CIDI du trouble panique au cours de la vie sont ceux qui déclarent :

1. des attaques de panique récurrentes et inattendues dont au moins une a été suivie pendant un mois ou plus de la crainte d'avoir d'autres attaques ou de préoccupations à propos de leurs conséquences ou d'un changement de comportement important en relation avec les attaques;

Pour les besoins de cette enquête, les répondants qui remplissent les critères ESCC 1.2/WMH-CIDI du trouble panique au cours des 12 derniers mois sont ceux qui :

1. remplissent les critères de diagnostic d'un trouble panique au cours de la vie,
2. déclarent avoir eu une attaque au cours des 12 derniers mois et
3. déclarent avoir éprouvé une détresse émotionnelle.

Pour les besoins de cette enquête, les répondants qui remplissent les critères ESCC 1.2/WMH-CIDI pour une attaque de panique au cours de la vie sont ceux qui déclarent :

1. qu'ils ont vécu une période bien délimitée de crainte ou de malaise intense,

2. qu'ils ont éprouvé au moins quatre symptômes physiologiques et
3. que les symptômes sont survenus de façon brutale ou ont atteint leur niveau le plus fort dans les 10 premières minutes survenu leur apparition.

Pour les besoins de cette enquête, les répondants qui remplissent les critères ESCC 1.2/WMH-CIDI pour une attaque de panique au cours des 12 derniers mois sont ceux qui :

1. remplissent les critères d'une attaque de panique au cours de la vie et
2. déclarent avoir vécu une attaque de panique au cours des 12 derniers mois.

Attaque de panique au cours de la vie

1) Attaque de panique au cours de la vie - critère A

Nom de la variable : PADBDA

Basée sur : SCRB_20, SCRB_20A

Description : Cette variable évalue le critère A de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI d'attaque de panique au cours de la vie. Elle identifie les répondants qui déclarent avoir vécu une période bien délimitée de crainte ou de malaise intense à un moment donné de leur vie.

Valeur de PADBDA	Condition(s)	Explication
1	SCRB_20 = 1 ou SCRB_20A = 1	Le répondant remplit le critère A d'attaque de panique au cours de la vie. Le répondant a déclaré une période bien délimitée de crainte ou de malaise intense.
2	SCRB_20 = 2 et SCRB_20A = 2	Le répondant ne remplit pas le critère A d'attaque de panique au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré une période bien délimitée de crainte ou de malaise intense.
ND	(SCRB_20 = NSP, R, ND) ou (SCRB_20A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une des questions nécessaires au calcul.

2) Attaque de panique au cours de la vie - critère B

Nom de la variable : PADBDB

Basée sur : PADBDB01, PADBDB02, PADBDB03, PADBDB04, PADBDB05, PADBDB06, PADBDB07, PADBDB08, PADBDB09, PADBDB10, PADBDB11, PADBDB12, PADBDB13, PADBDB14

Description : Cette variable évalue le critère B d'attaque de panique au cours de la vie. Le critère est rempli si le répondant a déclaré qu'au moins quatre des 14 symptômes suivants accompagnait l'attaque de panique :

1. palpitations, battements de cœur ou accélération du rythme cardiaque,
2. transpiration,
3. tremblements ou frémissements,
4. souffle court,
5. sensation d'étouffement,
6. douleur ou gêne à la poitrine,
7. nausée ou gêne abdominale,
8. sensation de vertige, d'instabilité, d'étourdissement ou impression d'évanouissement,
9. sentiments d'irréalité ou être détaché de soi,

10. peur de perdre le contrôle de soi ou de devenir fou,
11. peur de mourir,
12. sensations d'engourdissement ou de picotements,
13. frissons ou bouffées de chaleur,
14. bouche sèche.

On crée d'abord les variables pour ces symptômes, puis on les utilise pour calculer la valeur pour le critère B.

Nota : Le questionnaire a été conçu de sorte que l'intervieweur passait à la question PADB_03 aussitôt que le répondant avait répondu par « oui » à quatre des questions PADB_01A à PADB_01P. On a supposé que, une fois qu'une réponse affirmative avait été recueillie pour quatre questions, le critère B de l'attaque de panique ayant trait à la manifestation d'au moins quatre symptômes était rempli. Cependant, cette stratégie de saut de questions ne tenait pas compte du fait que PADB_01G (bouche sèche) n'était pas l'un des symptômes figurant dans l'algorithme original DSM-IV et du fait que PADB_01D et PADB_01M contribuent toutes deux à l'évaluation du même symptôme (sensations de vertige, d'instabilité, d'étourdissement ou impression d'évanouissement). Cela signifiait que les répondants qui avaient répondu affirmativement à quatre questions et sautaient le reste de la liste avant d'atteindre PADB_01P ne déclaraient que trois symptômes et ne remplissaient pas le critère B d'attaque de panique. Le même constat s'applique à ceux qui avaient répondu affirmativement à PADB_01G ou PADB_01D et PADB_01M. Ils ne rencontreront pas le critère B pour une attaque de panique. Ce dernier est un critère nécessaire pour l'attaque de panique et le trouble panique. Après avoir consulté l'équipe du WMH2000, on a ajouté le symptôme 14 (bouche sèche) afin de tenir compte de PADB_01G. Aucune modification n'a été faite pour accommoder PADB_01D et PADB_01M.

2a) Symptôme 1 – palpitations, battements de cœur ou accélération du rythme cardiaque

Nom de la variable : PADBDB01

Basée sur : PADB_01A

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré des palpitations, des battements de cœur ou une accélération du rythme cardiaque en tant que symptômes accompagnant une attaque de panique.

Valeur de PADBDB01	Condition(s)	Explication
1	PADB_01A = 1	Le répondant a déclaré des symptômes de palpitations, de battements de cœur ou d'accélération du rythme cardiaque.
2	(PADB_01A = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré de symptômes de palpitations, de battements de cœur ni d'accélération du rythme cardiaque.
ND	(PADB_01A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

2b) Symptôme 2 – transpiration

Nom de la variable : PADBDB02

Basée sur : PADB_01E

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré transpirer en tant que symptôme accompagnant une attaque de panique.

Valeur de PADBDB02	Condition(s)	Explication
1	PADB_01E = 1	Le répondant a déclaré des symptômes de transpiration.
2	(PADB_01E = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré de symptômes de transpiration.
ND	(PADB_01E = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la

		question nécessaire au calcul.
--	--	--------------------------------

2c) Symptôme 3 – frémissements ou tremblements**Nom de la variable :** PADBDB03**Basée sur :** PADB_01F**Description :** Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré des tremblements ou des frémissements en tant que symptômes accompagnant une attaque de panique.

Valeur de PADBDB03	Condition(s)	Explication
1	PADB_01F = 1	Le répondant a déclaré des symptômes de tremblements ou de frémissements.
2	(PADB_01F = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré de symptômes de tremblements ni de frémissements.
ND	(PADB_01F = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

2d) Symptôme 4 – sensation de souffle court**Nom de la variable :** PADBDB04**Basée sur :** PADB_01B**Description :** Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré une sensation de souffle court en tant que symptôme accompagnant une attaque de panique.

Valeur de PADBDB04	Condition(s)	Explication
1	PADB_01B = 1	Le répondant a déclaré une sensation de souffle court.
2	(PADB_01B = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré de sensation de souffle court.
ND	(PADB_01B = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

2e) Symptôme 5 – sensation d'étouffement**Nom de la variable :** PADBDB05**Basée sur :** PADB_01H**Description :** Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré une sensation d'étouffement en tant que symptôme accompagnant une attaque de panique.

Valeur de PADBDB05	Condition(s)	Explication
1	PADB_01H = 1	Le répondant a déclaré une sensation d'étouffement.
2	(PADB_01H = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré de sensation d'étouffement.
ND	(PADB_01H = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

2f) Symptôme 6 – douleur ou gêne thoracique**Nom de la variable :** PADBDB06**Basée sur :** PADB_01I**Description :** Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré une douleur ou une gêne à la poitrine en tant que symptômes accompagnant une attaque de panique.

Valeur de PADBDB06	Condition(s)	Explication
1	PADB_01I = 1	Le répondant a déclaré des symptômes de douleur ou de gêne à la poitrine.
2	(PADB_01I = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré de symptômes de douleur ou de gêne à la poitrine.
ND	(PADB_01I = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

2g) Symptôme 7 – nausée ou gêne abdominale**Nom de la variable :** PADBDB07**Basée sur :** PADB_01C**Description :** Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré de la nausée ou une gêne abdominale en tant que symptômes accompagnant une attaque de panique.

Valeur de PADBDB07	Condition(s)	Explication
1	PADB_01C = 1	Le répondant a déclaré des symptômes de nausée ou de gêne abdominale.
2	(PADB_01C = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré de symptômes de nausée ni de gêne abdominale.
ND	(PADB_01C = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

2h) Symptôme 8 – sensations de vertige, d'instabilité, de tête vide ou impression d'évanouissement**Nom de la variable :** PADBDB08**Basée sur :** PADB_01D, PADB_01M**Description :** Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré des sensations de vertige, d'instabilité, d'étourdissement ou d'évanouissement en tant que symptômes associés à une attaque de panique.

Valeur de PADBDB08	Condition(s)	Explication
1	PADB_01D = 1 ou PADB_01M = 1	Le répondant a déclaré des sensations de vertige, d'instabilité, d'étourdissement ou d'évanouissement.
2	(PADB_01D = 2, SO) et (PADB_01M = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré des sensations de vertige, ni d'instabilité, d'étourdissement et d'évanouissement.
ND	(PADB_01D = NSP, R, ND) ou (PADB_01M = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

2i) Symptôme 9 – déréalisation ou dépersonnalisation**Nom de la variable :** PADBDB09**Basée sur :** PADB_01K, PADB_01L

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir eu la sensation qu'ils « n'étaient pas réellement là » (dépersonnalisation) ou avoir eu la sensation que les choses autour d'eux n'étaient pas réelles ou avaient l'air d'un rêve (déréalisation) en tant que symptômes accompagnant une attaque de panique.

Valeur de PADBDB09	Condition(s)	Explication
1	PADB_01K = 1 ou PADB_01L = 1	Le répondant a déclaré des symptômes de déréalisation ou de dépersonnalisation.
2	(PADB_01K = 2, SO) et (PADB_01L = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré de symptômes de déréalisation ni de dépersonnalisation.
ND	(PADB_01K = NSP, R, ND) ou (PADB_01L = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

2j) Symptôme 10 – peur de perdre le contrôle de soi ou de devenir fou**Nom de la variable :** PADBDB10**Basée sur :** PADB_01J

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré une peur de perdre le contrôle de soi ou de devenir fou en tant que symptômes accompagnant une attaque de panique.

Valeur de PADBDB10	Condition(s)	Explication
1	PADB_01J = 1	Le répondant a déclaré avoir eu peur de perdre le contrôle de soi ou de devenir fou.
2	(PADB_01J = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré avoir eu peur de perdre le contrôle de soi ni de devenir fou.
ND	(PADB_01J = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

2k) Symptôme 11 – peur de mourir**Nom de la variable :** PADBDB11**Basée sur :** PADB_01N

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir eu peur de mourir en tant que symptôme accompagnant une attaque de panique.

Valeur de PADBDB11	Condition(s)	Explication
1	PADB_01N = 1	Le répondant a déclaré avoir eu peur de mourir.
2	(PADB_01N = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré avoir eu peur de mourir.
ND	(PADB_01N = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

2l) Symptôme 12 – paresthésie**Nom de la variable :** PADBDB12**Basée sur :** PADB_01P**Description :** Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir eu des sensations d'engourdissement ou de picotements (paresthésie) en tant que symptômes accompagnant une attaque de panique.

Valeur de PADBDB12	Condition(s)	Explication
1	PADB_01P = 1	Le répondant a déclaré de la paresthésie.
2	(PADB_01P = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré de paresthésie.
ND	(PADB_01P = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

2m) Symptôme 13 – frissons ou bouffées de chaleur**Nom de la variable :** PADBDB13**Basée sur :** PADB_01O**Description :** Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir eu des frissons ou des bouffées de chaleur en tant que symptômes accompagnant une attaque de panique.

Valeur de PADBDB13	Condition(s)	Explication
1	PADB_01O = 1	Le répondant a déclaré avoir eu des frissons ou des bouffées de chaleur.
2	(PADB_01O = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré avoir eu des frissons ni des bouffées de chaleur.
ND	(PADB_01O = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

2n) Symptôme 14 – bouche sèche**Nom de la variable :** PADBDB14**Basée sur :** PADB_01G**Description :** Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir eu la bouche sèche en tant que symptôme accompagnant une attaque de panique.

Valeur de PADBDB14	Condition(s)	Explication
1	PADB_01G = 1	Le répondant a déclaré avoir eu la bouche sèche.
2	(PADB_01G = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré avoir eu la bouche sèche.
ND	(PADB_01G = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

Évaluation du critère B d'attaque de panique

Valeur de PADBDB	Condition(s)	Explication
1	Au moins 4 de (PADBDB01, PADBDB02, PADBDB03, PADBDB04, PADBDB05,	Le répondant remplit le critère B de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour attaque de panique au cours de la vie.

	PADBDB06, PADBDB07, PADBDB08, PADBDB09, PADBDB10, PADBDB11, PADBDB12, PADBDB13, PADBDB14) = 1	Le répondant a déclaré au moins quatre des symptômes accompagnant une attaque de panique.
2	Au moins 11 de (PADBDB01, PADBDB02, PADBDB03, PADBDB04, PADBDB05, PADBDB06, PADBDB07, PADBDB08, PADBDB09, PADBDB10, PADBDB11, PADBDB12, PADBDB13, PADBDB14) = 2	Le répondant ne remplit pas le critère B de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour attaque de panique au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré au moins quatre des symptômes accompagnant une attaque de panique.
ND	PADBDB01 = ND ou PADBDB02 = ND ou PADBDB03 = ND ou PADBDB04 = ND ou PADBDB05 = ND ou PADBDB06 = ND ou PADBDB07 = ND ou PADBDB08 = ND ou PADBDB09 = ND ou PADBDB10 = ND ou PADBDB11 = ND ou PADBDB12 = ND ou PADBDB13 = ND ou PADBDB14 = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

3) Attaque de panique au cours de la vie - critère C

Nom de la variable : PADBDC

Basée sur : PADB_03

Description : Cette variable évalue le critère C de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour attaque de panique au cours de la vie. Elle identifie les répondants qui ont déclaré que leurs symptômes de panique ont débuté subitement et ont atteint leur plus fort niveau dans les 10 minutes qui ont suivi le début de l'attaque.

Valeur de PADBDC	Condition(s)	Explication
1	PADB_03 = 1	Le répondant remplit le critère C d'attaque de panique au cours de la vie. Le répondant a déclaré que les symptômes de panique ont débuté subitement et atteint leur plus fort niveau dans les 10 premières minutes.
2	(PADB_03 = 2, SO, NSP)	Le répondant ne remplit pas le critère C d'attaque de panique au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré ou ne sait pas si les symptômes ont débuté subitement ou qu'ils ont atteint leur plus fort niveau dans les 10 premières minutes.

ND	(PADB_03 = R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
----	-------------------	---

4) Algorithme pour attaque de panique au cours de la vie

Nom de la variable : PADBDATT

Basée sur : PADBDA, PADBDB, PADBDC

Description : Cette variable indique si le répondant remplit le critère de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour attaque de panique au cours de la vie. Les répondants qui remplissent les critères déclarent :

1. une période bien délimitée de crainte ou de malaise intense;
2. au moins quatre des 14 symptômes suivants associés à la panique : palpitations, battements de cœur ou accélération du rythme cardiaque; transpiration; tremblements ou frémissements; sensation de souffle court; sensation d'étouffement; douleur ou gêne thoracique; nausées ou gêne abdominale; sensations de vertige, d'instabilité, d'étourdissement ou impression d'évanouissement; sentiment d'irréalité ou d'être détaché de soi; peur de perdre le contrôle de soi ou de devenir fou; peur de mourir; sensations d'engourdissement ou de picotements; frissons ou bouffées de chaleur; bouche sèche; et
3. que les symptômes sont survenus de façon subite et ont atteint leur niveau le plus fort dans les 10 minutes qui ont suivi le début de l'attaque.

Valeur de PADBDATT	Condition(s)	Explication
1	PADBDA = 1 et PADBDB = 1 et PADBDC = 1	Le répondant remplit tous les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour attaque de panique au cours de la vie. Le répondant a déclaré (1) avoir vécu une période bien délimitée de crainte ou de malaise intense; (2) avoir éprouvé au moins quatre des symptômes associés à la panique et (3) que les symptômes sont survenus de façon subite et ont atteint leur niveau le plus fort dans les 10 premières minutes.
2	PADBDA = 2 ou PADBDB = 2 ou PADBDC = 2	Le répondant ne remplit pas tous les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI d'une attaque de panique au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré (1) avoir vécu une période bien délimitée de crainte ou de malaise intense; (2) avoir éprouvé au moins quatre des symptômes associés à la panique ni (3) que les symptômes sont survenus de façon subite et ont atteint leur niveau le plus fort dans les 10 premières minutes (ou le répondant ne sait pas si les symptômes sont survenus de façon subite et ont atteint leur niveau le plus fort dans les 10 premières minutes).

ND	PADBDA = ND ou PADBDB = ND ou PADBDC = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.
----	---	---

Trouble panique au cours de la vie

5) Trouble panique au cours de la vie - critère A, partie 1

Nom de la variable : PADBDAA1

Basée sur : PADBDATT, PADB_04, PADB_17A,

Description : Cette variable évalue le critère A, partie 1 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un trouble panique au cours de la vie. La variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir vécu au moins 4 attaques de panique récurrentes et inattendues.

Valeur de PADBDAA1	Condition(s)	Explication
1	PADBDATT = 1 et 3 < PADB_17A < SO	Le répondant remplit le critère A, partie 1 de trouble panique au cours de la vie. Le répondant a déclaré avoir vécu 4 attaques ou plus de panique récurrentes et inattendues.
2	PADBDATT = 2 ou (PADB_17A = 1, 2, 3, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère A, partie 1 de trouble panique au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré avoir vécu des attaques de panique récurrentes et inattendues
ND	PADBDATT = ND ou (PADB_17A = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

6) Trouble panique au cours de la vie - critère A, partie 2

Nom de la variable : PADBDAA2

Basée sur : PADBDAA, PADBDAB, PADBDAC

Description : Cette variable évalue le critère A, partie 2 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un trouble panique au cours de la vie. La variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir eu, à la suite d'au moins une attaque, pendant un mois ou plus, au moins un des symptômes suivants :

1. crainte persistante d'avoir d'autres attaques de panique;
2. crainte que quelque chose de terrible puisse lui arriver à cause des attaques comme un accident de voiture, une crise cardiaque ou la perte du contrôle de soi-même;
3. avoir changé ses activités quotidiennes à cause des attaques ou avoir évité certaines situations par peur d'avoir d'autres attaques.

On commence par créer une variable pour chaque symptôme, puis on les utilise pour calculer la valeur pour le critère A, partie 2.

6a) Symptôme 1 – crainte persistante d'avoir d'autres attaques de panique

Nom de la variable : PADBDAA

Basée sur : PADB_13A

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir eu un mois ou plus pendant lequel ils ont souvent craint d'avoir une autre attaque.

Valeur de PADBDDAA	Condition(s)	Explication
1	PADB_13A = 1	Le répondant a déclaré avoir eu un mois ou plus pendant lequel il a souvent craint d'avoir une autre attaque.
2	(PADB_13A = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré avoir eu un mois ou plus pendant lequel il a souvent craint d'avoir une autre attaque.
ND	(PADB_13A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

6b) Symptôme 2 – préoccupations à propos des implications possibles de l'attaque ou de ses conséquences

Nom de la variable : PADBDDAB

Basée sur : PADB_13B

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir eu un mois ou plus pendant lequel ils ont craint que quelque chose de terrible puisse leur arriver à cause de leurs attaques, comme un accident de voiture, une crise cardiaque ou la perte du contrôle de soi.

Valeur de PADBDDAB	Condition(s)	Explication
1	PADB_13B = 1	Le répondant a déclaré avoir eu un mois ou plus pendant lequel il a craint que quelque chose de terrible puisse lui arriver à cause de ses attaques.
2	(PADB_13B = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré avoir eu un mois ou plus pendant lequel il a craint que quelque chose de terrible puisse lui arriver à cause de ses attaques.
ND	(PADB_13B = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

6c) Symptôme 3 – changement de comportement important en relation aux attaques

Nom de la variable : PADBDDAC

Basée sur : PADB_13C, PADB_13D, PADB_42

Description : Cette variable indique si au moins l'une des attaques a été suivie par un mois ou plus de changement de comportement important en relation aux attaques. Ces répondants ont déclaré avoir changé leurs activités quotidiennes ou évité certaines situations par peur d'avoir une autre attaque.

Valeur de PADBDDAC	Condition(s)	Explication
1	PADB_13C = 1 ou PADB_13D = 1 ou (PADB_42 = 1, 2)	Le répondant a déclaré un mois ou plus de changement de comportement important en relation aux attaques.
2	(PADB_13C = 2, SO) et (PADB_13D = 2, SO) et (PADB_42 = 3, 4, 5, SO)	Le répondant n'a pas déclaré un mois ou plus de changement de comportement important en

		relation aux attaques.
ND	(PADB_13C = NSP, R, ND) ou (PADB_13D = NSP, R, ND) ou (PADB_42 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à une des questions nécessaire au calcul.

Évaluation du critère A, partie 2 de trouble panique

Valeur de PADBDDA2	Condition(s)	Explication
1	PADBDDAA = 1 ou PADBDDAB = 1 ou PADBDDAC = 1	Le répondant remplit le critère A, partie 2 de trouble panique au cours de la vie. Le répondant a déclaré avoir eu un mois ou plus de crainte d'avoir d'autres attaques ou de préoccupations à propos des implications des attaques ou de changement de comportement en relation aux attaques.
2	PADBDDAA = 2 et PADBDDAB = 2 et PADBDDAC = 2	Le répondant ne remplit pas le critère A, partie 2 de trouble panique au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré avoir eu un mois ou plus de crainte d'avoir d'autres attaques ni de préoccupations à propos des implications des attaques ni de changement de comportement en relation aux attaques.
ND	PADBDDAA = ND ou PADBDDAB = ND ou PADBDDAC = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

7) Trouble panique au cours de la vie - critère A (Parties 1 et 2 combinées)**Nom de la variable :** PADBDDA**Basée sur :** PADBDDA1, PADBDDA2**Description :** Cette variable indique si le répondant remplit le critère A de L'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un trouble panique au cours de la vie. Les répondants qui remplissent le critère ont déclaré :

1. avoir vécu 4 attaques de panique récurrentes et inattendues ou plus et
2. qu'au moins une des attaques était accompagnée pendant un mois ou plus de crainte d'avoir d'autres attaques ou de préoccupations à propos des implications de l'attaque ou de ses conséquences ou d'un changement de comportement important en relation aux attaques.

Valeur de PADBDDA	Condition(s)	Explication
1	PADBDDA1 = 1 et PADBDDA2 = 1	Le répondant remplit le critère A de trouble panique au cours de la vie. Le répondant a déclaré (1) avoir eu 4 attaques de panique récurrentes et inattendues ou plus et (2) qu'au moins une des attaques était accompagnée pendant un mois ou plus de crainte d'avoir d'autres attaques ou d'un changement de comportement en relation aux

		attaques.
2	PADBDDA1 = 2 ou PADBDDA2 = 2	Le répondant ne remplit pas le critère A de trouble panique au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré (1) avoir eu 4 attaques de panique récurrentes et inattendues ou plus ou (2) avoir eu un mois ou plus de crainte d'avoir d'autres attaques ou de changement de comportement en relation aux attaques.
ND	PADBDDA1 = ND ou PADBDDA2 = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

8) Algorithme pour le trouble panique au cours de la vie

Nom de la variable : PADBDPDS

Basée sur : PADBDDA

Description : Cette variable indique si le répondant remplit les critères de L'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un trouble panique au cours de la vie. Les répondants qui remplissent les critères déclarent :

1. avoir eu au moins 4 attaques récurrentes et inattendues de panique,
2. qu'au moins une des attaques s'est accompagnée pendant un mois ou plus de crainte d'avoir d'autres attaques, de préoccupations à cause des conséquences des attaques ou de changement de comportement en relation aux attaques.

Valeur de PADBDPDS	Condition(s)	Explication
1	PADBDDA = 1	Le répondant remplit tous les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un trouble panique au cours de la vie. Le répondant a déclaré (1) avoir eu au moins 4 attaques de panique récurrentes et inattendues; (2) qu'au moins une des attaques s'est accompagnée d'un mois ou plus de crainte d'avoir d'autres attaques ou d'un changement de comportement important en relation aux attaques.
2	PADBDDA = 2	Le répondant ne remplit pas tous les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un trouble panique au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré (1) avoir eu 4 attaques de panique récurrentes et inattendues ou plus,

		(2) au moins un mois ou plus de crainte d'avoir d'autres attaques ou de changement de comportement en relation aux attaques.
ND	PADBDDA = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

Reformatages Temporaires

Reformatage	Explication
Si (PADB_10D = NSP, R, ND) alors PADRQ10D = manquant Si (PADB_37A = NSP, R, ND) alors PADRQ37A = manquant	Recodé non-réponse à manquant.

9) Trouble panique – âge au moment de l'apparition - Variable groupée**Nom de la variable :** PADBGONA**Basée sur :** PADB_04, PADB_06, PADB_07, PADB_07A, PADB_07B, PADB_09A, PADB_09B, PADB_21, PADB_37A, DHHB_AGE**Description :** Cette variable indique l'âge qu'avait le répondant au moment de la première attaque de panique. Cette variable est calculée pour tous les répondants qui ont répondu aux questions requises pour le calcul, peu importe si les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un trouble de panique sont remplis.

Des enregistrements ont été regroupés par tranche d'âge afin d'assurer la confidentialité. Voir dictionnaire de données.

Valeur de PADBGONA	Condition(s)	Explication
SO	PADB_04 = SO	Les questions nécessaires à ce calcul n'ont pas été posées au répondant.
Valeur à DHHB_AGE	PADB_04 = 1 et (PADB_06 = 1, 2, 3)	L'âge au moment de l'apparition est l'âge courant. Le répondant a déclaré une seule attaque de panique au cours de la vie.
Valeur à PADB_07A	PADB_04 = 1 et (PADB_06 = 4, NSP, R) et PADB_07 = 1 et PADB_07A < SO	L'âge de l'apparition est l'âge qu'avait le répondant au moment de l'unique attaque de panique. Le répondant a déclaré une seule attaque de panique au cours de la vie.
Valeur à PADB_07B	PADB_04 = 1 et (PADB_06 = 4, NSP, R) et (PADB_07 = 2, NSP) et PADB_07B < SO	L'âge au moment de l'apparition est l'âge qu'avait le répondant au moment de l'unique attaque de panique. Le répondant a déclaré une attaque de panique au cours de la vie.
Valeur minimale à (PADB_09A, PADB_09B, PADB_21, PADB_37A)	2 <= PADB_04 < SO et (PADB_09A < SO ou PADB_09B < SO ou PADB_21 < SO ou PADB_37A < SO)	L'âge au moment de l'apparition est l'âge qu'avait le répondant au moment de la première attaque de panique. Le répondant a rapporté au moins deux attaques de panique au cours de sa vie.
ND	(PADB_04 = NSP, R, ND) ou PADB_06 = ND ou (PADB_07 = R, ND) ou (PADB_07A = NSP, R, ND) ou	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

	(PADB_07B = NSP, R, ND) ou (PADB_09B = NSP, R, ND) ou (PADB_21 = NSP, R, ND) ou (PADB_37A = NSP, R, ND)	
--	--	--

10) Trouble panique – âge au moment de l'apparition - Variable groupée

Nom de la variable : PADBGON

Basée sur : PADBDONA, PADBDPDS

Description : Cette variable indique l'âge qu'avait le répondant au début du premier épisode de trouble panique. Cette variable est calculée uniquement pour les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un trouble de panique au cours de la vie.

Des enregistrements ont été regroupés par tranche d'âge afin d'assurer la confidentialité. Voir dictionnaire de données.

Valeur de PADBGON	Condition(s)	Explication
Valeur à PADBDONA	PADBDPDS = 1 et PADBDONA < ND	L'âge au moment de l'apparition est l'âge du répondant au moment de sa première attaque de panique rapportée.
SO	(PADBDPDS = 2, SO)	Le répondant ne remplit les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un trouble de panique au cours de la vie.
ND	PADBDPDS = ND ou PADBDONA = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

Reformatages Temporaires

Reformatage	Explication
Si (PADB_10D = NSP, R, ND) alors PADRQ10D = manquant Si (PADB_37A = NSP, R, ND) alors PADRQ37A = manquant	Recodé non-réponse à manquant.

11) Trouble panique – âge lors de la plus récente attaque - Variable groupée

Nom de la variable : PADBGREC

Basée sur : PADBDPDS, PADB_10, PADB_10D, PADB_37A, DHHB_AGE

Description : Cette variable indique l'âge du répondant lors de la dernière attaque de panique. La valeur de cette variable n'est calculée que pour les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un trouble panique au cours de la vie.

Des enregistrements ont été regroupés par tranche d'âge afin d'assurer la confidentialité. Voir dictionnaire de données.

Valeur de PADBGREC	Condition(s)	Explication
SO	PADBDPDS = 2	Le répondant ne remplit pas les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un trouble panique au cours de la vie.
DHHB_AGE	PADBDPDS = 1 et PADB_10 = 1	L'âge au moment de la plus récente attaque est l'âge courant si le

		répondant a déclaré une attaque au cours des 12 derniers mois.
Valeur maximale de (PADRQ10D, PADRQ37A)	PADBDPDS = 1 et (PADB_10D < SO ou PADB_37A < SO)	L'âge au moment de la plus récente attaque est l'âge le plus avancé pour l'ensemble des attaques de panique déclarées.
ND	PADBDPDS = ND ou PADB_10D = NSP, R, ND ou PADB_37A = NSP, R, ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

12) Trouble panique – persistance du trouble panique - Variable groupée

Nom de la variable : PADBGPER

Basée sur : PADBDPDS, PADBGON, PADBGREC

Description : Cette variable indique la plus longue période pendant laquelle le répondant a éprouvé des symptômes accompagnant une attaque de panique. La valeur de cette variable est calculée uniquement pour les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un trouble de panique. Elle correspond à la différence, en années, entre l'âge au moment de la première attaque de panique et celui au moment de la plus récente attaque de panique.

Des enregistrements ont été regroupés par tranche de durées afin d'assurer la confidentialité. Voir dictionnaire de données.

Valeur de PADBGPER	Condition(s)	Explication
SO	PADBDPDS = 2	Le répondant ne remplit pas les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un trouble panique.
PADBGREC - PADBGON	PADBDPDS = 1 et PADBGREC < SO et PADBGON < SO	La persistance est le nombre d'années écoulées entre la première attaque de panique et la plus récente attaque de panique.
ND	PADBDPDS = ND ou PADBGREC = ND ou PADBGON = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

Attaque de panique – Au cours des 12 derniers mois

13) Attaque de panique au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : PADBDATY

Basée sur : PADB_06, PADB_07A, PADB_07B, PADB_09A, PADB_09B, PADB_10, PADB_10D, PADB_21, DHHB_AGE

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir eu une attaque de panique au cours des 12 mois précédant l'interview.

Valeur de PADBDATY	Condition(s)	Explication
1	PADBDATT = 1 et [(PADB_06 = 1, 2, 3) ou PADB_10 = 1 ou PADB_07A = DHHB_AGE ou PADB_07B = DHHB_AGE ou PADB_09A = DHHB_AGE ou PADB_09B = DHHB_AGE ou	Tous les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour attaque de panique au cours des 12 derniers mois sont remplis. Le répondant a déclaré avoir eu une attaque de panique au cours des 12 mois qui ont précédé

	PADB_10D = DHHB_AGE ou PADB_21 = DHHB_AGE]	l'interview.
2	PADBDATT = 2 ou [PADB_06 = 4 et (PADB_07A < DHHB_AGE ou PADB_07B < DHHB_AGE)] ou [PADB_10 = 2 et (PADB_09A < DHHB_AGE ou PADB_09B < DHHB_AGE)] ou (PADB_10D < DHHB_AGE et PADB_21 < DHHB_AGE) ou (PADB_06 = SO et PADB_10 = SO) et (PADB_10D = SO et PADB_21 = SO)	Tous les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour une attaque de panique au cours des 12 derniers mois ne sont pas remplis. Le répondant n'a pas déclaré avoir eu une attaque de panique au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview. Nota : PADB_06, PADB_07A, PADB_07B ont été posées uniquement si une seule attaque a été déclarée et les autres questions ont été posées uniquement si plus d'une attaque a été déclarée.
ND	PADBDATT = ND ou (PADB_06 = NSP, R, ND) ou (PADB_07A = NSP, R, ND) ou (PADB_07B = NSP, R, ND) ou (PADB_10 = NSP, R, ND) ou (PADB_09A = NSP, R, ND) ou (PADB_09B = NSP, R, ND) ou (PADB_10D = NSP, R, ND) ou (PADB_21 = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non- réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

14) Trouble panique au cours des 12 derniers mois - critère A

Nom de la variable : PADBDYA

Basée sur : PADBDPDS

Description : Cette variable identifie les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un trouble panique au cours de la vie.

Valeur de PADBDYA	Condition(s)	Explication
1	PADBDPDS = 1	Le répondant remplit le critère A de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours des 12 derniers mois. Le répondant remplit les critères de diagnostic de trouble panique au cours de la vie.
2	PADBDPDS = 2	Le répondant ne remplit pas le critère A de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours des 12 derniers mois. Le répondant ne remplit pas les critères de diagnostic de trouble panique au cours de la vie.
ND	(PADBDPDS = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non- réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul.

15) Trouble panique au cours des 12 derniers mois - critère B**Nom de la variable :** PADBDYB**Basée sur :** PADB_09A, PADB_09B, PADB_10, PADB_10D, PADB_21, DHHB_AGE**Description :** Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir eu une attaque de panique au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.

Valeur de PADBDYB	Condition(s)	Explication
1	PADB_10 = 1 ou PADB_09A = DHHB_AGE ou PADB_09B = DHHB_AGE ou PADB_10D = DHHB_AGE ou PADB_21 = DHHB_AGE	Le répondant remplit le critère B de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours des 12 derniers mois. Le répondant a déclaré avoir eu une attaque de panique au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.
2	PADB_10 = 2 et (PADB_09A < DHHB_AGE ou PADB_09B < DHHB_AGE) et PADB_10D < DHHB_AGE et (PADB_21 < DHHB_AGE ou PADB_21 = SO) ou PADB_10 = SO et PADB_09A = SO et PADB_09B = SO et PADB_10D = SO et PADB_21 = SO	Le répondant ne remplit pas le critère B de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours des 12 derniers mois. Le répondant n'a pas déclaré avoir eu une attaque de panique au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.
ND	(PADB_10 = NSP, R, ND) ou (PADB_09A = NSP, R, ND) ou (PADB_09B = NSP, R, ND) ou (PADB_10D = NSP, R, ND) ou (PADB_21 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à une des questions nécessaire au calcul.

16) Trouble panique au cours des 12 derniers mois - critère C**Nom de la variable :** PADBDYC**Basée sur :** PADB_40**Description :** Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir éprouvé une détresse émotionnelle importante durant une attaque de panique au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.

Valeur de PADBDYC	Condition(s)	Explication
1	(PADB_40 = 3, 4, 5)	Le répondant remplit le critère C de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours des 12 derniers mois. Le répondant a déclaré avoir éprouvé une détresse émotionnelle significative lors d'une attaque de panique au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.
2	(PADB_40 = 1, 2, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère C de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI au cours des 12 derniers mois. Le répondant n'a pas déclaré avoir éprouvé une détresse émotionnelle significative lors d'une attaque de

		panique au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.
ND	(PADB_40 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

17) Algorithme pour un trouble panique au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : PADBDDY

Basée sur : PADBDYA, PADBDYB, PADBDYC

Description : Cette variable indique si le répondant remplit ou non les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un trouble panique au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview. Les répondants qui remplissent les critères ont déclaré :

1. remplir les critères de trouble panique au cours de la vie,
2. avoir eu une attaque de panique au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview, et
3. avoir éprouvé une détresse émotionnelle importante durant une attaque de panique survenue au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.

Valeur de PADBDDY	Condition(s)	Explication
1	PADBDYA = 1 et PADBDYB = 1 et PADBDYC = 1	Tous les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI sont remplis pour un trouble panique au cours des 12 derniers mois. Le répondant a déclaré (1) remplir les critères de trouble panique au cours de la vie, (2) avoir eu une attaque de panique au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview, et (3) avoir éprouvé une détresse émotionnelle importante durant une attaque de panique au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.
2	PADBDYA = 2 ou PADBDYB = 2 ou PADBDYC = 2	Tous les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI ne sont pas remplis pour un trouble panique au cours des 12 derniers mois. Le répondant n'a pas déclaré (1) remplir les critères de trouble panique au cours de la vie, (2) avoir eu une attaque de panique au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview ou (3) avoir éprouvé une détresse émotionnelle importante durant une attaque de panique au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.
ND	PADBDYA = ND ou PADBDYB = ND ou PADBDYC = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

18) Trouble attribuable au trouble panique – moyenne**Nom de la variable :** PADBDINT**Basée sur :** PADB_44A, PADB_441, PADB_442, PADB_44C, PADB_44D, PADBDY

Description : Cette variable décrit la perturbation que le trouble panique a entraîné sur les activités et les responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s'agit d'une moyenne des cinq items. Cette variable n'est calculée que pour les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un trouble panique au cours des 12 derniers mois.

Valeur de PADBDINT	Condition(s)	Explication
SO	PADBDY = 2	Le répondant ne remplissait pas les critères pour un trouble panique au cours des 12 derniers mois.
ND	PADBDY = ND ou (PADB_44A = NSP, R, ou ND) ou (PADB_441 = NSP, R, ou ND) ou (PADB_442 = NSP, R, ou ND) ou (PADB_44C = NSP, R, ou ND) ou (PADB_44D = NSP, R, ou ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
$(\text{PADB_44A} + \text{PADB_441} + \text{PADB_442} + \text{PADB_44C} + \text{PADB_44D}) / 5$ (min : 0.0; max : 10.0) (arrondir à .1)	PADBDY = 1 et $0 \leq \text{PADB_441} \leq 10$ et $0 \leq \text{PADB_442} \leq 10$ et $0 \leq \text{PADB_44A} \leq 10$ et $0 \leq \text{PADB_44C} \leq 10$ et $0 \leq \text{PADB_44D} \leq 10$	Trouble = moyenne des cinq items. Le répondant a répondu aux cinq questions.
$(\text{PADB_44A} + \text{PADB_442} + \text{PADB_44C} + \text{PADB_44D}) / 4$ (min : 0.0; max : 10.0) (arrondir à .1)	PADBDY = 1 et PADB_441 = 11 et $0 \leq \text{PADB_442} \leq 10$ et $0 \leq \text{PADB_44A} \leq 10$ et $0 \leq \text{PADB_44C} \leq 10$ et $0 \leq \text{PADB_44D} \leq 10$	Trouble = moyenne de quatre items qui s'appliquaient au répondant. PADB_441 ne s'appliquait pas (c.-à-d. que le répondant n'a pas fréquenté l'école au cours des 12 derniers mois).
$(\text{PADB_44A} + \text{PADB_441} + \text{PADB_44C} + \text{PADB_44D}) / 4$ (min : 0.0; max : 10.0) (arrondir à .1)	PADBDY = 1 et $0 \leq \text{PADB_441} \leq 10$ et PADB_442 = 11 et $0 \leq \text{PADB_44A} \leq 10$ et $0 \leq \text{PADB_44C} \leq 10$ et $0 \leq \text{PADB_44D} \leq 10$	Trouble = moyenne de quatre items qui s'appliquaient au répondant. PADB_442 ne s'appliquait pas (c.-à-d. que le répondant n'a pas travaillé au cours des 12 derniers mois).
$(\text{PADB_44A} + \text{PADB_44C} + \text{PADB_44D}) / 3$ (min : 0.0; max : 10.0) (arrondir à .1)	PADBDY = 1 et PADB_441 = 11 et PADB_442 = 11 et $0 \leq \text{PADB_44A} \leq 10$ et $0 \leq \text{PADB_44C} \leq 10$ et $0 \leq \text{PADB_44D} \leq 10$	Trouble = moyenne de trois items qui s'appliquaient au répondant. PADB_441 et PADB_442 ne s'appliquaient pas (c.-à-d. que le répondant n'a pas fréquenté l'école et n'a pas travaillé au cours des 12 derniers mois).

19) Indicateur du trouble attribuable au trouble panique

Nom de la variable : PADBFINT

Basée sur : PADB_44A, PADB_441, PADB_442, PADB_44C, PADB_44D, PADBDDY

Description : Cette variable décrit la perturbation que le trouble panique a entraîné sur les activités et les responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s'agit d'une classification indiquant si le trouble panique trouble de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires) ou les activités sociales ou les relations personnelles. Cette variable n'est calculée que pour les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour un trouble panique au cours des 12 derniers mois.

Valeur de PADBFINT	Condition(s)	Explication
SO	PADBDDY = 2	Le répondant ne remplissait pas les critères pour un trouble panique au cours des 12 derniers mois.
1	PADBDDY = 1 et (4 ≤ PADB_44A ≤ 10 ou 4 ≤ PADB_441 ≤ 10 ou 4 ≤ PADB_442 ≤ 10 ou 4 ≤ PADB_44C ≤ 10 ou 4 ≤ PADB_44D ≤ 10)	Le trouble panique a troublé de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires) ou les activités sociales ou les relations personnelles au cours des 12 derniers mois.
2	PADBDDY = 1 et [0 ≤ PADB_44A ≤ 3 et (0 ≤ PADB_441 ≤ 3 ou PADB_441 = 11) et (0 ≤ PADB_442 ≤ 3 ou PADB_442 = 11) et 0 ≤ PADB_44C ≤ 3 et 0 ≤ PADB_44D ≤ 3]	Le trouble panique n'a pas perturbé de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires) ou les activités sociales ou les relations avec autrui de la personne au cours des 12 derniers mois.
ND	PADBDDY = ND ou (PADB_44A = NSP, R, ou ND) ou (PADB_441 = NSP, R, ou ND) ou (PADB_442 = NSP, R, ou ND) ou (PADB_44C = NSP, R, ou ND) ou (PADB_44D = NSP, R, ou ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

Phobie sociale (21 VD)

Pour les besoins de l'ESCC 1.2, la phobie sociale est caractérisée par une peur persistante, irrationnelle, de situations durant lesquelles la personne pourrait être observée attentivement et jugée par autrui, comme prendre la parole en public, manger ou utiliser des installations publiques. Les symptômes incluent l'évitement ou l'anticipation anxieuse des situations redoutées et des symptômes physiques tels que l'augmentation du rythme cardiaque, des nausées, la bouche sèche, des sueurs, des douleurs à la poitrine, des vertiges, des étourdissements et des attaques de panique.

Les questions sur la phobie sociale sont fondées sur une version reconnue du World Mental Health du Composite International Diagnostic Interview (WMH-CIDI) et modifiée pour les besoins du cycle 1.2 de l'ESCC. L'instrument WMH-CIDI, qui fait partie du projet «World Mental Health 2000» (WMH2000), est une initiative de l'Organisation mondiale de la santé destinée à évaluer la prévalence de divers troubles mentaux dans plusieurs pays à travers le monde.

Le WMH-CIDI est un questionnaire normalisé pour l'évaluation des troubles mentaux conformément à l'opérationnalisation des définitions et critères du DSM-IV et de la CIM-10. L'abréviation DSM désigne le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié par l'American Psychiatric Association. Il s'agit d'une classification des troubles mentaux reconnue à l'échelle internationale dont il existe plusieurs versions. Les troubles ou problèmes mentaux étudiés dans le cadre de l'ESCC 1.2 sont codés de façon partielle selon le DSM-IV ou le DSM-III-R. L'ESCC 1.2 n'offre aucun soutien vis-à-vis les algorithmes de la CIM-10.

Le projet WMH2000 a été adapté à plusieurs versions IPAO (interview sur place assistée par ordinateur) et IPC (interview papier et crayon) du questionnaire WMH-CIDI. Les responsables du projet ont déjà créé un groupe de travail qui examinera les différences méthodologiques pour s'assurer que les comparaisons entre pays soient faites de façon appropriée.

La phobie sociale est l'un des cinq états de santé mentale du projet WMH2000 visés par cette enquête. Celle-ci est conçue pour évaluer le diagnostic de la phobie sociale au cours de la vie et au cours des 12 derniers mois. Un épisode au cours des 12 derniers mois s'entend des 12 mois qui ont précédé l'interview.

La documentation qui accompagne les données de l'ESCC 1.2 fournit des renseignements sur toutes les variables dérivées temporaires utilisées pour calculer les variables dérivées finales de troubles dont le profil est établi au cours de la vie et au cours des 12 derniers mois. Pour la plupart des utilisateurs des données, les variables dérivées finales et les variables dérivées ayant trait à la récence, à la durée, à l'âge au moment de l'apparition et à la perturbation associée au trouble suffiront pour réaliser les analyses.

En ce qui concerne la phobie sociale, les variables d'intérêt sont :

Variable	Concept	Numéro d la variable
SOPBDSP	Algorithme – vie	13
SOPBDPY	Algorithme - 12 mois	19
SOPBGON	Apparition	14
SOPBGREC	Récence	15
SOPBDINT	Perturbation / Trouble – 12 mois	20

Les critères utilisés pour produire les variables dérivées finales associées à une phobie sociale, ainsi que leurs variables temporaires respectives sont opérationnalisés de façon à satisfaire partiellement aux définitions/classification du DSM-IV. Bien que le questionnaire et les algorithmes soient fondés sur des approches et une classification reconnues mondialement, cette méthode ne peut être utilisée pour poser le diagnostic du trouble chez les personnes présentant ce profil. Seuls des professionnels ayant la formation médicale requise peuvent le faire.

L'instrument de l'ESCC 1.2 permet de recueillir une foule d'informations sur le nombre de symptômes, la gravité, la durée et l'intensité globale du trouble. Toutefois, l'approche structurée utilisée pour l'instrument informatisé n'est pas conçue pour recueillir certains renseignements complexes utilisés par ceux ayant reçu une formation professionnelle pour poser le diagnostic final conformément à la classification du DSM-IV. Ainsi, il n'existe aucun algorithme pour appuyer la création de variables dérivées en rapport avec les spécificateurs/sous-types du trouble. En outre, bien que l'instrument soit conçu pour recueillir certains renseignements utilisés pour l'opérationnalisation des exclusions physiques/organiques et des règles hiérarchiques, Statistique Canada recommande que cette information soit utilisée par des spécialistes du DSM étant donné sa nature complexe.

En plus de l'information sur les états de santé mentale, le questionnaire WMH-CIDI permet de recueillir des renseignements sur un grand nombre de corrélats importants de la santé mentale, comme l'utilisation des services de santé et le soutien. Toutefois, les données de l'ESCC 1.2 recueillies sur les corrélats de la santé mentale ne sont pas fondées sur le questionnaire WMH-CIDI. Bien que les comparaisons internationales de ce genre de données soient importantes, après avoir consulté les divers intervenants, Statistique Canada a décidé que les données de l'ESCC 1.2 devraient appuyer et compléter l'information canadienne déjà recueillie dans le cadre de l'ESCC 1.1 et des cycles de l'ENSP réalisés antérieurement.

Pour simplifier la comparaison au DSM, les critères sont présentés plus ou moins selon le modèle du DSM-IV. Cette correspondance vise uniquement à faciliter l'interprétation des résultats en permettant un langage commun. Toutefois, il serait inapproprié de conclure à l'existence d'une correspondance directe entre nos critères et ceux du DSM-IV en raison de la nature complexe du sujet et des limites opérationnelles associées au questionnaire et aux algorithmes.

Pour les besoins de cette enquête, les répondants qui remplissent les critères ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie sont ceux qui déclarent :

1. qu'ils éprouvent une peur persistante et intense d'une ou plusieurs situations sociales ou de performance durant lesquelles ils sont en contact avec des gens non familiers ou bien peuvent être exposés à l'éventuelle observation attentive d'autrui, et craignent d'agir (ou de montrer des symptômes anxieux) de façon embarrassante ou humiliante,
2. que l'exposition à la situation sociale redoutée provoque de façon quasi-systématique une anxiété qui peut prendre la forme d'une attaque de panique,
3. qu'ils reconnaissent le caractère excessif ou irraisonné de la peur,
4. qu'ils évitent les situations sociales ou de performance redoutées ou les vivent avec une anxiété et une détresse intenses,
5. que l'évitement, l'anticipation anxieuse ou la détresse dans la ou les situations sociales ou de performance redoutées perturbe, de façon importante, leurs habitudes, leurs activités professionnelles (scolaires) ou leurs activités sociales ou leurs relations avec autrui et
6. chez les individus de moins de 18 ans, que la durée est d'au moins six mois.

Pour les besoins de cette enquête, les répondants qui remplissent les critères ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours des 12 derniers mois :

1. remplissent les critères de diagnostic de la phobie sociale au cours de la vie,
2. déclarent avoir vécu un épisode au cours des 12 derniers mois et
3. déclarent une altération marquée de leur fonctionnement professionnel ou social.

Phobie sociale au cours de la vie

1) Phobie sociale au cours de la vie - critère A, partie 1

Nom de la variable : SOPBDA1

Basée sur : SOPB_01A, SOPB_01B, SOPB_01C, SOPB_01D, SOPB_01E, SOPB_01F, SOPB_01G, SOPB_01H, SOPB_01I, SOPB_01J, SOPB_01K, SOPB_01L, SOPB_01M, SOPB_01N

Description : Cette variable identifie les répondants qui déclarent une peur intense et persistante d'une ou plusieurs situations sociales ou de performance durant lesquelles ils sont en contact avec des gens non familiers ou bien peuvent être exposés à l'éventuelle observation attentive d'autrui.

Valeur de SOPBDA1	Condition(s)	Explication
1	SOPB_01A = 1 ou SOPB_01B = 1 ou SOPB_01C = 1 ou SOPB_01D = 1 ou SOPB_01E = 1 ou SOPB_01F = 1 ou SOPB_01G = 1 ou SOPB_01H = 1 ou SOPB_01I = 1 ou SOPB_01J = 1 ou SOPB_01K = 1 ou SOPB_01L = 1 ou SOPB_01M = 1 ou SOPB_01N = 1	Le répondant remplit le critère A, partie 1 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant a déclaré une peur persistante et intense d'une ou plusieurs situations sociales ou de performance durant lesquelles il est en contact avec des gens non familiers ou bien peut être exposé à l'éventuelle observation attentive d'autrui.
2	(SOPB_01A = 2, 3, SO) et (SOPB_01B = 2, 3, SO) et (SOPB_01C = 2, 3, SO) et (SOPB_01D = 2, 3, SO) et (SOPB_01E = 2, 3, SO) et (SOPB_01F = 2, 3, SO) et (SOPB_01G = 2, 3, SO) et (SOPB_01H = 2, 3, SO) et (SOPB_01I = 2, 3, SO) et (SOPB_01J = 2, 3, SO) et (SOPB_01K = 2, 3, SO) et (SOPB_01L = 2, 3, SO) et (SOPB_01M = 2, 3, SO) et (SOPB_01N = 2, 3, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère A, partie 1 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré éprouver une peur persistante et intense d'une ou plusieurs situations sociales ou de performance durant lesquelles il est en contact avec des gens non familiers ou peut être exposé à l'éventuelle observation attentive d'autrui.
ND	(SOPB_01A = NSP, R, ND) ou (SOPB_01B = NSP, R, ND) ou (SOPB_01C = NSP, R, ND) ou (SOPB_01D = NSP, R, ND) ou (SOPB_01E = NSP, R, ND) ou (SOPB_01F = NSP, R, ND) ou (SOPB_01G = NSP, R, ND) ou (SOPB_01H = NSP, R, ND) ou (SOPB_01I = NSP, R, ND) ou (SOPB_01J = NSP, R, ND) ou (SOPB_01K = NSP, R, ND) ou (SOPB_01L = NSP, R, ND) ou (SOPB_01M = NSP, R, ND) ou (SOPB_01N = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

2) Phobie sociale au cours de la vie - critère A, partie 2

Nom de la variable : SOPBDA2

Basée sur : SOPB_12, SOPB_12A, SOPB_13, SOPB_14

Description : La variable identifie les répondants qui déclarent craindre d'agir (ou de montrer des symptômes anxieux) de façon embarrassante ou humiliante.

Valeur de SOPBDA2	Condition(s)	Explication
1	SOPB_12 = 1 ou SOPB_12A = 1 ou SOPB_13 = 1 ou SOPB_14 = 1	Le répondant remplit le critère A, partie 2 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant a déclaré craindre d'agir de façon embarrassante ou humiliante.
2	(SOPB_12 = 2, SO) et (SOPB_12A = 2, SO) et (SOPB_13 = 2, SO) et (SOPB_14 = 2, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère A, partie 2 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré craindre d'agir de façon embarrassante ou humiliante.
ND	(SOPB_12 = NSP, R, ND) ou (SOPB_12A = NSP, R, ND) ou (SOPB_13 = NSP, R, ND) ou (SOPB_14 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

3) Phobie sociale au cours de la vie - critère A (parties 1 et 2 combinées)

Nom de la variable : SOPBDA

Basée sur : SOPBDA1, SOPBDA2

Description : Cette variable indique si le répondant remplit le critère A de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Les répondants qui remplissent le critère déclarent :

1. éprouver une peur persistante et intense d'une ou plusieurs situations sociales ou de performance durant lesquelles ils sont en contact avec des gens non familiers ou bien peuvent être exposés à l'éventuelle observation attentive d'autrui, et
2. craindre d'agir (ou de montrer des symptômes anxieux) de façon embarrassante ou humiliante.

Valeur de SOPBDA	Condition(s)	Explication
1	SOPBDA1 = 1 et SOPBDA2 = 1	Le répondant remplit le critère A de phobie sociale au cours de la vie. Le répondant a déclaré (1) éprouver une peur persistante et intense d'une ou plusieurs situations sociales ou de performance durant lesquelles il est en contact avec des gens non familiers ou bien peut être exposé à l'éventuelle observation attentive d'autrui, et (2) craindre d'agir (ou de montrer des symptômes anxieux) de façon embarrassante ou humiliante.

2	SOPBDA1 = 2 ou SOPBDA2 = 2	Le répondant ne remplit pas le critère A de phobie sociale au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré (1) éprouver une peur persistante et intense d'une ou plusieurs situations sociales ou de performance durant lesquelles il est en contact avec des gens non familiers ou bien peut être exposé à l'éventuelle observation attentive d'autrui, ou (2) craindre d'agir (ou de montrer des symptômes anxieux) de façon embarrassante ou humiliante.
ND	(SOPBDA1 = ND) ou (SOPBDA2 = ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

4) Phobie sociale au cours de la vie - critère B

Nom de la variable : SOPBDB

Basée sur : SCRB_291

Description : Cette variable indique si le répondant remplit le critère B de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Les répondants qui remplissent le critère déclarent que l'exposition à la ou aux situations sociales redoutées provoque de façon quasi-systématique une anxiété qui peut prendre la forme d'une attaque de panique liée à la situation ou bien facilitée par la situation.

Valeur de SOPBDB	Condition(s)	Explication
1	SCRB_291 = 1	Le répondant remplit le critère B de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant a déclaré que l'exposition à la ou aux situations sociales redoutées provoque de façon quasi-systématique une anxiété.
2	(SCRB_291 = 2, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère B de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré que l'exposition à la ou aux situations sociales redoutées provoque de façon quasi-systématique une anxiété.
ND	(SCRB_291 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

5) Phobie sociale au cours de la vie - critère C

Nom de la variable : SOPBDC

Basée sur : SCRB_293

Description : Cette variable indique si le répondant remplit le critère C de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Les répondants qui remplissent le critère reconnaissent que leur peur est excessive ou irraisonnée.

Valeur de SOPBDC	Condition(s)	Explication
1	SCRB_293 = 1	Le répondant remplit le critère C de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant reconnaît que sa peur est excessive ou irraisonnée.
2	(SCRB_293 = 2, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère C de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant ne reconnaît pas que sa peur est excessive ou irraisonnée.
ND	(SCRB_293 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

6) Phobie sociale au cours de la vie - critère D, partie 1

Nom de la variable : SOPBDD1

Basée sur : SCRB_292, SOPB_20

Description : Cette variable identifie les répondants qui déclarent éviter la ou les situations sociales ou de performance redoutées.

Valeur de SOPBDD1	Condition(s)	Explication
1	SCRB_292 = 1 ou (SOPB_20 = 1, 2, 3)	Le répondant remplit le critère D, partie 1 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant a déclaré éviter la ou les situations sociales ou de performance redoutées.
2	(SCRB_292 = 2, SO) et (SOPB_20 = 4, 5, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère D, partie 1 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré éviter la ou les situations sociales ou de performance redoutées.
ND	(SCRB_292 = NSP, R, ND) ou (SOPB_20 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

7) Phobie sociale au cours de la vie - critère D, partie 2

Nom de la variable : SOPBDD2

Basée sur : SCRB_291, SOPBD09, SOPB_10, SOPB_19

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré vivre la ou les situations sociales ou de performance redoutées avec une anxiété et une détresse intenses. On crée d'abord les deux variables, puis on les utilise pour évaluer le critère D, partie 2 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI.

7a) Variable temporaire

Nom de la variable : SOPBT9NO

Basée sur : SOPB_09N, SOPB_09O

Description : Cette variable est utilisée pour le calcul de SOPBD09 et créée ici parce que la question SOPB_09O n'est pas posée si la réponse à SOPB_09N est « oui ». Elle identifie les répondants qui déclarent avoir eu, lorsqu'ils se trouvaient dans une situation sociale ou de performance redoutée :

1. l'impression ne pas « vraiment être là », comme s'ils étaient en train de se regarder dans un film (dépersonnalisation) ou
2. l'impression que les choses autour d'eux n'étaient pas réelles ou qu'ils étaient comme dans un rêve (déréalisation).

Valeur de SOPBT9NO	Condition(s)	Explication
1	SOPB_09N = 1 ou SOPB_09O = 1	Le répondant a déclaré des sentiments de dépersonnalisation ou de déréalisation lorsqu'il était dans une situation redoutée.
2	(SOPB_09N = 2, SO) et (SOPB_09O = 2, SO)	Le répondant n'a pas déclaré de sentiments de dépersonnalisation ni de déréalisation lorsqu'il était dans une situation redoutée.
ND	(SOPB_09N = NSP, R, ND) ou (SOPB_09O = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

7b) Symptômes d'anxiété ou de panique

Nom de la variable : SOPBD09

Basée sur : SOPB_09A, SOPB_09B, SOPB_09C, SOPB_09D, SOPB_09E, SOPB_09F, SOPB_09G, SOPB_09H, SOPB_09I, SOPB_09J, SOPB_09K, SOPB_09L, SOPB_09M, SOPBT9NO

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir éprouvé au moins deux réactions physiologiques ou de type panique lors de l'exposition à une situation sociale ou de performance redoutée.

Valeur de SOPBD09	Condition(s)	Explication
1	Au moins 2 de (SOPB_09A, SOPB_09B, SOPB_09C, SOPB_09D, SOPB_09E, SOPB_09F, SOPB_09G, SOPB_09H, SOPB_09I, SOPB_09J, SOPB_09K, SOPB_09L, SOPB_09M, SOPBT9NO) = 1	Le répondant a déclaré au moins deux réactions de type panique lors de l'exposition à une situation sociale ou de performance redoutée.
2	Au moins 13 de (SOPB_09A, SOPB_09B, SOPB_09C, SOPB_09D, SOPB_09E, SOPB_09F, SOPB_09G, SOPB_09H, SOPB_09I, SOPB_09J, SOPB_09K, SOPB_09L, SOPB_09M, SOPBT9NO) = 2, SO	Le répondant n'a pas déclaré deux réactions de type panique lors de l'exposition à une situation sociale ou de performance redoutée.

ND	(SOPB_09A = NSP, R, ND) ou (SOPB_09B = NSP, R, ND) ou (SOPB_09C = NSP, R, ND) ou (SOPB_09D = NSP, R, ND) ou (SOPB_09E = NSP, R, ND) ou (SOPB_09F = NSP, R, ND) ou (SOPB_09G = NSP, R, ND) ou (SOPB_09H = NSP, R, ND) ou (SOPB_09I = NSP, R, ND) ou (SOPB_09J = NSP, R, ND) ou (SOPB_09K = NSP, R, ND) ou (SOPB_09L = NSP, R, ND) ou (SOPB_09M = NSP, R, ND) ou (SOPBT9NO = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul ou le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul.
----	---	---

Évaluation du critère D, partie 2 de la phobie sociale au cours de la vie

Valeur de SOPBDD2	Condition(s)	Explication
1	SCRB_291 = 1 et [SOPBD09 = 1 ou (SOPB_19 = 4, 5) ou SOPB_10 = 1]	Le répondant remplit le critère D, partie 2 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant a déclaré que les situations sociales ou de performances redoutées sont vécues avec une anxiété ou une détresse intense.
2	[(SCRB_291 = 2, SO) ou SOPBD09 = 2] et (SOPB_19 = 1, 2, 3, SO) et (SOPB_10 = 2, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère D, partie 2 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré que les situations sociales ou de performance redoutée sont vécues avec une anxiété ou une détresse intense.
ND	(SCRB_291 = NSP, R, ND) ou SOPBD09 = ND ou (SOPB_19 = NSP, R, ND) ou (SOPB_10 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul ou le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul.

8) Phobie sociale au cours de la vie - critère D (parties 1 et 2 combinées)

Nom de la variable : SOPBDD

Basée sur : SOPBDD1, SOPBDD2

Description : Cette variable indique si le répondant remplit le critère D de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Les répondants qui remplissent le critère déclarent :

1. que les situations sociales ou de performance redoutées sont évitées ou
2. que les situations sociales ou de performance redoutées sont vécues avec une anxiété ou une détresse intense.

Valeur de SOPBDD	Condition(s)	Explication
1	SOPBDD1 = 1 ou SOPBDD2 = 1	Le répondant remplit le critère D de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant a déclaré (1) éviter les situations redoutées ou (2) éprouver une anxiété ou une détresse intense dans les situations redoutées.
2	SOPBDD1 = 2 et SOPBDD2 = 2	Le répondant ne remplit pas le critère D de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré éviter les situations redoutées ni éprouver une anxiété intense quand il se trouve dans les situations redoutées.
ND	SOPBDD1 = ND ou SOPBDD2 = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

9) Phobie sociale au cours de la vie - critère E

Nom de la variable : SOPBDE

Basée sur : SOPB_16, SOPBD215, SOPB_23, SOPB_25

Description : Cette variable identifie les répondants qui déclarent que l'évitement, l'anticipation anxieuse ou la détresse dans la ou les situations sociales ou de performances redoutées perturbe de façon importante leurs activités routinières, leur fonctionnement professionnel ou scolaire, ou bien leurs activités sociales ou leurs relations avec autrui. On calcule d'abord une variable pour la perturbation du fonctionnement social ou professionnel au cours des 12 derniers mois, puis on l'utilise pour calculer la valeur pour le critère E.

9a) Perturbation sociale et professionnelle

Nom de la variable : SOPBD215

Basée sur : SOPB_21A, SOPB_211, SOPB_212, SOPB_21C, SOPB_21D

Description : Cette variable indique si, durant la période d'un mois ou plus au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview durant laquelle les symptômes étaient les plus sévères, les sentiments de peur du répondant concernant les situations sociales ou de performance ont perturbé significativement ses activités à la maison, à l'école ou au travail ou au niveau de sa capacité à établir et maintenir des relations proches avec les autres ou au niveau de sa vie sociale.

Valeur de SOPBD215	Condition(s)	Explication
1	5 <= SOPB_21A <= 10 ou 5 <= SOPB_211 <= 10 ou 5 <= SOPB_212 <= 10 ou 5 <= SOPB_21C <= 10 ou 5 <= SOPB_21D <= 10	Le répondant a déclaré une perturbation significative de ses activités à la maison, au travail ou à l'école, ou au niveau de sa capacité à établir et maintenir des relations proches avec les autres ou au niveau de sa vie sociale .
2	(0 <= SOPB_21A <= 4 ou SOPB_21A = SO) et [0 <= SOPB_211 <= 4 ou (SOPB_211 = 11, SO)] et [0 <= SOPB_212 <= 4 ou (SOPB_212 = 11, SO)] et (0 <= SOPB_21C <= 4 ou SOPB_21C = SO) et (0 <= SOPB_21D <= 4 ou SOPB_21D = SO)	Le répondant n'a pas déclaré de perturbation significative de ses activités à la maison, au travail ou à l'école, ou au niveau de sa capacité à établir et maintenir des relations proches avec les autres ou au niveau de sa vie sociale.
ND	(SOPB_21A = NSP, R, ND) ou (SOPB_211 = NSP, R, ND) ou (SOPB_212 = NSP, R, ND) ou (SOPB_21C = NSP, R, ND) ou (SOPB_21D = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

Évaluation du critère E de la phobie sociale au cours de la vie

Valeur de SOPBDE	Condition(s)	Explication
1	(SOPB_16 = 3, 4, 5) ou SOPBD215 = 1 ou 5 <= SOPB_23 <= 365 ou SOPB_25 = 1	Le répondant remplit le critère E de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant a déclaré que l'évitement, l'anticipation anxieuse ou la détresse entraînait une perturbation significative de son fonctionnement social ou professionnel, ou dans d'autres domaines importants.
2	(SOPB_16 = 1, 2, SO) et SOPBD215 = 2 et (0 <= SOPB_23 <= 4 ou SOPB_23 = SO) et (SOPB_25 = 2, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère E de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré que l'évitement, l'anticipation anxieuse ou la détresse entraînait une perturbation significative de son fonctionnement social ou professionnel, ou dans d'autres domaines importants.
ND	(SOPB_16 = NSP, R, ND) ou SOPBD215 = ND ou (SOPB_23 = NSP, R, ND) ou (SOPB_25 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul ou le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul.

10) Phobie sociale au cours de la vie - critère F, partie 1**Nom de la variable :** SOPBDF1**Basée sur :** SOPB_18, SOPB_18A, DHHB_AGE

Description : Le critère F indique que, chez les individus de moins de 18 ans ou chez ceux dont tous les symptômes se sont manifestés avant l'âge de 18 ans, les symptômes doivent avoir persisté au moins six mois. Aucune durée minimale n'est établie pour les répondants qui ont vécu un épisode après l'âge de 18 ans. Le critère F, partie 1 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI identifie les répondants qui ont déclaré qu'ils avaient 18 ans ou plus la dernière fois qu'ils ont craint fortement ou évité une situation sociale ou de performance.

Valeur de SOPBDF1	Condition(s)	Explication
1	18 <= SOPB_18A < SO ou [SOPB_18 = 1, 2, 3] et DHHB_AGE >= 18] ou (SOPB_18A = NSP et DHHB_AGE >= 18)	Le répondant remplit le critère F, partie 1 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant a déclaré qu'il avait 18 ans ou plus la dernière fois qu'il a craint fortement ou évité une situation sociale ou de performance ou le répondant, lorsque âgé de 18 ans et plus, ne se rappelait pas de son âge la dernière fois où il a craint ces situations.
2	DHHB_AGE < 18 ou SOPB_18A < 18 ou (SOPB_18 = SO et SOPB_18A = SO)	Le répondant ne remplit pas le critère F, partie 1 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant a moins de 18 ans ou a déclaré qu'il avait moins de 18 ans la dernière fois qu'il a craint fortement ou évité une situation sociale ou de performance.
ND	(SOPB_18 = NSP, R, ND) ou (SOPB_18A = R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

Reformatages temporaires

Reformatage	Explication
Si (SOPB_03A = SO, NSP, R, ND) alors SOPRQ3A = manquant Si (SOPB_03B = SO, NSP, R, ND) alors SOPRQ3B = manquant Si (SOPB_06A = SO, NSP, R, ND) alors SOPRQ6A = manquant Si (SOPB_18A = SO, NSP, R, ND) alors SOPRQ18A = manquant Si (SOPB_25A = SO, NSP, R, ND) alors SOPRQ25A = manquant Si (SOPB_36A = SO, NSP, R, ND) alors SOPRQ36A = manquant Si (SOPB_39A = SO, NSP, R, ND) alors SOPRQ39A = manquant Si (SOPB_18 = 1, 2, 3) alors SOPRQ18A = DHHB_AGE	Fixer les non-réponses à données manquantes pour les calculs. Fixer l'âge au moment du dernier épisode à l'âge courant si le répondant a déclaré avoir vécu un épisode au cours des 12 derniers mois.

11) Phobie sociale au cours de la vie - critère F, partie 2

Nom de la variable : SOPBDF2

Basée sur : SOPB_03A, SOPB_03B, SOPB_06A, SOPB_18A, SOPB_25A, SOPB_36A, SOPB_39A

Description : Le critère F indique que, chez les individus de moins de 18 ans ou chez ceux dont tous les symptômes se sont manifestés avant l'âge de 18 ans, les symptômes doivent avoir persisté au moins six mois. Aucune durée minimale n'est établie pour les répondants qui ont vécu un épisode après l'âge de 18 ans. Le critère F, partie 2 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI indique si les symptômes ont persisté au moins six mois. On l'établit en déterminant si la différence entre deux des dates déclarées est supérieure à une année.

Nota : Comme les dates disponibles sont les âges exprimés en années, toute différence supérieure à une année est considérée comme la preuve que la durée de l'épisode était supérieure à six mois.

Valeur de SOPBDF2	Condition(s)	Explication
1	Maximale de (SOPRQ03A, SOPRQ03B, SOPRQ06A, SOPRQ18A, SOPRQ25A, SOPRQ36A, SOPRQ39A) – {moins} Minimale de (SOPRQ03A, SOPRQ03B, SOPRQ06A, SOPRQ18A, SOPRQ25A, SOPRQ36A, SOPRQ39A) ≥ 1	Le répondant remplit le critère F, partie 2 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant a déclaré que la durée était supérieure à six mois.
ND	[(SOPB_03B = NSP, R, ND) et (SOPB_06A = SO, NSP, R, ND)] ou (SOPB_18A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré, sans objet) à au moins une question nécessaire au calcul. Nota : Puisque la différence entre l'âge au moment de l'apparition et l'âge au moment de l'épisode le plus récent donne la durée la plus longue, on fixe la valeur à Non déclaré si le répondant ne remplit pas le critère et qu'il n'a pas donné de réponse pour l'âge au moment de l'apparition ou pour l'âge au moment de l'épisode le plus récent.
2	Maximale de (SOPRQ03A, SOPRQ03B, SOPRQ06A, SOPRQ18A, SOPRQ25A, SOPRQ36A, SOPRQ39A) – {moins} Minimale de (SOPRQ03A, SOPRQ03B, SOPRQ06A, SOPRQ18A, SOPRQ25A, SOPRQ36A, SOPRQ39A) = 0 ou (SOPRQ03A = SO et SOPRQ03B = SO et SOPRQ06A = SO et SOPRQ18A = SO)	Le répondant ne remplit pas le critère F, partie 2 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré que la durée était supérieure à six mois.

12) Phobie sociale au cours de la vie - critère F (parties 1 et 2 combinées)

Nom de la variable : SOPBDF

Basée sur : SOPBDF1, SOPBDF2

Description : Le critère F indique que, chez les individus de moins de 18 ans ou chez ceux dont tous les symptômes se sont manifestés avant l'âge de 18 ans, les symptômes doivent avoir persisté au moins six mois. Aucune durée minimale n'est établie pour les répondants qui ont vécu un épisode après l'âge de 18 ans. Cette variable indique si le répondant remplit le critère F de la phobie sociale au cours de la vie selon l'ESCC 1.2/WMH-CIDI. Les répondants qui remplissent le critère déclarent :

1. qu'ils avaient 18 ans ou plus la dernière fois qu'ils ont craint fortement ou évité une situation sociale ou de performance ou le répondant, lorsque âgé de 18 ans et plus, ne se rappelait pas de son âge la dernière fois où il a craint ces situations. ou
2. qu'ils ont craint fortement ou évité une situation sociale ou de performance pendant plus de six mois (opérationnalisé comme étant pendant plus d'une année).

Valeur de SOPBDF	Condition(s)	Explication
1	SOPBDF1 = 1 ou SOPBDF2 = 1	Le répondant remplit le critère F de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant (1) avait 18 ans ou plus la dernière fois qu'il a craint fortement ou évité une situation sociale ou de performance ou le répondant, lorsque âgé de 18 ans et plus, ne se rappelait pas de son âge la dernière fois où il a craint ces situations, ou (2) a déclaré que la crainte ou l'évitement a duré plus de six mois.
2	SOPBDF1 = 2 et SOPBDF2 = 2	Le répondant ne remplit pas le critère F de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant (1) avait moins de 18 ans la dernière fois qu'il a craint fortement ou évité une situation sociale ou de performance et (2) la période de crainte ou d'évitement n'a pas duré plus de six mois.
ND	SOPBDF1 = ND ou SOPBDF2 = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

13) Algorithme pour la phobie sociale au cours de la vie

Nom de la variable : SOPBDSP

Basée sur : SOPBDA, SOPBDB, SOPBDC, SOPBDD, SOPBDE, SOPBDF

Description : Il s'agit de la variable finale qui indique si le répondant remplit ou non les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Les répondants qui remplissent les critères déclarent :

1. une peur persistante et intense d'une ou plusieurs situations sociales ou de performance durant lesquelles ils sont en contact avec des gens non familiers ou bien peuvent être exposés à l'éventuelle observation attentive d'autrui, et craignent d'agir (ou de montrer des symptômes anxieux) de façon embarrassante ou humiliante,

2. que l'exposition à la ou aux situations sociales redoutées provoque de façon quasi-systématique une anxiété,
3. qu'ils reconnaissent le caractère excessif ou irraisonné de la peur,
4. qu'ils évitent ou vivent avec une anxiété et une détresse intenses les situations sociales ou de performance redoutées,
5. que l'évitement, l'anticipation anxieuse ou la détresse dans la ou les situations sociales ou de performance redoutées perturbe, de façon importante, leurs habitudes, leurs activités professionnelles ou scolaires, ou bien leurs activités sociales ou leurs relations avec autrui, et
6. qu'ils avaient 18 ans ou plus la dernière fois qu'ils ont craint fortement ou évité une situation sociale ou de performance, ou lorsque âgés de 18 ans et plus, ne se rappelaient pas de leur âge la dernière fois où ils ont craint ces situations, ou qu'ils ont craint fortement ou évité une situation sociale ou de performance pendant plus de six mois.

Valeur de SOPBDSP	Condition(s)	Explication
1	SOPBDA = 1 et SOPBDB = 1 et SOPBDC = 1 et SOPBDD = 1 et SOPBDE = 1 et SOPBDF = 1	Le répondant remplit les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant a déclaré craindre une ou plusieurs situations sociales ou de performance, éprouver une anxiété lorsqu'il est exposé à la situation redoutée, reconnaître que la peur est excessive, éviter les situations redoutées ou les endurer avec une détresse intense, que l'évitement, la détresse ou l'anxiété perturbe ses habitudes ou son fonctionnement social ou professionnel, et qu'il avait plus de 18 ans au moment de l'épisode le plus récent ou que l'épisode a duré plus de six mois.
2	SOPBDA = 2 ou SOPBDB = 2 ou SOPBDC = 2 ou SOPBDD = 2 ou SOPBDE = 2 ou SOPBDF = 2	Le répondant ne remplit pas les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré craindre une ou plusieurs situations sociales ou de performance, ou éprouver une anxiété quand il est exposé à la situation redoutée, ou penser que la peur est excessive, ou éviter les situations redoutées ou les endurer avec une détresse intense, ou que l'évitement, la crainte ou la détresse perturbe ses habitudes ou son fonctionnement social ou professionnel, ou a déclaré qu'il avait moins de 18 ans au moment de l'épisode le plus récent et que l'épisode avait duré moins de six mois.
ND	SOPBDA = ND ou SOPBDB = ND ou	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des

	SOPBDC = ND ou SOPBDD = ND ou SOPBDE = ND ou SOPBDF = ND	variables dérivées nécessaire au calcul.
--	---	--

14) Phobie sociale – âge au moment de l'apparition – Variable groupée

Nom de la variable : SOPBGON

Basée sur : SOPB_03A, SOPB_03B, SOPB_06A, DHHB_AGE

Description : L'âge au moment de l'apparition de la phobie sociale est l'âge qu'avait le répondant lorsqu'il a éprouvé pour la première fois une peur de situations sociales ou de performance. La valeur de cette variable est calculée uniquement pour les répondants qui remplissent les critères de phobie sociale au cours de la vie. Des enregistrements ont été regroupés par tranche d'âge afin d'assurer la confidentialité. Voir dictionnaire de données.

Valeur de SOPBGON	Condition(s)	Explication
SO	SOPBDSP = 2	Le répondant ne remplit pas les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie.
Valeur minimale à (SOPB_03A, SOPB_03B, SOPB_06A)	SOPBDSP = 1 et (SOPB_03A <= DHHB_AGE ou SOPB_03B <= DHHB_AGE ou SOPB_06A <= DHHB_AGE)	L'âge au moment de l'apparition est l'âge qu'avait le répondant lorsqu'il a craint pour la première fois des situations sociales ou de performance.
ND	SOPBDSP = ND ou (SOPB_03A = NSP, R, ND) ou (SOPB_03B = NSP, R, ND) ou (SOPB_06A = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

15) Phobie sociale – âge au moment de l'épisode le plus récent – Variable groupée

Nom de la variable : SOPBGREC

Basée sur : SOPB_18, SOPB_18A, DHHB_AGE

Description : Cette variable indique l'âge qu'avait le répondant la dernière fois qu'il ou elle a craint fortement ou évité des situations sociales ou de performance. Cette variable est calculée uniquement pour les répondants qui remplissent les critères de phobie sociale au cours de la vie.

Des enregistrements ont été regroupés par tranche d'âge afin d'assurer la confidentialité. Voir dictionnaire de données.

Valeur de SOPBGREC	Condition(s)	Explication
SO	SOPBDSP = 2	Le répondant ne remplit pas les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie.
DHHB_AGE	SOPBDSP = 1 et (SOPB_18 = 1, 2, 3)	L'âge au moment de l'épisode le plus récent est l'âge courant.
Valeur à SOPB_18A	SOPBDSP = 1 et (SOPB_18 = 4, NSP) et SOPB_18A < SO	L'âge au moment de l'épisode le plus récent est l'âge qu'avait le répondant lors du dernier épisode où il a craint ou évité des situations sociales ou de performance.
ND	SOPBDSP = ND ou	Le répondant a une valeur de non-

	(SOPB_18 = R, ND) ou (SOPB_18A = NSP, R, ND)	réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
--	---	--

Phobie sociale – Au cours des 12 derniers mois

16) Phobie sociale au cours des 12 derniers mois - critère A

Nom de la variable : SOPBDYA

Basée sur : SOPBDSP

Description : Cette variable identifie les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours de la vie.

Valeur de SOPBDYA	Condition(s)	Explication
1	SOPBDSP = 1	Le répondant remplit le critère A de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours des 12 derniers mois. Le répondant remplit les critères de phobie sociale au cours de la vie.
2	SOPBDSP = 2	Le répondant ne remplit pas le critère A de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours des 12 derniers mois. Le répondant ne remplit pas les critères de phobie sociale au cours de la vie.
ND	(SOPBDSP = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul.

17) Phobie sociale au cours des 12 derniers mois - critère B

Nom de la variable : SOPBDYB

Basée sur : SOPB_18, SOPB_18A, SOPB_03A, SOPB_03B, SOPB_06A, DHHB_AGE

Description : Cette variable identifie les répondants qui déclarent avoir craint intensément ou évité des situations sociales ou de performance au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.

Valeur de SOPBDYB	Condition(s)	Explication
1	(SOPB_18 = 1, 2, 3) ou SOPB_03A = DHHB_AGE ou SOPB_03B = DHHB_AGE ou SOPB_06A = DHHB_AGE ou SOPB_18A = DHHB_AGE	Le répondant remplit le critère B de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours des 12 derniers mois. Le répondant a déclaré qu'il avait craint ou évité des situations sociales ou de performance au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.
2	(SOPB_18 = 4, SO) et (SOPB_18A < DHHB_AGE ou	Le répondant ne remplit pas le critère B de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI

	SOPB_18A = SO) et (SOPB_03A < DHHB_AGE ou SOPB_03B < DHHB_AGE ou [SOPB_03A = SO et SOPB_03B = SO]) et (SOPB_06A < DHHB_AGE ou SOPB_06A = SO)	pour la phobie sociale au cours des 12 derniers mois. Le répondant n'a pas déclaré qu'il avait craint ou évité des situations sociales ou de performance au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.
ND	(SOPB_18 = NSP, R, ND) ou (SOPB_18A = NSP, R, ND) ou (SOPB_03A = NSP, R, ND) ou (SOPB_03B = NSP, R, ND) ou (SOPB_06A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

18) Phobie sociale au cours des 12 derniers mois - critère C

Nom de la variable : SOPBDYC

Basée sur : SOPB_20, SOPB_21A, SOPB_211, SOPB_212, SOPB_21C, SOPB_21D, SOPB_23, SOPB_38

Description : Cette variable identifie les répondants qui déclarent que leur peur ou leur comportement d'évitement a causé une détresse clinique significative ou une altération de leur fonctionnement social ou professionnel ou dans d'autres domaines importants au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.

Valeur de SOPBDYC	Condition(s)	Explication
1	(SOPB_20 = 1, 2, 3) ou 5 <= SOPB_21A <= 10 ou 5 <= SOPB_211 <= 10 ou 5 <= SOPB_212 <= 10 ou 5 <= SOPB_21C <= 10 ou 5 <= SOPB_21D <= 10 ou 5 <= SOPB_23 <= 365 ou SOPB_38 = 1	Le répondant remplit le critère C de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours des 12 derniers mois. Le répondant a déclaré une détresse cliniquement significative ou une altération de son fonctionnement social ou professionnel ou dans d'autres domaines importants au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.
2	(SOPB_20 = 4, 5, SO) et (0 <= SOPB_21A <= 4 ou SOPB_21A = SO) et [0 <= SOPB_211 <= 4 ou (SOPB_211 = 11, SO)] et [0 <= SOPB_212 <= 4 ou (SOPB_212 = 11, SO)] et (0 <= SOPB_21C <= 4 ou SOPB_21C = SO) et (0 <= SOPB_21D <= 4 ou SOPB_21D = SO) et (0 <= SOPB_23 <= 4 ou SOPB_23 = SO) et (SOPB_38 = 2, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère C de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours des 12 derniers mois. Le répondant n'a pas déclaré de détresse cliniquement significative ni d'altération de son fonctionnement social ou professionnel ou dans d'autres domaines importants au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.
ND	(SOPB_20 = NSP, R, ND) ou (SOPB_21A = NSP, R, ND) ou (SOPB_211 = NSP, R, ND) ou (SOPB_212 = NSP, R, ND) ou (SOPB_21C = NSP, R, ND) ou (SOPB_21D = NSP, R, ND) ou (SOPB_23 = NSP, R, ND) ou	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

(SOPB_38 = NSP, R, ND)

19) Algorithme pour la phobie sociale au cours des 12 derniers mois**Nom de la variable :** SOPBDPY**Basée sur :** SOPBDYA, SOPBDYB, SOPBDYC**Description :** Il s'agit de la variable finale qui indique si le répondant remplit ou non les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview. Les répondants qui remplissent les critères déclarent :

1. remplir les critères de phobie sociale au cours de la vie,
2. avoir craint ou évité une ou plusieurs situations sociales ou de performance au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview et
3. avoir éprouvé une détresse cliniquement significative ou une altération de leur fonctionnement social ou professionnel ou dans d'autres domaines importants.

Valeur de SOPBDPY	Condition(s)	Explication
1	SOPBDYA = 1 et SOPBDYB = 1 et SOPBDYC = 1	Le répondant remplit tous les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours des 12 derniers mois. Le répondant a déclaré (1) remplir les critères de phobie sociale au cours de la vie, (2) avoir craint ou évité des situations sociales ou de performance au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview et (3) avoir éprouvé une détresse cliniquement significative ou une altération de son fonctionnement social ou professionnel ou dans d'autres domaines importants.
2	SOPBDYA = 2 ou SOPBDYB = 2 ou SOPBDYC = 2	Le répondant ne remplit pas tous les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours des 12 derniers mois. Le répondant n'a pas déclaré (1) remplir les critères de phobie sociale au cours de la vie, ou (2) avoir craint ou évité des situations sociales ou de performance au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview, ou (3) avoir éprouvé une détresse cliniquement significative ou une altération de son fonctionnement social ou professionnel ou dans d'autres domaines importants.
ND	SOPBDYA = ND ou SOPBDYB = ND ou SOPBDYC = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

20) Trouble attribuable à la phobie sociale – moyenne

Nom de la variable : SOPBDINT

Basée sur : SOPB_21A, SOPB_211, SOPB_212, SOPB_21C, SOPB_21D, SOPBDPY

Description : Cette variable décrit la perturbation que la phobie sociale a entraînée sur les activités et les responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s'agit d'une moyenne des cinq items. Cette variable n'est calculée que pour les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours des 12 derniers mois.

Nota : Les répondants qui ont répondu que s'ils devaient faire face aujourd'hui à la même situation qui a provoqué la phobie sociale, ils auraient moins peur ou aucune peur. Ces derniers n'ont pas eu à répondre les questions sur la perturbation/le trouble.

Valeur de SOPBDINT	Condition(s)	Explication
SO	SOPBDPY = 2	Le répondant ne remplissait pas les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour phobie sociale au cours des 12 derniers mois.
ND	SOPB_21A = SO et SOPB_211 = SO et SOPB_212 = SO et SOPB_21C = SO et SOPB_21D = SO	Les questions concernant la perturbation n'ont pas été posées aux répondants parce qu'ils ont répondu que s'ils devaient faire face aujourd'hui à la même situation qui a provoqué la phobie sociale, ils auraient moins peur ou aucune peur.
ND	SOPBDPY = ND ou (SOPB_21A = NSP, R, ND) ou (SOPB_211 = NSP, R, ND) ou (SOPB_212 = NSP, R, ND) ou (SOPB_21C = NSP, R, ND) ou (SOPB_21D = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
$\frac{(\text{SOPB_21A} + \text{SOPB_211} + \text{SOPB_212} + \text{SOPB_21C} + \text{SOPB_21D})}{5}$ (min : 0; max : 10.0) (arrondir à .1)	SOPBDPY = 1 et $0 \leq \text{SOPB_211} \leq 10$ et $0 \leq \text{SOPB_212} \leq 10$ et $0 \leq \text{SOPB_21A} \leq 10$ et $0 \leq \text{SOPB_21C} \leq 10$ et $0 \leq \text{SOPB_21D} \leq 10$	Trouble = moyenne des cinq items. Le répondant a répondu aux cinq questions.
$\frac{(\text{SOPB_21A} + \text{SOPB_212} + \text{SOPB_21C} + \text{SOPB_21D})}{4}$ (min : 0; max : 10.0) (arrondir à .1)	SOPBDPY = 1 et SOPB_211 = 11 et $0 \leq \text{SOPB_212} \leq 10$ et $0 \leq \text{SOPB_21A} \leq 10$ et $0 \leq \text{SOPB_21C} \leq 10$ et $0 \leq \text{SOPB_21D} \leq 10$	Trouble = moyenne de quatre items qui s'appliquaient au répondant. SOPB_211 ne s'appliquait pas (c.-à-d. que le répondant n'a pas fréquenté l'école au cours des 12 derniers mois).
$\frac{(\text{SOPB_21A} + \text{SOPB_211} + \text{SOPB_21C} + \text{SOPB_21D})}{4}$ (min : 0; max : 10.0) (arrondir à .1)	SOPBDPY = 1 et $0 \leq \text{SOPB_211} \leq 10$ et SOPB_212 = 11 et $0 \leq \text{SOPB_21A} \leq 10$ et $0 \leq \text{SOPB_21C} \leq 10$ et $0 \leq \text{SOPB_21D} \leq 10$	Trouble = moyenne de quatre items qui s'appliquaient au répondant. SOPB_212 ne s'appliquait pas (c.-à-d. que le répondant n'a pas travaillé au cours des 12 derniers mois).
$\frac{(\text{SOPB_21A} + \text{SOPB_21C} + \text{SOPB_21D})}{3}$	SOPBDPY = 1 et SOPB_211 = 11 et	Trouble = moyenne de trois items qui s'appliquaient au répondant.

(min : 0; max : 10.0) (arrondir à .1)	SOPB_212 = 11 et 0 <= SOPB_21A <= 10 et 0 <= SOPB_21C <= 10 et 0 <= SOPB_21D <= 10	SOPB_211 et SOPB_212 ne s'appliquaient pas (c.-à-d. que le répondant n'a pas fréquenté l'école et n'a pas travaillé au cours des 12 derniers mois).
--	---	---

21) Indicateur de la perturbation attribuable à la phobie sociale

Nom de la variable : SOPBFINT

Basée sur : SOPB_21A, SOPB_211, SOPB_212, SOPB_21C, SOPB_21D, SOPBDPY

Description : Cette variable décrit la perturbation que la phobie sociale a entraînée sur les activités et les responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s'agit d'une classification indiquant si la phobie sociale perturbe de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires) ou les activités sociales ou les relations avec autrui de la personne. Cette variable n'est calculée que pour les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour la phobie sociale au cours des 12 derniers mois.

Nota : Les répondants qui ont répondu que s'ils devaient faire face aujourd'hui à la même situation qui a provoqué la phobie sociale, ils auraient moins peur ou aucune peur, n'ont pas eu à répondre aux questions sur la perturbation/le trouble.

Valeur de SOPBFINT	Condition(s)	Explication
SO	SOPBDPY = 2	Le répondant ne remplissait pas les critères de phobie sociale au cours des 12 derniers mois.
ND	SOPB_21A = SO et SOPB_211 = SO et SOPB_212 = SO et SOPB_21C = SO et SOPB_21D = SO	Les questions concernant la perturbation n'ont pas été posées aux répondants parce qu'ils ont répondu que s'ils devaient faire face aujourd'hui à la même situation qui a provoqué la phobie sociale, ils auraient moins peur ou aucune peur.
1	SOPBDPY = 1 et (5 <= SOPB_21A <= 10 ou 5 <= SOPB_211 <= 10 ou 5 <= SOPB_212 <= 10 ou 5 <= SOPB_21C <= 10 ou 5 <= SOPB_21D <= 10)	La phobie sociale a perturbé de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires) ou les activités sociales ou les relations personnelles au cours des 12 derniers mois.
2	SOPBDPY = 1 et 0 <= SOPB_21A <= 4 et (0 <= SOPB_211 <= 4 ou SOPB_211 = 11) et (0 <= SOPB_212 <= 4 ou SOPB_212 = 11) et 0 <= SOPB_21C <= 4 et 0 <= SOPB_21D <= 4	La phobie sociale n'a pas perturbé de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires) ou les activités sociales ou les relations personnelles au cours des 12 derniers mois.
ND	SOPBDPY = ND ou (SOPB_21A = NSP, R, ND) ou (SOPB_211 = NSP, R, ND) ou (SOPB_212 = NSP, R, ND) ou (SOPB_21C = NSP, R, ND) ou (SOPB_21D = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

Agoraphobie (22 VD)

Pour les besoins de l'ESCC 1.2, l'agoraphobie est la peur et l'évitement d'être dans des endroits ou des situations d'où il pourrait être difficile de s'échapper ou dans lesquels on pourrait ne pas trouver de secours. Les situations redoutées incluent le fait de se trouver seul en dehors de son domicile, d'être dans une foule ou dans une file d'attente, d'être sur un pont ou dans un autobus, un train ou une voiture. Les situations peuvent être subies avec une détresse qui peut inclure des étourdissements, des sueurs, des douleurs à la poitrine, des nausées, un sentiment d'impuissance ou de détachement, ou un sentiment que le corps ou l'environnement n'est pas réel. L'agoraphobie peut se manifester seule ou être accompagnée d'un trouble panique.

Les questions sur l'agoraphobie sont fondées sur une version reconnue du World Mental Health du Composite International Diagnostic Interview (WMH-CIDI) et modifiées pour les besoins du cycle 1.2 de l'ESCC. L'instrument WMH-CIDI, qui fait partie du projet «World Mental Health 2000» (WMH2000), est une initiative de l'Organisation mondiale de la santé destinée à évaluer la prévalence de divers troubles mentaux dans plusieurs pays à travers le monde.

Le WMH-CIDI est un questionnaire normalisé pour l'évaluation des troubles mentaux conformément à l'opérationnalisation des définitions et critères du DSM-IV et de la CIM-10. L'abréviation DSM désigne le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié par l'American Psychiatric Association. Il s'agit d'une classification des troubles mentaux reconnue à l'échelle internationale dont il existe plusieurs versions. Les troubles ou problèmes mentaux étudiés dans le cadre de l'ESCC 1.2 sont codés de façon partielle selon le DSM-IV ou le DSM-III-R. L'ESCC 1.2 n'offre aucun soutien vis-à-vis les algorithmes de la CIM-10.

Le projet WMH2000 a été adapté à plusieurs versions IPAO (interview sur place assistée par ordinateur) et IPC (interview papier et crayon) du questionnaire WMH-CIDI. Les responsables du projet ont déjà créé un groupe de travail qui examinera les différences méthodologiques pour s'assurer que les comparaisons entre pays soient faites de façon appropriée.

L'agoraphobie est l'un des cinq états de santé mentale du projet WMH2000 visés par cette enquête. Celle-ci est conçue pour évaluer le diagnostic de l'agoraphobie au cours de la vie et au cours des 12 derniers mois. Un épisode au cours des 12 derniers mois s'entend des 12 mois qui ont précédé l'interview.

La documentation qui accompagne les données de l'ESCC 1.2 fournit des renseignements sur toutes les variables dérivées temporaires utilisées pour calculer les variables dérivées finales de troubles dont le profil est établi au cours de la vie et au cours des 12 derniers mois. Pour la plupart des utilisateurs des données, les variables dérivées finales et les variables dérivées ayant trait à la récence, à la durée, à l'âge au moment de l'apparition et à la perturbation associée au trouble suffiront pour réaliser les analyses.

En ce qui concerne l'agoraphobie, les variables d'intérêt sont :

Variable	Concept	Numéro de la variable
AGPBDAP	Algorithme – vie	7
AGPBDAPP	Algorithme – vie (sans panique)	12
AGPBDPY	Algorithme - 12 mois	19
AGPBDPYP	Algorithme – 12 mois (sans panique)	20

AGPBGON	Apparition	13
AGPBGONP	Apparition (sans panique)	16
AGPBGREC	Récence	14
AGPBGRCP	Récence (sans panique)	17
AGPBGPER	Persistance	15
AGPBGPRP	Persistance (sans panique)	18
AGPBG13A	Durée	1
AGPBDINT	Perturbation / Trouble – 12 mois	21

Les critères utilisés pour produire les variables dérivées finales associées à l'agoraphobie, ainsi que leurs variables temporaires respectives sont opérationnalisés de façon à satisfaire partiellement aux définitions/classification du DSM-IV. Bien que le questionnaire et les algorithmes soient fondés sur des approches et une classification reconnues mondialement, cette méthode ne peut être utilisée pour poser le diagnostic du trouble chez les personnes présentant ce profil. Seuls des professionnels ayant la formation médicale requise peuvent le faire.

L'instrument de l'ESCC 1.2 permet de recueillir une foule d'informations sur le nombre de symptômes, la gravité, la durée et l'intensité globale du trouble. Toutefois, l'approche structurée utilisée pour l'instrument informatisé n'est pas conçue pour recueillir certains renseignements complexes utilisés par ceux ayant reçu une formation professionnelle pour poser le diagnostic final conformément à la classification du DSM-IV. Ainsi, il n'existe aucun algorithme pour appuyer la création de variables dérivées en rapport avec les spécificateurs/sous-types du trouble. En outre, bien que l'instrument soit conçu pour recueillir certains renseignements utilisés pour l'opérationnalisation des exclusions physiques/organiques et des règles hiérarchiques, Statistique Canada recommande que cette information soit utilisée par des spécialistes du DSM étant donné sa nature complexe.

En plus de l'information sur les états de santé mentale, le questionnaire WMH-CIDI permet de recueillir des renseignements sur un grand nombre de corrélats importants de la santé mentale, comme l'utilisation des services de santé et le soutien. Toutefois, les données de l'ESCC 1.2 recueillies sur les corrélats de la santé mentale ne sont pas fondées sur le questionnaire WMH-CIDI. Bien que les comparaisons internationales de ce genre de données soient importantes, après avoir consulté les divers intervenants, Statistique Canada a décidé que les données de l'ESCC 1.2 devraient appuyer et compléter l'information canadienne déjà recueillie dans le cadre de l'ESCC 1.1 et des cycles de l'ENSP réalisés antérieurement.

Pour simplifier la comparaison au DSM, les critères sont présentés plus ou moins selon le modèle du DSM-IV. Cette correspondance vise uniquement à faciliter l'interprétation des résultats en permettant un langage commun. Toutefois, il serait inapproprié de conclure à l'existence d'une correspondance directe entre nos critères et ceux du DSM-IV en raison de la nature complexe du sujet et des limites opérationnelles associées au questionnaire et aux algorithmes.

Pour les besoins de cette enquête, les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie au cours de la vie sont ceux qui déclarent :

1. que l'anxiété liée au fait de se retrouver dans des endroits ou situations d'où il pourrait être difficile (ou gênant) de s'échapper ou dans lesquels il pourrait ne pas trouver de secours en cas d'attaque de panique; et

2. que les situations sont soit évitées, soit subies avec une détresse intense, ou bien qu'elles nécessitent la présence d'un accompagnant.

Pour les besoins de cette enquête, les répondants qui remplissent les critères ESCC 1.2/WMH-CIDI d'agoraphobie au cours des 12 derniers mois :

1. remplissent les critères l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie au cours de la vie et
2. déclarent avoir vécu un épisode au cours des 12 derniers mois.

L'agoraphobie avec symptômes de panique mais sans trouble de panique est également évaluée.

Pour les besoins de cette enquête, les répondants qui remplissent les critères ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie avec symptômes de panique mais sans trouble de panique au cours de la vie sont ceux qui :

1. remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie et ont peur de développer des symptômes de type panique et
2. ne remplissent pas les critères l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour de trouble panique.

Les répondants qui ne remplissent pas les critères incluent ceux qui n'ont pas peur de manifester des symptômes de type panique, ainsi que ceux qui remplissent les critères de trouble panique.

Pour les besoins de cette enquête, les répondants qui remplissent les critères ESCC 1.2/WMH-CIDI de l'agoraphobie avec symptômes de panique mais sans trouble de panique au cours des 12 derniers mois :

1. remplissent les critères l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie avec symptômes de panique mais sans trouble de panique au cours de la vie et
2. déclarent avoir vécu un épisode au cours des 12 derniers mois.

Agoraphobie au cours de la vie

1) Agoraphobie – durée de la plus longue période durant laquelle le répondant a été incapable de quitter sa maison – Variable groupée

Nom de la variable : AGPBG13A

Basée sur : AGPB_13B (JOURS), AGPB_13C (SEMAINES), AGPB_13D (MOIS), AGPB_13E (ANNEES)

Description : Cette variable identifie la période la plus longue durant laquelle le répondant a été incapable de quitter sa maison. Sa valeur est calculée uniquement pour les répondants qui ont dit ne pas être capables de quitter leur maison pendant une journée entière à cause de leur peur.

Des enregistrements ont été regroupés par tranche de durées afin d'assurer la confidentialité. Voir dictionnaire de données.

Valeur de AGPBG13A	Condition(s)	Explication
SO	AGPB_13B = SO et AGPB_13C = SO et AGPB_13D = SO et AGPB_13E = SO	Les questions nécessaires pour le calcul n'ont pas été posées au répondant.
1	1 <= AGPB_13B <= 3 ou	1 à 3 jours
2	4 <= AGPB_13B <= 7 ou AGPB_13C = 1	1 semaine (4 à 7 jours)
3	8 <= AGPB_13B <= 14 ou AGPB_13C = 2	2 semaines (8 à 14 jours)
4	15 <= AGPB_13B <= 21 ou AGPB_13C = 3	3 semaines (15 à 21 jours)
5	22 <= AGPB_13B <= 31 ou AGPB_13C = 4 ou AGPB_13D = 1	1 mois
6	32 <= AGPB_13B <= 60 ou 5 <= AGPB_13C <= 8 ou AGPB_13D = 2	2 mois
7	61 <= AGPB_13B <= 91 ou 9 <= AGPB_13C <= 13 ou AGPB_13D = 3	3 mois
8	92 <= AGPB_13B <= 120 ou 14 <= AGPB_13C <= 17 ou AGPB_13D = 4	4 mois
9	121 <= AGPB_13B <= 151 ou 18 <= AGPB_13C <= 21 ou AGPB_13D = 5	5 mois
10	152 <= AGPB_13B <= 180 ou 22 <= AGPB_13C <= 26 ou AGPB_13D = 6	6 mois
11	181 <= AGPB_13B <= 211 ou 27 <= AGPB_13C <= 30 ou AGPB_13D = 7	7 mois
12	212 <= AGPB_13B <= 240 ou 31 <= AGPB_13C <= 34 ou AGPB_13D = 8	8 mois
13	241 <= AGPB_13B <= 271 ou 35 <= AGPB_13C <= 39 ou AGPB_13D = 9	9 mois
14	272 <= AGPB_13B <= 300 ou 40 <= AGPB_13C <= 44 ou AGPB_13D = 10	10 mois

15	301 <= AGPB_13B <= 331 ou 45 <= AGPB_13C <= 48 ou AGPB_13D = 11	11 mois
16	332 <= AGPB_13B <= 365 ou 49 <= AGPB_13C <= 52 ou AGPB_13D = 12 ou AGPB_13E = 1	1 an
17	366 <= AGPB_13B <= 900 ou 53 <= AGPB_13C <= 104 ou 13 <= AGPB_13D <= 48 ou 2 <= AGPB_13E <= 4	2 à 4 ans
18	AGPB_13E > 4 et AGPB_13E <= SO	5 ans ou plus
ND	AGPB_13B = (NSP, R, ND) ou AGPB_13C = (NSP, R, ND) ou AGPB_13D = (NSP, R, ND) ou AGPB_13E = (NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

2) Agoraphobie au cours de la vie - critère A

Nom de la variable : AGPBDA

Basée sur : AGPB_01A, AGPB_01B, AGPB_01C, AGPB_01D, AGPB_01E, AGPB_01F, AGPB_01G, AGPB_01H, AGPB_01I, AGPB_01J, AGPB_01K, AGPB_04D, AGPB_04G, SCRB_30

Description : Cette variable sert à évaluer si le répondant remplit le critère A de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie au cours de la vie. Elle identifie les répondants qui déclarent avoir éprouvé une anxiété liée au fait de se retrouver dans un endroit ou des situations où il pourrait être difficile (ou gênant) de s'échapper et pour lesquels il y a une peur d'avoir une attaque de panique.

Valeur de AGPBDA	Condition(s)	Explication
1	(AGPB_04D = 1 et AGPB_04G = 1) et au moins 2 de (AGPB_01A, AGPB_01B, AGPB_01C, AGPB_01D, AGPB_01E, AGPB_01F, AGPB_01G, AGPB_01H, AGPB_01I, AGPB_01J, AGPB_01K) = 1	Le répondant remplit le critère A de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie au cours de la vie. Le répondant a déclaré éprouver de l'anxiété liée au fait de se retrouver dans des endroits ou situations d'où il pourrait être difficile (ou gênant) de s'échapper et pour lesquels il y a une peur d'avoir une attaque de panique.
2	(AGPB_04D = 2, SO ou AGPB_04G = 2, SO) ou au moins 10 de (AGPB_01A, AGPB_01B, AGPB_01C, AGPB_01D, AGPB_01E, AGPB_01F, AGPB_01G, AGPB_01H, AGPB_01I, AGPB_01J, AGPB_01K = 2, 3, SO) ou SCRB_30 = 2	Le répondant ne remplit pas le critère A de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré éprouver de l'anxiété liée au fait de se retrouver dans au moins deux endroits ou situations d'où il pourrait être difficile (ou gênant) de s'échapper ou pour lesquels il y a une peur d'avoir une attaque de panique.

ND	(AGPB_04D = NSP, R, ND) ou (AGPB_04G = NSP, R, ND) ou (AGPB_01A = NSP, R, ND) ou (AGPB_01B = NSP, R, ND) ou (AGPB_01C = NSP, R, ND) ou (AGPB_01D = NSP, R, ND) ou (AGPB_01E = NSP, R, ND) ou (AGPB_01F = NSP, R, ND) ou (AGPB_01G = NSP, R, ND) ou (AGPB_01H = NSP, R, ND) ou (AGPB_01I = NSP, R, ND) ou (AGPB_01J = NSP, R, ND) ou (AGPB_01K = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
----	---	--

3) Agoraphobie au cours de la vie - critère B, partie 1

Nom de la variable : AGPBDB1

Basée sur : SCRB_302, AGPB_13

Description : Cette variable identifie les répondants qui ont déclaré avoir évité les situations ou être incapables de quitter leur maison pendant une journée entière à cause de leur peur des situations.

Valeur de AGPBDB1	Condition(s)	Explication
1	SCRB_302 = 1 ou AGPB_13 = 1	Le répondant remplit le critère B, partie 1 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie au cours de la vie. Le répondant a évité les situations redoutées.
2	(SCRB_302 = 2, SO) et (AGPB_13 = 2, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère B, partie 1 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie au cours de la vie. Le répondant n'a pas évité les situations redoutées.
ND	(SCRB_302 = NSP, R, ND) ou (AGPB_13 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

4) Agoraphobie au cours de la vie - critère B, partie 2

Nom de la variable : AGPBDB2

Basée sur : SCRB_301, AGPB_04D, AGPB_09A, AGPB_09B, AGPB_09C, AGPB_09D

Description : Le critère B, partie 2 permet d'évaluer si les situations ont été subies avec une détresse intense ou bien avec la crainte d'avoir une attaque de panique ou des symptômes de type panique. Cette variable indique si le répondant a éprouvé de la détresse ou de l'anxiété ou a craint d'avoir une attaque de panique ou des symptômes de type panique, comme le cœur qui bat trop fort ou trop vite, des sueurs, des tremblements ou des frémissements, ou la bouche sèche.

Valeur de AGPBDB2	Condition(s)	Explication
1	SCRB_301 = 1 ou AGPB_04D = 1 ou AGPB_09A = 1 ou AGPB_09B = 1 ou AGPB_09C = 1 ou AGPB_09D = 1	Le répondant remplit le critère B, partie 2 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie au cours de la vie. Les situations sont subies avec une détresse intense ou bien avec la crainte d'avoir une attaque de panique ou des symptômes de type panique.
2	(SCRB_301 = 2, SO) et (AGPB_04D = 2, SO) et (AGPB_09A = 2, SO) et (AGPB_09B = 2, SO) et (AGPB_09C = 2, SO) et (AGPB_09D = 2, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère B, partie 2 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie au cours de la vie. Les situations ne sont pas subies avec une détresse intense ni avec la crainte d'avoir une attaque de panique ou des symptômes de type panique.
ND	(SCRB_301 = NSP, R, ND) ou (AGPB_04D = NSP, R, ND) ou (AGPB_09A = NSP, R, ND) ou (AGPB_09B = NSP, R, ND) ou (AGPB_09C = NSP, R, ND) ou (AGPB_09D = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

5) Agoraphobie au cours de la vie - critère B, partie 3

Nom de la variable : AGPBDB3

Basée sur : AGPB_14

Description : Cette variable indique si le répondant a été incapable de quitter sa maison sans être accompagné d'une personne de son entourage telle qu'un membre de sa famille ou un ami.

Valeur de AGPBDB3	Condition(s)	Explication
1	AGPB_14 = 1	Le répondant remplit le critère B, partie 3 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie au cours de la vie. Les situations requièrent la présence d'un accompagnant.
2	(AGPB_14 = 2, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère B, partie 3 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie au cours de la vie. Les situations ne requièrent pas la présence d'un accompagnant.
ND	(AGPB_14 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

6) Agoraphobie au cours de la vie - critère B (parties 1, 2 et 3 combinées)

Nom de la variable : AGPBDB

Basée sur : AGPBDB1, AGPBDB2, AGPBDB3

Description : Cette variable indique si le répondant remplit le critère B pour l'agoraphobie au cours de la vie de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI. Les répondants qui remplissent le critère déclarent :

1. avoir évité des situations associées à l'agoraphobie
2. avoir subi les situations avec une détresse intense ou la crainte d'avoir une attaque de panique ou des symptômes de type panique ou
3. que les situations requièrent la présence d'un accompagnant.

Valeur de AGPBDB	Condition(s)	Explication
1	AGPBDB1 = 1 ou AGPBDB2 = 1 ou AGPBDB3 = 1	Le répondant remplit le critère B de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie au cours de la vie. Le répondant (1) a évité les situations associées à l'agoraphobie ou (2) a subi les situations avec une détresse intense ou la crainte d'avoir une attaque de panique ou des symptômes de type panique ou (3) a eu besoin de la présence d'un accompagnant.
2	AGPBDB1 = 2 et AGPBDB2 = 2 et AGPBDB3 = 2	Le répondant ne remplit pas le critère B de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie au cours de la vie. Le répondant (1) n'a pas évité les situations associées à l'agoraphobie et (2) n'a pas éprouvé de détresse intense ou de crainte d'avoir une attaque de panique ou des symptômes de type panique et (3) n'a pas eu besoin de la présence d'un accompagnant.
ND	AGPBDB1 = ND ou AGPBDB2 = ND ou AGPBDB3 = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

7) Algorithme pour l'agoraphobie au cours de la vie

Nom de la variable : AGPBDAP

Basée sur : AGPBDA, AGPBDB

Description : Cette variable identifie les répondants qui remplissent les critères d'agoraphobie au cours de la vie de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI. Les répondants qui remplissent les critères déclarent :

1. éprouver de l'anxiété liée au fait de se retrouver dans des endroits ou situations différents d'où il pourrait être difficile ou gênant de s'échapper et pour lesquels il y a une peur d'avoir une attaque de panique, et
2. avoir évité les situations associées à l'agoraphobie ou les avoir subies avec une détresse intense ou avec la crainte d'avoir une attaque de panique, ou qu'elles nécessitaient la présence d'un accompagnant.

Valeur de AGPDAP	Condition(s)	Explication
1	AGPBDA = 1 et AGPBDB = 1	<p>Le répondant remplit tous les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie au cours de la vie.</p> <p>Le répondant a déclaré (1) avoir éprouvé de l'anxiété liée au fait de se retrouver dans des endroits ou situations différents d'où il pourrait être difficile ou gênant de s'échapper et pour lesquels il y a une peur d'avoir une attaque de panique (2) avoir évité les situations associées à l'agoraphobie, ou les avoir subies avec une détresse intense ou de l'anxiété, ou avoir eu besoin de la présence d'un accompagnant, et</p>
2	AGPBDA = 2 ou AGPBDB = 2	<p>Le répondant ne répond pas à tous les critères de l'agoraphobie au cours de la vie.</p> <p>Le répondant (1) n'a pas déclaré éprouver de l'anxiété liée au fait de se retrouver dans des endroits ou situations différents d'où il pourrait être difficile ou gênant de s'échapper ou pour lesquels il y a une peur d'avoir une attaque de panique ou (2) n'a pas évité les situations associées à l'agoraphobie, ou n'a pas subi les situations avec une détresse intense ou de l'anxiété, ou n'a pas requis la présence d'un accompagnant</p>
ND	AGPBDA = ND ou AGPBDB = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

Agoraphobie avec symptômes de panique mais sans trouble de panique au cours de la vie

8) Agoraphobie avec symptômes de panique mais sans trouble de panique au cours de la vie - critère A, partie 1

Nom de la variable : AGPDAP

Description : Le critère A, partie 1, de l'agoraphobie accompagnée de symptômes de panique mais sans trouble de panique, est exactement le même que le critère de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie au cours de la vie (variable AGPDAP) qui est défini et spécifié plus haut dans le présent document.

9) Agoraphobie avec symptômes de panique mais sans trouble de panique au cours de la vie - critère A, partie 2

Nom de la variable : AGPBDPA2

Basée sur : AGPB_04C, AGPB_04D, AGPB_04E, AGPB_04F

Description : Cette variable indique si le répondant a eu peur de manifester des symptômes de type panique ou d'avoir une attaque de panique.

Valeur de AGPBDPA2	Condition(s)	Explication
1	AGPB_04C = 1 ou AGPB_04D = 1 ou AGPB_04E = 1 ou AGPB_04F = 1	Le répondant remplit le critère A, partie 2 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie avec symptômes de panique mais sans trouble de panique au cours de la vie. Le répondant a déclaré avoir eu peur de manifester des symptômes de type panique ou d'avoir une attaque de panique.
2	(AGPB_04C = 2, SO) et (AGPB_04D = 2, SO) et (AGPB_04E = 2, SO) et (AGPB_04F = 2, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère A, partie 2 de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie avec symptômes de panique mais sans trouble de panique au cours de la vie. Le répondant n'a pas déclaré avoir eu peur de manifester des symptômes de type panique ou d'avoir une attaque de panique.
ND	(AGPB_04C = NSP, R, ND) ou (AGPB_04D = NSP, R, ND) ou (AGPB_04E = NSP, R, ND) ou (AGPB_04F = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

10) Agoraphobie avec symptômes de panique mais sans trouble de panique au cours de la vie - critère A (parties 1 et 2 combinées)

Nom de la variable : AGPBDPA

Basée sur : AGPBDAP, AGPBDPA2

Description : Cette variable permet d'évaluer le critère A d'agoraphobie avec symptômes de panique mais sans trouble de panique au cours de la vie et identifie les répondants qui remplissent les critères d'agoraphobie au cours de la vie et qui ont peur de manifester des symptômes de type panique ou d'avoir une attaque de panique.

Valeur de AGPBDPA	Condition(s)	Explication
1	AGPBDAP = 1 et AGPBDPA2 = 1	Le répondant remplit le critère A de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie avec symptômes de panique mais sans trouble de panique au cours de la vie. Le répondant remplit les critères d'agoraphobie au cours de la vie et craint de manifester des symptômes de type panique ou d'avoir une attaque de panique.

2	AGPBDAP = 2 ou (AGPBDPA2 = 2, SO)	Le répondant ne remplit pas le critère A de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie avec symptômes de panique mais sans trouble de panique au cours de la vie. Le répondant ne remplit pas les critères d'agoraphobie au cours de la vie ou ne craint pas de manifester des symptômes de type panique ou d'avoir une attaque de panique.
ND	AGPBDAP = ND ou AGPBDPA2 = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

11) Agoraphobie avec symptômes de panique mais sans trouble de panique au cours de la vie - critère B

Nom de la variable : AGPBDPB

Basée sur : PADBDPDS

Description : Le critère B est que les critères de trouble panique au cours de la vie n'ont jamais été remplis. Cette variable identifie les répondants qui ne remplissent pas les critères de trouble panique au cours de la vie.

Valeur de AGPBDPB	Condition(s)	Explication
1	PADBDPDS = 2	Le répondant remplit le critère B de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie avec symptômes de panique mais sans trouble de panique au cours de la vie. Le répondant ne remplit pas les critères de trouble panique au cours de la vie.
2	PADBDPDS = 1	Le répondant ne remplit pas le critère B de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie avec symptômes de panique mais sans trouble de panique au cours de la vie. Le répondant remplit les critères de trouble panique au cours de la vie.
ND	PADBDPDS = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul.

12) Algorithme pour l'agoraphobie avec symptômes de panique mais sans trouble de panique au cours de la vie

Nom de la variable : AGPBDAPP

Basée sur : AGPBDPA, AGPBDPB

Description : Cette variable indique si le répondant remplit les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie avec symptômes de panique mais sans trouble de panique au cours de la vie. Les répondants qui remplissent les critères déclarent :

1. remplir les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie au cours de la vie,
2. avoir peur de manifester des symptômes de type panique ou d'avoir une attaque de panique et
3. ne pas remplir les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour le trouble panique au cours de la vie.

Nota : Les répondants qui ne remplissent pas les critères incluent :

1. ceux qui ne remplissent pas les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie au cours de la vie,
2. ceux qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie au cours de la vie et de trouble panique au cours de la vie et
3. ceux qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie au cours de la vie, mais ne remplissent pas les critères pour le trouble panique au cours de la vie et n'ont pas peur de manifester des symptômes de type panique.

Valeur de AGPBDAPP	Condition(s)	Explication
1	AGPBDPA = 1 et AGPBDPB = 1	Le répondant remplit tous les critères d'un épisode d'agoraphobie avec symptômes de panique mais sans trouble de panique au cours de la vie. Le répondant a déclaré (1) remplir les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie au cours de la vie, (2) avoir peur de manifester des symptômes de type panique ou d'avoir une attaque de panique et (3) ne pas remplir les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour le trouble panique au cours de la vie.
2	AGPBDPA = 2 ou AGPBDPB = 2	Le répondant ne remplit pas tous les critères d'un épisode d'agoraphobie avec symptômes de panique mais sans trouble de panique au cours de la vie. Le répondant (1) ne remplit pas les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie au cours de la vie ou (2) ne craint pas de manifester des symptômes de type panique ou d'avoir une attaque de panique ou (3) remplit les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour le trouble panique au cours de la vie.
ND	AGPBDPA = ND ou AGPBDPB = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

13) Agoraphobie – âge au moment de l'apparition – Variable groupée

Nom de la variable : AGPBGON

Basée sur : AGPBDAP, AGPB_03A, AGPB_03B

Description : Cette variable indique l'âge qu'avait le répondant lorsqu'il a craint pour la première fois l'une des situations agoraphobiques. Cette variable est calculée uniquement pour les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie au cours de la vie.

Des enregistrements ont été regroupés par tranche d'âge afin d'assurer la confidentialité. Voir dictionnaire de données.

Valeur de AGPBGON	Condition(s)	Explication
SO	AGPBDAP = 2	Répondant qui ne remplit pas les critères d'agoraphobie au cours de la vie.
Valeur de AGPB_03A	AGPBDAP = 1 et AGPB_03A < SO	L'âge au moment de la manifestation est l'âge qu'avait le répondant lorsqu'il a éprouvé pour la première fois de l'anxiété liée à l'une des situations associées à l'agoraphobie.
Valeur de AGPB_03B	AGPBDAP = 1 et AGPB_03B < SO	L'âge au moment de la manifestation est l'âge qu'avait le répondant lorsqu'il a éprouvé pour la première fois de l'anxiété liée à l'une des situations associées à l'agoraphobie.
ND	AGPBDAP = ND ou (AGPB_03B = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

14) Agoraphobie – âge au moment de l'épisode le plus récent – Variable groupée

Nom de la variable : AGPBGREC

Basée sur : AGPBDAP, AGPB_17, AGPB_17B, DHHB_AGE

Description : Cette variable identifie l'âge du répondant la dernière fois qu'il a, de manière intense, eu peur ou évité les situations associées à l'agoraphobie. La valeur de cette variable n'est calculée que pour les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie au cours de la vie.

Des enregistrements ont été regroupés par tranche d'âge afin d'assurer la confidentialité. Voir dictionnaire de données.

Valeur de AGPBGREC	Condition(s)	Explication
SO	AGPBDAP = 2 ou AGPB_17 = SO	Répondant qui ne remplit pas les critères d'agoraphobie au cours de la vie ou répondant auquel on n'a pas posé la question AGPB_17.
DHHB_AGE	AGPBDAP = 1 et AGPB_17 = 1	L'âge au moment de l'épisode le plus récent est l'âge courant.
Valeur de AGPB_17B	AGPBDAP = 1 et (AGPB_17 = 2, NSP) et AGPB_17B < SO	L'âge au moment de l'épisode le plus récent est l'âge qu'avait le répondant la dernière fois qu'il a, de manière intense, eu peur ou évité l'une des situations associées à l'agoraphobie.
ND	AGPBDAP = ND ou (AGPB_17 = R, ND) ou (AGPB_17B = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

15) Agoraphobie – persistance – Variable groupée

Nom de la variable : AGPBGPER

Basée sur : AGPBDAP, AGPBG13A

Description : La persistance ne peut être calculée que pour les répondants qui ont déclaré avoir déjà été incapables de quitter leur maison pendant une journée entière à cause de leur peur. Cette variable indique la période la plus longue durant laquelle le répondant a été incapable de quitter sa maison. Sa valeur est calculée uniquement pour les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie au cours de la vie.

Des enregistrements ont été regroupés par tranche de durées afin d'assurer la confidentialité. Voir dictionnaire de données.

Valeur de AGPBGPER	Condition(s)	Explication
SO	AGPBDAP = 2 ou AGPBG13A = SO	Répondant qui ne remplit pas les critères d'agoraphobie ou répondant auquel on n'a pas posé les questions nécessaires pour le calcul.
Valeur de AGPBG13A	AGPBDAP = 1 et AGPBG13A < SO	Durée de la période la plus longue durant laquelle le répondant a été incapable de quitter sa maison.
ND	AGPBDAP = ND ou AGPBG13A = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

16) Agoraphobie avec symptômes de panique mais sans trouble de panique – âge au moment de l'apparition – Variable groupée

Nom de la variable : AGPBGONP

Basée sur : AGPBDAPP, AGPB_03A, AGPB_03B

Description : Cette variable indique l'âge du répondant lorsqu'il a eu peur pour la première fois d'une des situations agoraphobiques. La valeur de cette variable est calculée uniquement pour les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie avec symptômes de panique mais sans trouble de panique au cours de la vie.

Des enregistrements ont été regroupés par tranche d'âge afin d'assurer la confidentialité. Voir dictionnaire de données.

Valeur de AGPBGONP	Condition(s)	Explication
SO	AGPBDAPP = 2	Répondant ne remplit pas les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie avec symptômes de panique mais sans trouble de panique au cours de la vie.
Valeur de AGPB_03A	AGPBDAPP = 1 et AGPB_03A < SO	L'âge de l'apparition est l'âge qu'avait le répondant lorsqu'il a eu peur pour la première fois d'une des situations associées à l'agoraphobie.
Valeur de AGPB_03B	AGPBDAPP = 1 et AGPB_03B < SO	L'âge de l'apparition est l'âge qu'avait le répondant lorsqu'il a eu peur pour la première fois d'une des situations associées à l'agoraphobie.

ND	AGPBDAPP = ND ou (AGPB_03B = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
----	---	---

17) Agoraphobie avec symptômes de panique mais sans trouble de panique – âge au moment de l'épisode le plus récent – Variable groupée

Nom de la variable : AGPBGRCP

Basée sur : AGPBDAPP, AGPB_17, AGPB_17B, DHHB_AGE

Description : Cette variable indique l'âge qu'avait le répondant la dernière fois qu'il a, de manière intense, eu peur ou évité les situations associées à l'agoraphobie. La valeur de cette variable est calculée uniquement pour les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie avec symptômes de panique mais sans trouble de panique au cours de la vie.

Des enregistrements ont été regroupés par tranche d'âge afin d'assurer la confidentialité. Voir dictionnaire de données.

Valeur de AGPBGRCP	Condition(s)	Explication
SO	AGPBDAPP = 2 ou AGPB_17 = SO	Répondant qui ne remplit pas les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie avec symptômes de panique mais sans trouble de panique à vie ou répondant auquel on n'a pas posé la question AGPB_17.
DHHB_AGE	AGPBDAPP = 1 et AGPB_17 = 1	L'âge au moment de l'épisode le plus récent est l'âge courant.
Valeur de AGPB_17B	AGPBDAPP = 1 et (AGPB_17 = 2, NSP) et AGPB_17B < SO	L'âge au moment de l'épisode le plus récent est l'âge qu'avait le répondant la dernière fois qu'il a, de manière intense, eu peur ou évité l'une des situations associées à l'agoraphobie.
ND	AGPBDAPP = ND ou (AGPB_17 = R, ND) ou (AGPB_17B = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

18) Agoraphobie avec symptômes de panique mais sans trouble de panique – persistance – Variable groupée

Nom de la variable : AGPBGRPR

Basée sur : AGPBDAPP, AGPB13A

Description : La persistance ne peut être calculée que pour les répondants qui ont déclaré avoir déjà été incapables de quitter leur maison pendant une journée entière à cause de leur peur. Cette variable indique la période la plus longue durant laquelle le répondant a été incapable de quitter sa maison. Sa valeur est calculée uniquement pour les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie avec symptômes de panique mais sans trouble de panique au cours de la vie.

Des enregistrements ont été regroupés par tranche de durées afin d'assurer la confidentialité. Voir dictionnaire de données.

Valeur de AGPBGPRP	Condition(s)	Explication
SO	AGPBDAPP = 2 ou AGPBG13A = SO	Répondant qui ne remplit pas les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie avec symptômes de panique mais sans trouble de panique à vie ou répondant auquel on n'a pas posé les questions nécessaires pour le calcul.
Valeur de AGPBG13A	AGPBDAPP = 1 et AGPBG13A < SO	Durée de la période la plus longue durant laquelle le répondant a été incapable de quitter sa maison en années.
ND	AGPBDAPP = ND ou AGPBG13A = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

Agoraphobie – Au cours des 12 derniers mois

19) Algorithme pour l'agoraphobie au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : AGPBDPY

Basée sur : AGPBDAP, AGPB_17, AGPB_03A, AGPB_03B, AGPB_06, AGPB_17B, DHHB_AGE

Description : Il s'agit de la variable finale qui indique si le répondant remplit ou non les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview. Les répondants qui remplissent les critères déclarent :

1. remplir les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie au cours de la vie et
2. avoir eu peur ou évité les situations agoraphobiques au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.

Valeur de AGPBDPY	Condition(s)	Explication
1	AGPBDAP = 1 et (AGPB_17 = 1 ou AGPB_03A = DHHB_AGE ou AGPB_03B = DHHB_AGE ou AGPB_06 = DHHB_AGE ou AGPB_17B = DHHB_AGE)	Le répondant remplit tous les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie au cours des 12 derniers mois. Le répondant a déclaré remplir les critères d'agoraphobie au cours de la vie et avoir eu peur ou évité les situations agoraphobiques au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.
2	AGPBDAP = 2 ou (AGPB_17 = 2, SO et AGPB_03A <= SO et AGPB_03B <= SO et AGPB_06 <= SO et AGPB_17B <= SO)	Le répondant ne remplit pas les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie au cours des 12 derniers mois. Le répondant ne remplit pas les critères d'agoraphobie au cours de la vie ou n'a pas déclaré avoir eu peur ou évité les situations agoraphobiques au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.
ND	AGPBDAP = ND ou (AGPB_17 = NSP, R, ND) ou (AGPB_03A = NSP, R, ND) ou (AGPB_03B = NSP, R, ND) ou (AGPB_06 = NSP, R, ND) ou (AGPB_17B = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

20) Algorithme pour l'agoraphobie avec symptômes de panique mais sans trouble de panique au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : AGPBDPYP

Basée sur : AGPBDAPP, AGPB_17, AGPB_03A, AGPB_03B, AGPB_06, AGPB_17B, DHHB_AGE

Description : Il s'agit de la variable finale qui indique si le répondant remplit ou non les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie avec symptômes de panique mais sans trouble de panique au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview. Les répondants qui remplissent les critères déclarent :

1. remplir les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie avec symptômes de panique mais sans trouble de panique au cours de la vie et
2. avoir eu peur ou évité les situations agoraphobiques au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.

Valeur de AGPBDPYP	Condition(s)	Explication
1	AGPBDAPP = 1 et (AGPB_17 = 1 ou AGPB_03A = DHHB_AGE ou AGPB_03B = DHHB_AGE ou AGPB_06 = DHHB_AGE ou AGPB_17B = DHHB_AGE)	Le répondant remplit tous les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie avec symptômes de panique mais sans trouble de panique au cours des 12 derniers mois. Le répondant a déclaré remplir les critères d'agoraphobie avec symptômes de panique mais sans trouble de panique au cours de la vie et avoir eu peur ou évité les situations agoraphobiques au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.
2	AGPBDAPP = 2 ou (AGPB_17 = 2, SO et AGPB_03A <= SO et AGPB_03B <= SO et AGPB_06 <= SO et AGPB_17B <= SO)	Le répondant ne remplit pas les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie avec symptômes de panique mais sans trouble de panique au cours des 12 derniers mois. Le répondant ne remplit pas les critères d'agoraphobie avec symptômes de panique mais sans trouble de panique au cours de la vie ou n'a pas eu peur ou évité les situations agoraphobiques au cours des 12 mois qui ont précédé l'interview.
ND	AGPBDAPP = ND ou (AGPB_17 = NSP, R, ND) ou (AGPB_03A = NSP, R, ND) ou (AGPB_03B = NSP, R, ND) ou (AGPB_06 = NSP, R, ND) ou (AGPB_17B = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

21) Trouble attribuable à l'agoraphobie – moyenne

Nom de la variable : AGPBDINT

Basée sur : AGPB_20A, AGPB_201, AGPB_202, AGPB_20C, AGPB_20D, AGPBDPY

Description : Cette variable décrit le trouble que l'agoraphobie a entraînée sur les activités et les responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s'agit d'une moyenne des cinq items. Cette variable n'est calculée que pour les répondants qui remplissent les critères d'agoraphobie au cours des 12 derniers mois.

Nota : Les répondants qui ont répondu que s'ils devaient faire face aujourd'hui à la même situation qui a provoqué l'agoraphobie, ils auraient moins peur ou aucune peur, n'ont pas eu à répondre aux questions sur la perturbation.

Valeur de AGPBDINT	Condition(s)	Explication
SO	AGPBDPY = 2	Le répondant ne remplissait pas les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie au cours des 12 derniers mois.
ND	AGPB_20A = ND et AGPB_201 = ND et AGPB_202 = ND et AGPB_20C = ND et AGPB_20D = ND	Les questions concernant la perturbation n'ont pas été posées au répondant parce qu'ils ont répondu que s'ils devaient faire face aujourd'hui à la même situation qui a provoqué l'agoraphobie, ils auraient moins peur ou aucune peur.
ND	AGPBDPY = ND ou (AGPB_20A = NSP, R, ND) ou (AGPB_201 = NSP, R, ND) ou (AGPB_202 = NSP, R, ND) ou (AGPB_20C = NSP, R, ND) ou (AGPB_20D = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
$(AGPB_20A + AGPB_201 + AGPB_202 + AGPB_20C + AGPB_20D) / 5$ (min : 0.0; max : 10.0) (arrondir à .1)	AGPBDPY = 1 et $0 \leq AGPB_201 \leq 10$ et $0 \leq AGPB_202 \leq 10$ et $0 \leq AGPB_20A \leq 10$ et $0 \leq AGPB_20C \leq 10$ et $0 \leq AGPB_20D \leq 10$	Trouble = moyenne des cinq items. Le répondant a répondu aux cinq questions.
$(AGPB_20A + AGPB_202 + AGPB_20C + AGPB_20D) / 4$ (min : 0.0; max : 10.0) (arrondir à .1)	AGPBDPY = 1 et AGPB_201 = 11 et $0 \leq AGPB_202 \leq 10$ et $0 \leq AGPB_20A \leq 10$ et $0 \leq AGPB_20C \leq 10$ et $0 \leq AGPB_20D \leq 10$	Trouble = moyenne de quatre items qui s'appliquaient au répondant. AGPB_201 ne s'appliquait pas (c.-à-d. que le répondant n'a pas fréquenté l'école au cours des 12 derniers mois).
$(AGPB_20A + AGPB_201 + AGPB_20C + AGPB_20D) / 4$ (min : 0.0; max : 10.0) (arrondir à .1)	AGPBDPY = 1 et $0 \leq AGPB_201 \leq 10$ et AGPB_202 = 11 et $0 \leq AGPB_20A \leq 10$ et $0 \leq AGPB_20C \leq 10$ et $0 \leq AGPB_20D \leq 10$	Trouble = moyenne de quatre items qui s'appliquaient au répondant. AGPB_202 ne s'appliquait pas (c.-à-d. que le répondant n'a pas travaillé au cours des 12 derniers mois).

(AGPB_20A + AGPB_20C + AGPB_20D) / 3 (min : 0.0; max : 10.0) (arrondir à .1)	AGPBDPY = 1 et AGPB_201 = 11 et AGPB_202 = 11 et 0 <= AGPB_20A <= 10 et 0 <= AGPB_20C <= 10 et 0 <= AGPB_20D <= 10	Trouble = moyenne de trois items qui s'appliquaient au répondant. AGPB_201 et AGPB_202 ne s'appliquaient pas (c.-à-d. que le répondant n'a pas fréquenté l'école et n'a pas travaillé au cours des 12 derniers mois).
--	---	--

22) Indicateur du trouble attribuable à l'agoraphobie

Nom de la variable : AGPBFINT

Basée sur : AGPB_20A, AGPB_201, AGPB_202, AGPB_20C, AGPB_20D, AGPBDPY

Description : Cette variable décrit le trouble que l'agoraphobie a entraîné sur les activités et les responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s'agit d'une classification indiquant si l'agoraphobie perturbe de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires) ou les activités sociales ou les relations personnelles.

Cette variable n'est calculée que pour les répondants qui remplissent les critères d'agoraphobie au cours des 12 derniers mois.

Nota : Les répondants qui ont répondu que s'ils devaient faire face aujourd'hui à la même situation qui a provoqué l'agoraphobie, ils auraient moins peur ou aucune peur, n'ont pas eu à répondre aux questions sur la perturbation.

Valeur de AGPBFINT	Condition(s)	Explication
SO	AGPBDPY = 2	Le répondant ne remplissait pas les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI pour l'agoraphobie au cours des 12 derniers mois.
ND	AGPB_20A = SO et AGPB_201 = SO et AGPB_202 = SO et AGPB_20C = SO et AGPB_20D = SO	Les questions concernant la perturbation n'ont pas été posées au répondant parce qu'ils ont répondu que s'ils devaient faire face aujourd'hui à la même situation qui a provoqué l'agoraphobie, ils auraient moins peur ou aucune peur.
1	AGPBDPY = 1 et (4 <= AGPB_20A <= 10 ou 4 <= AGPB_201 <= 10 ou 4 <= AGPB_202 <= 10 ou 4 <= AGPB_20C <= 10 ou 4 <= AGPB_20D <= 10)	L'agoraphobie a perturbé de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires) ou les activités sociales ou les relations au cours des 12 derniers mois.
2	AGPBDPY = 1 et 0 <= AGPB_20A <= 3 et (0 <= AGPB_201 <= 3 ou AGPB_201 = 11) et (0 <= AGPB_202 <= 3 ou AGPB_202 = 11) et 0 <= AGPB_20C <= 3 et 0 <= AGPB_20D <= 3	L'agoraphobie n'a pas perturbé de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires) ou les activités sociales ou les relations au cours des 12 derniers mois.
ND	AGPBDPY = ND ou (AGPB_20A = NSP, R, ND) ou (AGPB_201 = NSP, R, ND) ou (AGPB_202 = NSP, R, ND) ou (AGPB_20C = NSP, R, ND) ou (AGPB_20D = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul ou le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

Profils de santé mentale (9 VD)

Le DSM réfère au « Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders » utilisé par « l'American Psychiatric Association. » Il s'agit d'une classification des troubles mentaux internationalement reconnue qui existe en plusieurs versions. Les troubles ou problèmes mentaux que l'on trouve dans l'ESCC 1.2 ont été partiellement opérationnalisés selon les définitions et la classification du DSM-IV ou du DSM-III-R. Les variables dérivées de cette section ne font pas elles-mêmes partie du système de classification du DSM. Ce sont cependant des indicateurs sommaires dont les variables constitutives sont codées suivant les normes de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI.

Pour les besoins de documentation, le mot «trouble(s)» tel qu'il apparaît à cette section peut faire référence à un trouble, un épisode, un état, ou un problème.

1) Diagnostic au cours de la vie – n'importe quel trouble

Nom de la variable : MHPBFL

Basée sur : AGPBDAP, DEPBDDPS, MIABDEPS, PADBDPDS, SOPBDSP

Description : Cette variable indique si le répondant remplit les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI concernant n'importe quel trouble retenu au cours de la vie.

Note: Cette variable n'est pas comparable à «Diagnostic au cours des 12 mois précédents – n'importe quel trouble ou n'importe quelle dépendance à une substance retenus» (MHPBFY) puisqu'elle n'inclut pas la dépendance à l'alcool ou aux drogues.

Valeur de MHPBFL	Condition(s)	Explication
1	AGPBDAP = 1 ou DEPBDDPS = 1 ou MIABDEPS = 1 ou PADBDPDS = 1 ou SOPBDSP = 1	Le répondant remplit les critères d'au moins un trouble énuméré au cours de sa vie.
2	AGPBDAP = 2 et DEPBDDPS = 2 et MIABDEPS = 2 et PADBDPDS = 2 et SOPBDSP = 2 et	Le répondant ne remplit aucun des critères des troubles énumérés au cours de sa vie.
ND	AGPBDAP = ND ou DEPBDDPS = ND ou MIABDEPS = ND ou PADBDPDS = ND ou SOPBDSP = ND ou	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

2) Diagnostic au cours de la vie – n'importe quel trouble de l'humeur

Nom de la variable : MHPBFLM

Basée sur : DEPBDDPS, MIABDEPS

Description : Cette variable indique si le répondant remplit les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI concernant l'un ou l'autre des troubles de l'humeur mesurés (épisode dépressif majeur, épisode de manie) au cours de la vie.

Valeur de MHPBFLM	Condition(s)	Explication
1	DEPBDDPS = 1 ou MIABDEPS = 1	Le répondant remplit les critères d'au moins un trouble de l'humeur énuméré au cours de sa vie.
2	DEPBDDPS = 2 et MIABDEPS = 2	Le répondant ne remplit aucun des critères des troubles énumérés au cours de sa vie.

ND	DEPBDDPS = ND ou MIABDEPS = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.
----	-----------------------------------	---

3) Diagnostic au cours de la vie – n'importe quel trouble anxieux

Nom de la variable : MHPBFLA

Basée sur : AGPBDAP, PADBDPDS, SOPBDSP

Description : Cette variable indique si le répondant remplit les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI concernant l'un ou l'autre des troubles anxieux mesurés au cours de la vie (agoraphobie, trouble panique, phobie sociale).

Valeur de MHPBFLA	Condition(s)	Explication
1	AGPBDAP = 1 ou PADBDPDS = 1 ou SOPBDSP = 1	Le répondant remplit les critères d'au moins un trouble anxieux énuméré au cours de sa vie.
2	AGPBDAP = 2 et PADBDPDS = 2 et SOPBDSP = 2	Le répondant ne remplit aucun des critères des troubles anxieux énumérés au cours de sa vie.
ND	AGPBDAP = ND ou PADBDPDS = ND ou SOPBDSP = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

4) Diagnostic au cours des 12 mois précédents – n'importe quel trouble ou n'importe quelle dépendance à une substance retenus

Nom de la variable : MHPBFY

Basée sur : AGPBDPY, DEPBDDY, MIABDEY, PADBDDY, SOPBDPY, ALDBDSF, IDGBFYDP

Description : Cette variable indique si le répondant remplit les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI concernant n'importe quel trouble ou n'importe quelle dépendance à une substance mesurés au cours des 12 derniers mois.

Valeur de MHPBFY	Condition(s)	Explication
1	AGPBDPY = 1 ou DEPBDDY = 1 ou MIABDEY = 1 ou PADBDDY = 1 ou SOPBDPY = 1 ou 3 <= ALDBDSF < SO ou IDGBFYDP = 1	Le répondant remplit les critères d'au moins un trouble ou d'une dépendance énumérés au cours des 12 derniers mois.
2	AGPBDPY = 2 et DEPBDDY = 2 et MIABDEY = 2 et PADBDDY = 2 et SOPBDPY = 2 et ALDBDSF < 3 et IDGBFYDP = 2	Le répondant ne remplit aucun des critères des troubles ou des dépendances énumérés au cours des 12 derniers mois.
ND	AGPBDPY = ND ou DEPBDDY = ND ou MIABDEY = ND ou PADBDDY = ND ou SOPBDPY = ND ou ALDBDSF = ND ou IDGBFYDP = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

5) Diagnostic au cours des 12 mois précédents – n'importe quel trouble de l'humeur

Nom de la variable : MHPBFYM

Basée sur : DEPBDDY, MIABDEY

Description : Cette variable indique si le répondant remplit les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI concernant l'un ou l'autre des troubles de l'humeur mesurés au cours des 12 derniers mois (épisode dépressif majeur, épisode maniaque).

Valeur de MHPBFYM	Condition(s)	Explication
1	DEPBDDY = 1 ou MIABDEY = 1	Le répondant remplit les critères d'au moins un trouble de l'humeur énuméré au cours des 12 derniers mois.
2	DEPBDDY = 2 et MIABDEY = 2	Le répondant ne remplit aucun des critères des troubles de l'humeur énumérés au cours des 12 derniers mois.
ND	DEPBDDY = ND ou MIABDEY = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

6) Diagnostic au cours des 12 mois précédents – n'importe quel trouble anxieux

Nom de la variable : MHPBFYA

Basée sur : AGPBDPY, PADBDDY, SOPBDPY

Description : Cette variable indique si le répondant remplit les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI concernant l'un ou l'autre des troubles anxieux mesurés au cours des 12 derniers mois (agoraphobie, trouble panique, phobie sociale).

Valeur de MHPBFYA	Condition(s)	Explication
1	AGPBDPY = 1 ou PADBDDY = 1 ou SOPBDPY = 1	Le répondant remplit les critères d'au moins un trouble anxieux énuméré au cours des 12 derniers mois.
2	AGPBDPY = 2 et PADBDDY = 2 et SOPBDPY = 2	Le répondant ne remplit aucun des critères des troubles anxieux énumérés au cours des 12 derniers mois.
ND	AGPBDPY = ND ou PADBDDY = ND ou SOPBDPY = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

7) Diagnostic au cours des 12 mois précédents – n'importe quelle dépendance à une substance

Nom de la variable : MHPBFYSA

Basée sur : ALDBDSF, IDGBFYDP

Description : Cette variable indique si le répondant remplit les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de dépendance à l'alcool ou à des drogues illicites au cours des 12 derniers mois.

Valeur de MHPBFYSA	Condition(s)	Explication
1	$3 \leq \text{ALDBDSF} < \text{SO}$ ou $\text{IDGBFYDP} = 1$	Le répondant remplit les critères d'au moins une dépendance énumérée au cours des 12 derniers mois.
2	$\text{ALDBDSF} < 3$ et $\text{IDGBFYDP} = 2$	Le répondant ne remplit aucun des critères des dépendances énumérées au cours des 12 derniers mois.
ND	$\text{ALDBDSF} = \text{ND}$ ou $\text{IDGBFYDP} = \text{ND}$	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

8) Indicateur de la perturbation attribuable à n'importe quel trouble ou n'importe quelle dépendance à une substance au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : MHPBFINT

Basée sur : MIABFINT, DEPBFINF, PADBFINT, SOPBFINT, AGPBFINT, ALDBFINT, IDGBFINT, MHPBFY

Description : Cette variable décrit la perturbation que n'importe quel trouble ou n'importe quelle dépendance mesurés a entraînée sur les activités et les responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Elle n'est calculée que pour les répondants qui remplissent les critères de l'ESCC 1.2/WMH-CIDI de n'importe quel trouble au cours des 12 derniers mois.

Valeur de MHPBFINT	Condition(s)	Explication
SO	$\text{MHPBFY} = 2$	Le répondant ne remplit aucun des critères des troubles au cours des 12 derniers mois.
1	$\text{DEPBFINF} = 1$ ou $\text{MIABFINF} = 1$ ou $\text{PADBFINT} = 1$ ou $\text{SOPBFINT} = 1$ ou $\text{AGPBFINT} = 1$ ou $\text{ALDBFINT} = 1$ ou $\text{IDGBFINT} = 1$	Au moins un trouble a perturbé de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires) ou les activités sociales ou les relations avec autrui au cours des 12 derniers mois.
2	$(\text{DEPBFINF} = 2, \text{SO})$ et $(\text{MIABFINF} = 2, \text{SO})$ et $(\text{PADBFINT} = 2, \text{SO})$ et $(\text{SOPBFINT} = 2, \text{SO})$ et $(\text{AGPBFINT} = 2, \text{SO})$ et $(\text{ALDBFINT} = 2, \text{SO})$ et $(\text{IDGBFINT} = 2, \text{SO})$	Il n'y a pas eu de perturbation importante des habitudes, des activités professionnelles (scolaires) ou des activités sociales ou des relations avec autrui au cours des 12 derniers mois.
ND	$(\text{DEPBFINF} = \text{ND})$ ou $\text{MIABFINF} = \text{ND}$ ou $\text{PADBFINT} = \text{ND}$ ou $\text{SOPBFINT} = \text{ND}$ ou $\text{AGPBFINT} = \text{ND}$ ou $\text{ALDBFINT} = \text{ND}$ ou $\text{IDGBFINT} = \text{ND})$ ou $\text{MHPBFY} = \text{ND}$	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

9) Âge au moment de la première manifestation – n'importe quel trouble retenu - Variable groupée

Nom de la variable : MHPBGAON

Basée sur : MHPBFLM, MHPBFLA, AGPBDON, DEPBON, MIABDON, PADBDON, SOPBDON

Description : Cette variable indique l'âge du répondant au moment de la première manifestation du trouble, chez les répondants qui remplissent les critères de n'importe quel trouble de l'humeur ou trouble anxieux au cours de la vie. Elle n'est calculée que pour les répondants qui remplissent les critères d'au moins un trouble au cours de la vie, à l'exclusion de la dépendance à une substance.

Des enregistrements ont été regroupés par groupes d'âge afin d'assurer la confidentialité. Voir dictionnaire de données.

Valeur de MHPBGAON	Condition(s)	Explication
SO	(MHPBFLM = 2 et MHPBFLA = 2) ou (AGPBDON = SO et DEPBON = SO et MIABDON = SO et PADBDON = SO et SOPBDON = SO)	Le répondant ne remplit aucun des critères des troubles mesurés au cours de la vie.
Minimum de (AGPBDON, DEPBON, MIABDON, PADBDON, SOPBDON) (min : 0; max : âge actuel)	(MHPBFLM = 1 ou MHPBFLA = 1) et Au moins un de (AGPBDON, DEPBON, MIABDON, PADBDON, SOPBDON) <= 130	L'âge au moment du premier épisode est calculé pour les répondants qui ont au moins un âge valide de manifestation.
ND	MHPBFLM = ND ou MHPBFLA = ND ou AGPBDON = ND ou DEPBON = ND ou MIABDON = ND ou PADBDON = ND ou SOPBDON = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.

Consommation d'alcool (3 VD)

Ces variables examinent la fréquence, la régularité et l'ampleur de la consommation d'alcool.

1) Genre de buveur

Nom de la variable : ALCBDTYP

Basée sur : ALCB_2, ALCB_5B

Description : Cette variable détermine le genre de buveur du répondant en fonction de ses habitudes de consommation.

Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991)

Site Web de Statistique Canada : www.statcan.ca/francais/sdds/3894_F.htm

Valeur de ALCBDTYP	Condition(s)	Explication
ND	(ALCB_2 = NSP, R, ND) ou (ALCB_5B = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
1	$1 < \text{ALCB_2} < \text{SO}$	Buveur régulier
2	$\text{ALCB_2} = 1$	Buveur occasionnel
3	$\text{ALCB_5B} = 1$	Ancien buveur
4	$\text{ALCB_5B} = 2$	N'a jamais bu

2) Consommation hebdomadaire

Nom de la variable : ALCBDWKY

Basée sur : ALCB_1, ALCB_5A1, ALCB_5A2, ALCB_5A3, ALCB_5A4, ALCB_5A5, ALCB_5A6, ALCB_5A7

Description : Cette variable indique la somme des consommations que le répondant a pris tous les jours, au cours de la semaine précédant l'interview. La variable dérivée est calculée uniquement pour les répondants qui ont pris au moins une consommation au cours des 12 derniers mois.

Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991)

Site Web de Statistique Canada : www.statcan.ca/francais/sdds/3894_F.htm

Valeur de ALCBDWKY	Condition(s)	Explication
SO	$\text{ALCB_1} = 2$	Le répondant n'a pas pris de consommation au cours de la dernière année.
0	$\text{ALCB_5A1} = \text{SO}$	Le répondant n'a pas pris de consommation la semaine dernière.
ND	(ALCB_5A1 = NSP, R, ND) ou (ALCB_5A2 = NSP, R, ND) ou (ALCB_5A3 = NSP, R, ND) ou (ALCB_5A4 = NSP, R, ND) ou (ALCB_5A5 = NSP, R, ND) ou (ALCB_5A6 = NSP, R, ND) ou (ALCB_5A7 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
(ALCB_5A1 + ALCB_5A2 + ALCB_5A3 + ALCB_5A4 + ALCB_5A5 + ALCB_5A6 + ALCB_5A7) (min : 0; max : 693)	$0 \leq \text{ALCB_5A1} < 100$ et $0 \leq \text{ALCB_5A2} < 100$ et $0 \leq \text{ALCB_5A3} < 100$ et $0 \leq \text{ALCB_5A4} < 100$ et $0 \leq \text{ALCB_5A5} < 100$ et $0 \leq \text{ALCB_5A6} < 100$ et $0 \leq \text{ALCB_5A7} < 100$	Le répondant a consommé de l'alcool la semaine dernière.

3) Moyenne quotidienne des consommations d'alcool - Variable groupée

Nom de la variable : ALCBGDLY

Basée sur : ALCBDWKY

Description : Cette variable représente le nombre moyen de consommations du répondant par jour. On la calcule en prenant le total des consommations hebdomadaires que l'on divise par sept. La variable dérivée n'est calculée que pour les répondants qui avaient pris au moins une consommation au cours des 12 derniers mois. Les enregistrements pour lesquels le nombre moyen était égal ou supérieur à 12 verres par jour ont été regroupés.

Source: Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991)

Site Web de Statistique Canada : www.statcan.ca/francais/sdds/3894_F.htm

Valeur de ALCBGDLY	Condition(s)	Explication
ND	ALCBDWKY = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul.
SO	ALCBDWKY = SO	Sans objet
ALCBDWKY / 7 (min : 0; max : 99) (arrondir au nombre entier)	ALCBDWKY < 694	Moyenne quotidienne des consommations d'alcool

Dépendance à l'alcool/Abus d'alcool (4 VD)

L'ESCC comprend la gamme complète des questions élaborées par Kessler et Mroczek pour produire la mesure de la dépendance à l'égard de l'alcool. Lors du cycle 1.2 de l'ESCC, les répondants qui ont dit avoir consommé au moins cinq verres à une même occasion au moins une fois par mois au cours des 12 derniers mois et ceux qui ont fait la même déclaration pour une autre période de 12 mois au cours de leur vie ont répondu aux questions sur la dépendance à l'alcool.

Note: Il n'y a pas de variable pour la dépendance à l'alcool au cours de la vie ou pour la variable se rapportant à la probabilité prévue d'une dépendance à l'alcool au cours de la vie. Une erreur dans les instructions "passez à" du questionnaire a fait en sorte que les symptômes au cours de la vie des répondants qui ont aussi répondu aux questions sur la dépendance au cours des 12 derniers mois n'ont pas bien été évalués. Spécifiquement, si un répondant disait "oui" aux symptômes pour les 12 derniers mois, on ne lui demandait pas si il en avait fait l'expérience auparavant. Ainsi, ces répondants ont des réponses au cours de la vie seulement pour les questions au cours des 12 derniers mois auxquelles ils ont répondu "non".

Reformatages temporaires

Reformatage	Explication
Si (ALDB_01 = 1, 2) alors ALDRQ01 = (2 - ALDB_01) Si (ALDB_01L = 1, 2) alors ALDRQ01L = (2 - ALDB_01L) Si (ALDB_01A = 1, 2) alors ALDRQ01A = (2 - ALDB_01A) Si (ALDB_03 = 1, 2) alors ALDRQ03 = (2 - ALDB_03) Si (ALDB_03L = 1, 2) alors ALDRQ03L = (2 - ALDB_03L) Si (ALDB_03A = 1, 2) alors ALDRQ03A = (2 - ALDB_03A) Si (ALDB_04 = 1, 2) alors ALDRQ04 = (2 - ALDB_04) Si (ALDB_04L = 1, 2) alors ALDRQ04L = (2 - ALDB_04L) Si (ALDB_04A = 1, 2) alors ALDRQ04A = (2 - ALDB_04A) Si (ALDB_05 = 1, 2) alors ALDRQ05 = (2 - ALDB_05) Si (ALDB_05L = 1, 2) alors ALDRQ05L = (2 - ALDB_05L) Si (ALDB_05A = 1, 2) alors ALDRQ05A = (2 - ALDB_05A) Si (ALDB_06 = 1, 2) alors ALDRQ06 = (2 - ALDB_06) Si (ALDB_06L = 1, 2) alors ALDRQ06L = (2 - ALDB_06L) Si (ALDB_06A = 1, 2) alors ALDRQ06A = (2 - ALDB_06A) Si (ALDB_07 = 1, 2) alors ALDRQ07 = (2 - ALDB_07) Si (ALDB_07L = 1, 2) alors ALDRQ07L = (2 - ALDB_07L) Si (ALDB_07A = 1, 2) alors ALDRQ07A = (2 - ALDB_07A) Si (ALDB_09 = 1, 2) alors ALDRQ09 = (2 - ALDB_09) Si (ALDB_09L = 1, 2) alors ALDRQ09L = (2 - ALDB_09L) Si (ALDB_09A = 1, 2) alors ALDRQ09A = (2 - ALDB_09A) Si (ALDB_10 = 1, 2) alors ALDRQ10 = (2 - ALDB_10) Si (ALDB_10L = 1, 2) alors ALDRQ10L = (2 - ALDB_10L) Si (ALDB_10A = 1, 2) alors ALDRQ10A = (2 - ALDB_10A) Si (ALDB_11 = 1, 2) alors ALDRQ11 = (2 - ALDB_11) Si (ALDB_11L = 1, 2) alors ALDRQ11L = (2 - ALDB_11L) Si (ALDB_11A = 1, 2) alors ALDRQ11A = (2 - ALDB_11A) Si (ALDB_12 = 1, 2) alors ALDRQ12 = (2 - ALDB_12) Si (ALDB_12L = 1, 2) alors ALDRQ12L = (2 - ALDB_12L) Si (ALDB_12A = 1, 2) alors ALDRQ12A = (2 - ALDB_12A) Si (ALDB_13 = 1, 2) alors ALDRQ13 = (2 - ALDB_13) Si (ALDB_13L = 1, 2) alors ALDRQ13L = (2 - ALDB_13L) Si (ALDB_13A = 1, 2) alors ALDRQ13A = (2 - ALDB_13A) Si (ALDB_14 = 1, 2) alors ALDRQ14 = (2 - ALDB_14) Si (ALDB_14L = 1, 2) alors ALDRQ14L = (2 - ALDB_14L) Si (ALDB_14A = 1, 2) alors ALDRQ14A = (2 - ALDB_14A)	Modifier l'échelle et inverser les réponses aux questions ALDB_01 à ALDB_09A (sauf ALDB_02 et ALDB_08) de 1 et 2 à 1 et 0 respectivement pour toutes les questions avec catégories de réponses valides (c.-à-d. ancien code 2 'Non' devient 0 'Non', et 1 'Oui' demeure le même).

1) Échelle de dépendance à l'alcool (cote du questionnaire abrégé) – 12 mois

Nom de la variable : ALDBDSF

Basée sur : ALDB_01, ALDB_03, ALDB_04, ALDB_05, ALDB_06, ALDB_07, ALDB_09

Description : Cette variable a été recueillie pour mesurer la dépendance à l'alcool du répondant au cours des 12 mois précédant l'interview. La dépendance à l'alcool se rapporte à la tolérance, l'état de manque ou la perte de contrôle ou à des problèmes sociaux ou physiques liés à la consommation d'alcool. Les questions posées pour évaluer la dépendance à l'alcool se fondent sur les travaux de Kessler et Mroczek (de l'Université du Michigan). L'indice est fondé sur un sous-ensemble de questions tirées de la Composite International Diagnostic Interview (CIDI). La CIDI est un instrument diagnostique structuré qui a été conçu pour produire des diagnostics conformément à une opérationnalisation partielle des définitions et des critères de diagnostics du trouble d'utilisation des substances psychoactives du DSM-III-R.

Source : Kessler R.C., G. Andrews, D. Mroczek et al. « The World Health Organisation Composite Diagnostic Interview Short-Form », Psychological Medicine.

Valeur de ALDBDSF	Condition(s)	Explication
0	ALDB_01 = SO	Le répondant n'avait pas bu suffisamment au cours des 12 derniers mois pour répondre aux questions sur la dépendance à l'alcool pour cette période particulière.
ND	(ALDB_01 = NSP, R, ND) ou (ALDB_03 = NSP, R, ND) ou (ALDB_04 = NSP, R, ND) ou (ALDB_05 = NSP, R, ND) ou (ALDB_06 = NSP, R, ND) ou (ALDB_07 = NSP, R, ND) ou (ALDB_09 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
ALDRQ01 + ALDRQ03 + ALDRQ04 + ALDRQ05 + ALDRQ06 + ALDRQ07 + ALDRQ09 (min : 0; max : 7)	(ALDRQ01 = 0, 1) et (ALDRQ03 = 0, 1) et (ALDRQ04 = 0, 1) et (ALDRQ05 = 0, 1) et (ALDRQ06 = 0, 1) et (ALDRQ07 = 0, 1) et (ALDRQ09 = 0, 1)	Le répondant a répondu oui ou non aux questions requises pour le calcul.

2) Probabilité prévue pour les répondants (dépendance à l'alcool) – 12 mois

Nom de la variable : ALDBDPP

Basée sur : ALDBDSF

Description : La probabilité prévue de la dépendance à l'alcool des répondants a été attribuée d'après la cote calculée pour le questionnaire abrégé. La mesure de la dépendance à l'alcool du questionnaire abrégé vise à produire une mesure fondée sur l'opérationnalisation partielle du critère A et du critère B du diagnostic du trouble d'utilisation de substances psychoactives du DSM-III-R. On a attribué une probabilité nulle aux personnes qui ont répondu non aux questions filtres. La règle optimale de classification dichotomique consiste à définir toutes les personnes qui obtiennent une cote égale ou supérieure à trois pour le questionnaire abrégé comme étant des cas probables et celles qui obtiennent une cote comprise entre zéro et deux comme n'étant probablement pas des cas de dépendance à l'alcool.

D'après des renseignements tirés du National Comorbidity Survey (États-Unis), on a procédé à la classification croisée des cotes obtenues sur l'échelle de dépistage et des désignations de cas de dépendance à l'alcool fondées sur le programme diagnostique informatisé de la CIDI.

Valeur de ALDBDPP	Condition(s)	Explication
SO	ALDBDSF = SO	Transformation des valeurs calculées dans ALDBDSF
ND	ALDBDSF = ND	
0.00	ALDBDSF = 0	
0.05	ALDBDSF = 1	
0.40	ALDBDSF = 2	
0.85	ALDBDSF = 3	
1.00	3 < ALDBDSF < SO	

3) Trouble causé par l'alcool au cours des 12 derniers mois – Moyenne

Nom de la variable : ALDBDINT

Basée sur : ALDB_15A, ALDB_5B1, ALDB_5B2, ALDB_15C, ALDB_15D

Description : Cette variable décrit le trouble ou la perturbation attribué à la consommation d'alcool sur les activités et les responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s'agit d'une moyenne des cinq items.

Valeur de ALDBDINT	Condition(s)	Explication
SO	ALDB_15A = SO	Le répondant n'avait pas bu assez fréquemment ou n'a pas mentionné de problèmes liés à la consommation d'alcool.
ND	(ALDB_15A = NSP, R, ND) ou (ALDB_5B1 = NSP, R, ND) ou (ALDB_5B2 = NSP, R, ND) ou (ALDB_15C = NSP, R, ND) ou (ALDB_15D = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
$(ALDB_15A + ALDB_5B1 + ALDB_5B2 + ALDB_15C + ALDB_15D) / 5$ (min : 0.0; max : 10.0) (Arrondir à .1)	0 <= ALDB_5B1 <= 10 et 0 <= ALDB_5B2 <= 10 et 0 <= ALDB_15A <= 10 et 0 <= ALDB_15C <= 10 et 0 <= ALDB_15D <= 10	Degré de trouble = moyenne des cinq items. Le répondant a répondu aux cinq questions.
$(ALDB_15A + ALDB_5B2 + ALDB_15C + ALDB_15D) / 4$ (min : 0.0; max : 10.0) (Arrondir à .1)	ALDB_5B1 = 11 et 0 <= ALDB_5B2 <= 10 et 0 <= ALDB_15A <= 10 et 0 <= ALDB_15C <= 10 et 0 <= ALDB_15D <= 10	Degré de trouble = moyenne de quatre items qui s'appliquent au répondant. ALDB_5B1 ne s'applique pas (c.-à-d. que le répondant n'a pas fréquenté l'école au cours des 12 derniers mois).
$(ALDB_15A + ALDB_5B1 + ALDB_15C + ALDB_15D) / 4$ (min : 0.0; max : 10.0) (Arrondir à .1)	0 <= ALDB_5B1 <= 10 et ALDB_5B2 = 11 et 0 <= ALDB_15A <= 10 et 0 <= ALDB_15C <= 10 et 0 <= ALDB_15D <= 10	Degré de trouble = moyenne de quatre items qui s'appliquent au répondant. ALDB_5B2 ne s'applique pas (c.-à-d. que le répondant n'a pas travaillé au cours des 12 derniers mois).
$(ALDB_15A + ALDB_15C + ALDB_15D) / 3$ (min : 0.0; max : 10.0) (Arrondir à .1)	ALDB_5B1 = 11 et ALDB_5B2 = 11 et 0 <= ALDB_15A <= 10 et 0 <= ALDB_15C <= 10 et 0 <= ALDB_15D <= 10	Degré de trouble = moyenne de trois items qui s'appliquent au répondant. ALDB_5B1 et ALDB_5B2 ne s'appliquent pas (c.-à-d. que le répondant n'a pas fréquenté l'école et n'a pas travaillé au cours des 12 derniers mois).

4) Indicateur du trouble causé par la consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : ALDBFINT

Basée sur : ALDB_15A, ALDB_5B1, ALDB_5B2, ALDB_15C, ALDB_15D

Description : Cette variable décrit le trouble ou la perturbation attribué à la consommation d'alcool sur les activités et les responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s'agit d'une classification indiquant si consommation d'alcool perturbe de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires) ou les activités sociales ou les relations personnelles.

Valeur de ALDBFINT	Condition(s)	Explication
SO	ALDB_15A = SO	Le répondant n'avait pas bu assez fréquemment ou n'a pas mentionné de problèmes liés à la consommation d'alcool.
1	4 <= ALDB_15A <= 10 ou 4 <= ALDB_5B1 <= 10 ou 4 <= ALDB_5B2 <= 10 ou 4 <= ALDB_15C <= 10 ou 4 <= ALDB_15D <= 10	La consommation d'alcool a perturbé significativement les activités routinières, le fonctionnement au travail (dans les études), ou les activités sociales ou les relations personnelles au cours des 12 derniers mois.
2	0 <= ALDB_15A <= 3 et (0 <= ALDB_5B1 <= 3 ou ALDB_5B1 = 11) et (0 <= ALDB_5B2 <= 3 ou ALDB_5B2 = 11) et 0 <= ALDB_15C <= 3 et 0 <= ALDB_15D <= 3	La consommation d'alcool n'a pas perturbé significativement les activités routinières, le fonctionnement au travail (dans les études), ou les activités sociales ou les relations personnelles au cours des 12 derniers mois.
ND	(ALDB_15A = NSP, R, ND) ou (ALDB_5B1 = NSP, R, ND) ou (ALDB_5B2 = NSP, R, ND) ou (ALDB_15C = NSP, R, ND) ou (ALDB_15D = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

Drogues Illicites (17 VD)

Ce module mesure la consommation de drogues illicites au cours des douze derniers mois et au cours de la vie. Les questions sur la consommation de ces drogues sont basées sur l'Enquête canadienne sur l'alcool et les autres drogues (1994). De plus, la dépendance aux drogues illicites au cours des douze derniers mois est évaluée sur la base d'une version modifiée des critères du WMH-CIDI, lesquels évaluent partiellement la dépendance aux drogues à l'aide des critères de la classification du DSM-IV. Pour les répondants qui répondent aux critères de l'ESCC 1.2 pour une dépendance aux drogues illicites au cours des douze derniers mois, la perturbation ou le trouble associé à cette dépendance sur les activités et les responsabilités quotidiennes a été évaluée.

Le DSM réfère au Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders utilisé par l'American Psychiatric Association. Il s'agit d'une classification des troubles mentaux internationalement reconnue qui existe en plusieurs versions. Les troubles ou problèmes mentaux que l'on trouve dans le cycle 1.2 de l'ESCC sont partiellement opérationnalisés selon les définitions et les classifications du DSM-IV et DSM-III-R.

Note: Il n'y a pas de variable pour la dépendance à toute substance au cours de la vie. Une erreur dans les instructions "passez à" du questionnaire a fait en sorte que les symptômes au cours de la vie des répondants qui ont aussi répondu aux questions sur la dépendance au cours des 12 derniers mois n'ont pas bien été évalués. Spécifiquement, si un répondant disait "oui" aux symptômes pour les 12 derniers mois, on ne lui demandait pas si il en avait fait l'expérience auparavant. Ainsi, ces répondants ont des réponses au cours de la vie seulement pour les questions au cours des 12 derniers mois auxquelles ils ont répondu "non".

1) Consommation de cannabis – Au cours de la vie (y compris la consommation « juste une fois »)

Nom de la variable : IDGBFLCA

Basée sur : IDGB_01

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà consommé de la marijuana, du cannabis ou du haschich.

Source : Enquête canadienne sur l'alcool et les autres drogues 1994 (ECAD)

Valeur de IDGBFLCA	Condition(s)	Explication
1	(IDGB_01 = 1, 2)	Le répondant a consommé de la marijuana.
2	IDGB_01 = 3	Le répondant n'a jamais consommé de marijuana.
ND	(IDGB_01 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

2) Consommation de cannabis – Au cours de la vie (non compris la consommation « juste une fois »)

Nom de la variable : IDGBFLCM

Basée sur : IDGB_01

Description : Cette variable indique si le répondant a consommé de la marijuana, du cannabis ou du haschich plus d'une fois.

Source : Enquête canadienne sur l'alcool et les autres drogues 1994 (ECAD)

Valeur de IDGBFLCM	Condition(s)	Explication
1	IDGB_01 = 2	Le répondant a consommé de la marijuana plus d'une fois.
2	(IDGB_01 = 1, 3)	Le répondant n'a jamais consommé de marijuana plus d'une fois.

ND	(IDGB_01 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
----	------------------------	--

3) Consommation de cannabis – Au cours des 12 derniers mois (non compris la consommation « juste une fois »)

Nom de la variable : IDGBFYCM

Basée sur : IDGB_01, IDGB_02

Description : Cette variable indique si le répondant a consommé de la marijuana, du cannabis ou du haschich l'année précédente, à l'exclusion de la consommation juste une fois au cours de la vie.

Source : Enquête canadienne sur l'alcool et les autres drogues 1994 (ECAD)

Valeur de IDGBFYCM	Condition(s)	Explication
1	IDGB_01 = 2 et IDGB_02 = 1	Le répondant a consommé de la marijuana au cours des 12 derniers mois et en a consommé plus d'une fois au cours de sa vie.
2	(IDGB_01 = 1 et IDGB_02 = 1) ou (IDGB_02 = 2, SO)	Le répondant n'a pas consommé de marijuana au cours des 12 derniers mois ou en a consommé juste une fois au cours des 12 derniers mois et il s'agissait de la seule fois au cours de sa vie.
ND	(IDGB_02 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

4) Consommation de cocaïne ou de crack – Au cours de la vie

Nom de la variable : IDGBFLCO

Basée sur : IDGB_04

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà consommé de la cocaïne ou du crack.

Source : Enquête canadienne sur l'alcool et les autres drogues 1994 (ECAD)

Valeur de IDGBFLCO	Condition(s)	Explication
1	(IDGB_04 = 1, 2)	Le répondant a consommé de la cocaïne ou du crack.
2	IDGB_04 = 3	Le répondant n'a jamais consommé de cocaïne ni de crack.
ND	(IDGB_04 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

5) Consommation d'amphétamines (speed) – Au cours de la vie

Nom de la variable : IDGBFLAM

Basée sur : IDGB_07

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà consommé des amphétamines (speed).

Source : Enquête canadienne sur l'alcool et les autres drogues 1994 (ECAD)

Valeur de IDGBFLAM	Condition(s)	Explication
1	(IDGB_07 = 1, 2)	Le répondant a consommé des amphétamines.

2	IDGB_07 = 3	Le répondant n'a jamais consommé d'amphétamines.
ND	(IDGB_07 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

6) Consommation de MDMA (ecstasy) – Au cours de la vie

Nom de la variable : IDGBFLEX

Basée sur : IDGB_10

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà consommé de la MDMA (ecstasy) ou des drogues semblables.

Source : Enquête canadienne sur l'alcool et les autres drogues 1994 (ECAD)

Valeur de IDGBFLEX	Condition(s)	Explication
1	(IDGB_10 = 1, 2)	Le répondant a consommé de la MDMA (ecstasy).
2	IDGB_10 = 3	Le répondant n'a jamais consommé de MDMA (ecstasy).
ND	(IDGB_10 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

7) Consommation d'hallucinogènes, de PCP ou de LSD – Au cours de la vie

Nom de la variable : IDGBFLHA

Basée sur : IDGB_13

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà consommé des drogues hallucinogènes, du PCP ou du LSD (acide).

Source : Enquête canadienne sur l'alcool et les autres drogues 1994 (ECAD)

Valeur de IDGBFLHA	Condition(s)	Explication
1	(IDGB_13 = 1, 2)	Le répondant a consommé des drogues hallucinogènes, du PCP ou du LSD (acide).
2	IDGB_13 = 3	Le répondant n'a jamais consommé de drogues hallucinogènes, de PCP ni de LSD (acide).
ND	(IDGB_13 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

8) Inhalation de colle, d'essence ou d'autres solvants – Au cours de la vie

Nom de la variable : IDGBFLGL

Basée sur : IDGB_16

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà inhalé de la colle, de l'essence ou d'autres solvants.

Source : Enquête canadienne sur l'alcool et les autres drogues 1994 (ECAD)

Valeur de IDGBFLGL	Condition(s)	Explication
1	(IDGB_16 = 1, 2)	Le répondant a inhalé de la colle, de l'essence ou d'autres solvants.
2	IDGB_16 = 3	Le répondant n'a jamais inhalé de colle, d'essence ni d'autres solvants.

ND	(IDGB_16 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
----	------------------------	--

9) Consommation d'héroïne – Au cours de la vie

Nom de la variable : IDGBFLHE

Basée sur : IDGB_19

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà consommé de l'héroïne.

Source : Enquête canadienne sur l'alcool et les autres drogues 1994 (ECAD)

Valeur de IDGBFLHE	Condition(s)	Explication
1	(IDGB_19 = 1, 2)	Le répondant a consommé de l'héroïne.
2	IDGB_19 = 3	Le répondant n'a jamais consommé d'héroïne.
ND	(IDGB_19 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

10) Consommation de stéroïdes – Au cours de la vie

Nom de la variable : IDGBFLST

Basée sur : IDGB_22

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà consommé des stéroïdes, comme de la testostérone, du dianabol ou des hormones de croissance.

Source : Enquête canadienne sur l'alcool et les autres drogues 1994 (ECAD)

Valeur de IDGBFLST	Condition(s)	Explication
1	(IDGB_22 = 1, 2)	Le répondant a consommé des stéroïdes.
2	IDGB_22 = 3	Le répondant n'a jamais consommé de stéroïdes.
ND	(IDGB_22 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

11) Consommation de toute drogue illicite – Au cours de la vie (y compris la consommation de cannabis « juste une fois »)

Nom de la variable : IDGBFLA

Basée sur : IDGBFLCA, IDGBFLCO, IDGBFLAM, IDGBFLEX, IDGBFLHA, IDGBFLGL, IDGBFLHE, IDGBFLST

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà utilisé toute drogue figurant sur la liste. Inclut la consommation de cannabis juste une fois.

Source : Enquête canadienne sur l'alcool et les autres drogues 1994 (ECAD)

Valeur de IDGBFLA	Condition(s)	Explication
1	IDGBFLCA = 1 ou IDGBFLCO = 1 ou IDGBFLAM = 1 ou IDGBFLEX = 1 ou IDGBFLHA = 1 ou IDGBFLGL = 1 ou IDGBFLHE = 1 ou IDGBFLST = 1	Le répondant a consommé au moins une drogue énumérée, y compris la consommation de cannabis « juste une fois ».

2	IDGBFLCA = 2 et IDGBFLCO = 2 et IDGBFLAM = 2 et IDGBFLEX = 2 et IDGBFLHA = 2 et IDGBFLGL = 2 et IDGBFLHE = 2 et IDGBFLST = 2	Le répondant n'a jamais consommé aucune des drogues énumérées.
ND	IDGBFLCA = ND ou IDGBFLCO = ND ou IDGBFLAM = ND ou IDGBFLEX = ND ou IDGBFLHA = ND ou IDGBFLGL = ND ou IDGBFLHE = ND ou IDGBFLST = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) dans une des variables dérivées nécessaire au calcul.

12) Consommation de toute drogue illicite – Au cours de la vie (non compris la consommation de cannabis « juste une fois »)

Nom de la variable : IDGBFLAC

Basée sur : IDGBFLCM, IDGBFLCO, IDGBFLAM, IDGBFLEX, IDGBFLHA, IDGBFLGL, IDGBFLHE, IDGBFLST

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà utilisé toute drogue figurant sur la liste. N'inclut pas la consommation de cannabis juste une fois.

Source : Enquête canadienne sur l'alcool et les autres drogues 1994 (ECAD)

Valeur de IDGBFLAC	Condition(s)	Explication
1	IDGBFLCM = 1 ou IDGBFLCO = 1 ou IDGBFLAM = 1 ou IDGBFLEX = 1 ou IDGBFLHA = 1 ou IDGBFLGL = 1 ou IDGBFLHE = 1 ou IDGBFLST = 1	Le répondant a consommé au moins une drogue énumérée, à l'exclusion de la consommation de cannabis « juste une fois ».
2	IDGBFLCM = 2 et IDGBFLCO = 2 et IDGBFLAM = 2 et IDGBFLEX = 2 et IDGBFLHA = 2 et IDGBFLGL = 2 et IDGBFLHE = 2 et IDGBFLST = 2	Le répondant n'a jamais consommé aucune des drogues énumérées, à l'exclusion de la consommation de cannabis juste une fois.
ND	IDGBFLCM = ND ou IDGBFLCO = ND ou IDGBFLAM = ND ou IDGBFLEX = ND ou IDGBFLHA = ND ou IDGBFLGL = ND ou IDGBFLHE = ND ou IDGBFLST = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) dans une des variables dérivées nécessaire au calcul.

13) Consommation de toute drogue illicite – Au cours des 12 derniers mois (y compris la consommation de cannabis « juste une fois »)

Nom de la variable : IDGBFYA

Basée sur : IDGB_02, IDGB_05, IDGB_08, IDGB_11, IDGB_14, IDGB_17, IDGB_20, IDGB_23

Description : Cette variable indique si le répondant a consommé toute drogue énumérée au cours des 12 derniers mois. Inclut la consommation de cannabis juste une fois.

Source : Enquête canadienne sur l'alcool et les autres drogues 1994 (ECAD)

Valeur de IDGBFYA	Condition(s)	Explication
1	IDGB_02 = 1 ou IDGB_05 = 1 ou IDGB_08 = 1 ou IDGB_11 = 1 ou IDGB_14 = 1 ou IDGB_17 = 1 ou IDGB_20 = 1 ou IDGB_23 = 1	Le répondant a consommé au moins une drogue énumérée au cours des 12 derniers mois, y compris la consommation de cannabis « juste une fois ».
2	(IDGB_02 = 2, SO) et (IDGB_05 = 2, SO) et (IDGB_08 = 2, SO) et (IDGB_11 = 2, SO) et (IDGB_14 = 2, SO) et (IDGB_17 = 2, SO) et (IDGB_20 = 2, SO) et (IDGB_23 = 2, SO)	Le répondant n'a consommé aucune des drogues énumérées au cours des 12 derniers mois.
ND	(IDGB_02 = NSP, R, ND) ou (IDGB_05 = NSP, R, ND) ou (IDGB_08 = NSP, R, ND) ou (IDGB_11 = NSP, R, ND) ou (IDGB_14 = NSP, R, ND) ou (IDGB_17 = NSP, R, ND) ou (IDGB_20 = NSP, R, ND) ou (IDGB_23 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

14) Consommation de toute drogue illicite – Au cours des 12 derniers mois (non compris la consommation de cannabis « juste une fois »)

Nom de la variable : IDGBFYAC

Basée sur : IDGBFYCM, IDGB_05, IDGB_08, IDGB_11, IDGB_14, IDGB_17, IDGB_20, IDGB_23

Description : Cette variable indique si le répondant a consommé toute drogue énumérée au cours des 12 derniers mois. N'inclut pas la consommation de cannabis juste une fois.

Source : Enquête canadienne sur l'alcool et les autres drogues 1994 (ECAD)

Valeur de IDGBFYAC	Condition(s)	Explication
1	IDGBFYCM = 1 ou IDGB_05 = 1 ou IDGB_08 = 1 ou IDGB_11 = 1 ou IDGB_14 = 1 ou IDGB_17 = 1 ou IDGB_20 = 1 ou IDGB_23 = 1	Le répondant a consommé au moins une des huit drogues énumérées au cours des 12 derniers mois, à l'exclusion de la consommation de cannabis « juste une fois » au cours de la vie.

2	IDGBFYCM = 2 et (IDGB_05 = 2, SO) et (IDGB_08 = 2, SO) et (IDGB_11 = 2, SO) et (IDGB_14 = 2, SO) et (IDGB_17 = 2, SO) et (IDGB_20 = 2, SO) et (IDGB_23 = 2, SO)	Le répondant qui a consommé une fois du cannabis au cours des 12 derniers mois et que cette fois était la seule au cours de la vie.
ND	IDGBFYCM = ND ou (IDGB_05 = NSP, R, ND) ou (IDGB_08 = NSP, R, ND) ou (IDGB_11 = NSP, R, ND) ou (IDGB_14 = NSP, R, ND) ou (IDGB_17 = NSP, R, ND) ou (IDGB_20 = NSP, R, ND) ou (IDGB_23 = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul. Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

15) Dépendance aux drogues illicites – Au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : IDGBFYDP

Basée sur : IDGB_25A, IDGB_25B, IDGB_25C, IDGB_25D, IDGB_25E, IDGB_25F, IDGB_25G, IDGB_25H

Description : Cette variable identifie les répondants qui répondent aux critères de dépendance aux drogues illicites au cours des 12 derniers mois. Il s'agit d'une modification du CIDI et s'appuie sur une opérationnalisation partielle des définitions et de la classification du DSM-IV pour évaluer la dépendance. Les répondants qui répondent aux critères ont rapporté un mode inadapté de consommation de drogue illicite menant à une altération du fonctionnement ou une détresse significative. Cet état est caractérisé par la présence de 3 ou plus des 6 symptômes suivants; tous étant présents au cours de la même période de 12 mois :

1. tolérance, se définissant comme étant un besoin de quantité notablement plus forte de la substance pour obtenir une intoxication ou l'effet désiré ou comme étant un effet notablement diminué en cas de consommation continue d'une même quantité de la substance;
2. un sevrage caractérisé par un syndrome de sevrage caractéristique de la substance ou la même substance (ou une substance très proche) est consommée pour soulager ou éviter les symptômes de sevrage;
3. la substance est souvent prise en quantité plus importante ou pendant une période plus prolongée que prévu ou a été prise alors que le répondant s'était promis de ne pas le faire;
4. beaucoup de temps est passé à des activités nécessaires pour obtenir la substance (p. ex. consultation de nombreux médecins ou déplacement sur de longues distances), ou à récupérer de ses effets;
5. des activités sociales, professionnelles ou de loisirs importantes sont abandonnées ou réduites à cause de l'utilisation de la substance;
6. la consommation de la substance est poursuivie bien que la personne sache avoir un problème psychologique ou physique persistant ou récurrent susceptible d'avoir été causé ou exacerbé par la substance.

Nota : On a d'abord créé deux variables temporaires qui ont par la suite été utilisées au calcul de la variable portant sur la dépendance aux drogues illicites.

15a) Variable temporaire – Consommation de drogue en quantité plus importante ou pendant une période plus longue que prévu – Au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : IDGBTS3Y

Fondé sur : IDGB_25D, IDGB_25E

Description : Cette variable indique si le répondant a consommé de la drogue en plus grande quantité ou pendant une période plus longue que prévu ou a pris de la drogue alors qu'il ou elle s'était promis de ne pas le faire. Il s'agit du troisième symptôme énoncé dans les critères du DSM-IV.

Valeur de IDGBTS3Y	Condition(s)	Explication
SO	IDGB_25D = SO	Le répondant n'avait pas consommé de drogue assez fréquemment au cours des 12 derniers mois pour répondre aux questions sur la dépendance à la drogue au cours des 12 derniers mois.
1	IDGB_25D = 1 ou IDGB_25E = 1	Au cours des 12 derniers mois, le répondant a pris de la drogue en plus grande quantité ou pendant une période plus longue que prévu ou a pris de la drogue alors qu'il ou elle s'était promis de ne pas le faire.
2	IDGB_25D = 2 et IDGB_25E = 2	Au cours des 12 derniers mois, le répondant n'a pas pris de drogue en plus grande quantité ou pendant une période plus longue que prévu ou n'a pas pris de drogue alors qu'il ou elle s'était promis de ne pas le faire.
ND	(IDGB_25D = NSP, R, ND) ou (IDGB_25E = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

15b) Variable temporaire – Symptômes de sevrage – Au cours des 12 derniers mois**Nom de la variable :** IDGBTS2Y**Fondé sur :** IDGB_25B, IDGB_25C**Description :** Sevrage, tel que manifesté par :

1. le syndrome de sevrage caractéristique de la substance ou
2. la prise de la même substance (ou d'une substance très proche) pour soulager ou éviter les symptômes de sevrage.

Il s'agit du deuxième symptôme énoncé dans les critères du DSM-IV. La valeur de cette variable est calculée uniquement pour les personnes qui ont répondu aux questions sur la consommation de drogue au cours des 12 derniers mois.

Valeur de IDGBTS2Y	Condition(s)	Explication
SO	IDGB_25B = SO	Le répondant n'avait pas consommé de drogue assez fréquemment au cours des 12 derniers mois pour répondre aux questions sur la dépendance à la drogue au cours des 12 derniers mois.
1	IDGB_25B = 1 ou IDGB_25C = 1	Au cours des 12 derniers mois, le répondant a éprouvé des symptômes de sevrage associés à la consommation de drogue.
2	IDGB_25B = 2 et IDGB_25C = 2	Au cours des 12 derniers mois, le répondant n'a pas éprouvé de symptômes de sevrage associés à la consommation de drogue.
ND	(IDGB_25B = NSP, R, ND) ou (IDGB_25C = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

Calcul de la valeur pour dépendance aux drogues illicites au cours des 12 derniers mois

Valeur de IDGBFYDP	Condition(s)	Explication
1	Au moins 3 réponses à (IDGB_25A, IDGBTS2Y, IDGBTS3Y, IDGB_25F, IDGB_25G, IDGB_25H) = 1	Le répondant satisfait aux critères de dépendance à une substance du DSM-IV au cours des 12 derniers mois. Le répondant a déclaré un mode d'utilisation inadapté d'une substance, tel que manifesté par au moins trois symptômes.
2	Au moins 4 réponses à (IDGB_25A, IDGBTS2Y, IDGBTS3Y, IDGB_25F, IDGB_25G, IDGB_25H) = 2 ou IDGB_25A = SO	Le répondant ne satisfait pas aux critères de dépendance une substance du DSM-IV au cours des 12 derniers mois. Le répondant n'a pas présenté au moins quatre symptômes ou le répondant n'a pas pris de drogue assez fréquemment au cours des 12 derniers mois pour répondre aux questions sur la dépendance à la drogue.
ND	(IDGB_25A = NSP, R, ND) ou IDGBTS2Y = ND ou IDGBTS3Y = ND ou (IDGB_25F = NSP, R, ND) ou (IDGB_25G = NSP, R, ND) ou (IDGB_25H = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul ou le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul.

16) Trouble causé par la consommation de drogues illicites au cours des 12 derniers mois - Moyenne**Nom de la variable :** IDGBDINT**Basée sur :** IDGB_26A, IDGB_6B1, IDGB_6B2, IDGB_26C, IDGB_26D**Description :** Cette variable décrit dans quelle mesure la consommation de drogue a perturbé ou troublé les activités et les responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s'agit d'une moyenne des cinq items

Valeur de IDGBDINT	Condition(s)	Explication
SO	IDGB_26A = SO	Le répondant n'a pas consommé de drogue assez fréquemment ou n'a pas indiqué de problèmes liés à la consommation de drogue.
ND	(IDGB_26A = NSP, R, ND) ou (IDGB_6B1 = NSP, R, ND) ou (IDGB_6B2 = NSP, R, ND) ou (IDGB_26C = NSP, R, ND) ou (IDGB_26D = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
$\frac{(IDGB_26A + IDGB_6B1 + IDGB_6B2 + IDGB_26C + IDGB_26D)}{5}$ (arrondir à .1) (min : 0.0; max : 10.0)	$0 \leq IDGB_6B1 \leq 10 \text{ et } 0 \leq IDGB_6B2 \leq 10 \text{ et } 0 \leq IDGB_26A \leq 10 \text{ et } 0 \leq IDGB_26C \leq 10 \text{ et } 0 \leq IDGB_26D \leq 10$	Degré de trouble = moyenne des cinq items. Le répondant a répondu aux cinq questions.

$(IDGB_26A + IDGB_6B2 + IDGB_26C + IDGB_26D) / 4$ (arrondir à .1) (min : 0.0; max : 10.0)	IDGB_6B1 = 11 et 0 <= IDGB_6B2 <= 10 et 0 <= IDGB_26A <= 10 et 0 <= IDGB_26C <= 10 et 0 <= IDGB_26D <= 10	Degré de trouble = moyenne de quatre items qui s'appliquent au répondant. IDGB_6B1 est sans objet (c.-à-d. que le répondant n'a pas fréquenté l'école au cours des 12 derniers mois).
$(IDGB_26A + IDGB_6B1 + IDGB_26C + IDGB_26D) / 4$ (arrondir à .1) (min : 0.0; max : 10.0)	0 <= IDGB_6B1 <= 10 et IDGB_6B2 = 11 et 0 <= IDGB_26A <= 10 et 0 <= IDGB_26C <= 10 et 0 <= IDGB_26D <= 10	Degré de trouble = moyenne de quatre items qui s'appliquent au répondant. IDGB_6B2 est sans objet (c.-à-d. que le répondant n'a pas travaillé au cours des 12 derniers mois).
$(IDGB_26A + IDGB_26C + IDGB_26D) / 3$ (arrondir à .1) (min : 0.0; max : 10.0)	IDGB_6B1 = 11 et IDGB_6B2 = 11 et 0 <= IDGB_26A <= 10 et 0 <= IDGB_26C <= 10 et 0 <= IDGB_26D <= 10	Degré de trouble = moyenne de trois items qui s'appliquent au répondant. IDGB_6B1 et IDGB_6B2 sont sans objet (c.-à-d. que le répondant n'a pas fréquenté l'école et n'a pas travaillé au cours des 12 derniers mois).

17) Indicateur de perturbation causée par la consommation de drogues illicites – Au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : IDGBFINT

Basée sur : IDGB_26A, IDGB_6B1, IDGB_6B2, IDGB_26C, IDGB_26D

Description : Cette variable décrit dans quelle mesure la consommation de drogue a perturbé ou troublé les activités et les responsabilités quotidiennes au cours des 12 derniers mois. Il s'agit d'une classification indiquant si la consommation d'alcool perturbe de façon importante les habitudes, les activités professionnelles (scolaires) ou les activités sociales ou les relations personnelles.

Valeur de IDGBFINT	Condition(s)	Explication
SO	IDGB_26A = SO	Le répondant n'a pas consommé de drogue assez fréquemment ou n'a pas indiqué de problèmes liés à la consommation de drogue.
1	4 <= IDGB_26A <= 10 ou 4 <= IDGB_6B1 <= 10 ou 4 <= IDGB_6B2 <= 10 ou 4 <= IDGB_26C <= 10 ou 4 <= IDGB_26D <= 10	La consommation de drogue a perturbé significativement les activités routinières, le fonctionnement au travail (dans les études), ou les activités sociales ou les relations personnelles au cours des 12 derniers mois.
2	0 <= IDGB_26A <= 3 et (0 <= IDGB_6B1 <= 3 ou IDGB_6B1 = 11) et (0 <= IDGB_6B2 <= 3 ou IDGB_6B2 = 11) et 0 <= IDGB_26C <= 3 et 0 <= IDGB_26D <= 3	La consommation de drogue n'a pas perturbé significativement les activités routinières, le fonctionnement au travail (dans les études), ou les activités sociales ou les relations personnelles au cours des 12 derniers mois.
ND	(IDGB_26A = NSP, R, ND) ou (IDGB_6B1 = NSP, R, ND) ou (IDGB_6B2 = NSP, R, ND) ou (IDGB_26C = NSP, R, ND) ou (IDGB_26D = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

Jeu pathologique (4 VD)

Ce module vise à évaluer la pratique du jeu et les problèmes qui lui sont associés. Le questionnaire et les variables dérivées sont basés sur l'Indice canadien du jeu excessif (ICJE) mais, un certain nombre de modifications (décrites plus bas) ayant été apportées tant au questionnaire qu'aux variables dérivées, les résultats de la présente enquête ne sont pas directement comparables à ceux que l'on obtiendrait à l'aide de l'Indice Canadien du jeu excessif.

Reformatages temporaires

Reformatage	Explication
Si (CPGB_03 = 1, 2, 3, 4) alors CPGRQ03 = (CPGB_03-1) Si (CPGB_04 = 1, 2, 3, 4) alors CPGRQ04 = (CPGB_04-1) Si (CPGB_05 = 1, 2, 3, 4) alors CPGRQ05 = (CPGB_05-1) Si (CPGB_06 = 1, 2, 3, 4) alors CPGRQ06 = (CPGB_06-1) Si (CPGB_07 = 1, 2, 3, 4) alors CPGRQ07 = (CPGB_07-1) Si (CPGB_08 = 1, 2, 3, 4) alors CPGRQ08 = (CPGB_08-1) Si (CPGB_09 = 1, 2, 3, 4) alors CPGRQ09 = (CPGB_09-1) Si (CPGB_10 = 1, 2, 3, 4) alors CPGRQ10 = (CPGB_10-1) Si (CPGB_11 = 1, 2, 3, 4) alors CPGRQ11 = (CPGB_11-1) Si (CPGB_12 = 1, 2, 3, 4) alors CPGRQ12 = (CPGB_12-1) Si (CPGB_13 = 1, 2, 3, 4) alors CPGRQ13 = (CPGB_13-1) Si (CPGB_14 = 1, 2, 3, 4) alors CPGRQ14 = (CPGB_14-1) Si (CPGB_15 = 1, 2, 3, 4) alors CPGRQ15 = (CPGB_15-1) Si (CPGB_16 = 1, 2, 3, 4) alors CPGRQ16 = (CPGB_16-1)	Modifier l'échelle des réponses de 1 à 4, à 0 à 3 pour les questions avec catégories de réponses. (0 = jamais, 1 = quelquefois, 2 = la plupart du temps, 3 = presque toujours)

1) Activité de jeu – Joueur vs. non-joueur

Nom de la variable : CPGBFGAM

Basée sur : CPGB_01A, CPGB_01B, CPGB_01C, CPGB_01D, CPGB_01E, CPGB_01F, CPGB_01G, CPGB_01H, CPGB_01I, CPGB_01J, CPGB_01K, CPGB_01L, CPGB_01M

Description : Cette variable catégorise les répondants comme étant des joueurs ou des non-joueurs. Un non-joueur est défini comme étant une personne qui, l'année précédente, ne s'est adonnée à aucune catégorie d'activité de jeu énumérée. Un joueur est défini comme étant une personne qui s'est adonnée à au moins une catégorie d'activité de jeu à un moment donné l'année précédente.

Valeur de CPGBFGAM	Condition(s)	Explication
1	1 <= CPGB01A <= 7 ou 1 <= CPGB01B <= 7 ou 1 <= CPGB01C <= 7 ou 1 <= CPGB01D <= 7 ou 1 <= CPGB01E <= 7 ou 1 <= CPGB01F <= 7 ou 1 <= CPGB01G <= 7 ou 1 <= CPGB01H <= 7 ou 1 <= CPGB01I <= 7 ou 1 <= CPGB01J <= 7 ou 1 <= CPGB01K <= 7 ou 1 <= CPGB01L <= 7 ou 1 <= CPGB01M <= 7	Joueur – répondant qui s'est adonné à au moins une catégorie d'activité de jeu.
2	CPGB_01A = 8 et CPGB_01B = 8 et CPGB_01C = 8 et CPGB_01D = 8 et CPGB_01E = 8 et CPGB_01F = 8 et	Non-joueur – répondant qui ne s'est adonné à aucune catégorie d'activité de jeu énumérée.

	CPGB_01G = 8 et CPGB_01H = 8 et CPGB_01I = 8 et CPGB_01J = 8 et CPGB_01K = 8 et CPGB_01L = 8 et CPGB_01M = 8	
ND	(CPGB_01A = NSP, R, ND) ou (CPGB_01B = NSP, R, ND) ou (CPGB_01C = NSP, R, ND) ou (CPGB_01D = NSP, R, ND) ou (CPGB_01E = NSP, R, ND) ou (CPGB_01F = NSP, R, ND) ou (CPGB_01G = NSP, R, ND) ou (CPGB_01H = NSP, R, ND) ou (CPGB_01I = NSP, R, ND) ou (CPGB_01J = NSP, R, ND) ou (CPGB_01K = NSP, R, ND) ou (CPGB_01L = NSP, R, ND) ou (CPGB_01M = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

2) Indice de gravité du jeu pathologique (IGJP) – version modifiée

Nom de la variable : CPGBDSEV

Basée sur : CPGB_02, CPGB_03, CPGB_04, CPGB_05, CPGB_06, CPGB_07, CPGB_08, CPGB_09, CPGB_10, CPGB_13, CPGBFGAM

Description : Cette échelle à neuf items est un indice de gravité du jeu excessif.

Nota : Un des changements par rapport à l'ICJE réside dans le fait que les répondants qui ont déclaré ne pas être « parieur » à la question CPGB_02 ne se sont pas fait poser les questions sur la gravité des problèmes de jeu et ce, même s'ils ont rapporté des activités de jeu au cours des douze derniers mois. Ces répondants se sont vus attribuer la valeur 95 pour la présente variable. De plus, les répondants qui déclareraient avoir pratiqué chacune des activités de jeu (CPGB_01A à CPGB_01M) cinq fois ou moins au cours de la dernière année ne se sont pas fait poser les questions sur les problèmes de jeu. Enfin, dans le questionnaire, les activités de jeu ont été classées en moins de catégories que dans l'ICJE. Les modifications apportées à l'outil original ont été approuvées par le Dr. Wynne. Pour obtenir davantage d'information sur les changements apportés au questionnaire, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur. Les problèmes associés au jeu pathologique sont d'autant plus prononcés que la cote est élevée.

Référence : Version modifiée d'une variable de l'ICJE (Indice canadien du jeu excessif) développée par Harold Wynne et Jackie Ferris. « L'indice canadien du jeu excessif : Rapport final » Jackie Ferris et Harold Wynne. Soumis au Centre canadien de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies. 2001.

Valeur de CPGBDSEV	Condition(s)	Explication
SO	CPGBFGAM = 2	Non-joueur
ND	(CPGBFGAM = ND) ou (CPGB_03 = NSP, R, ND) ou (CPGB_04 = NSP, R, ND) ou (CPGB_05 = NSP, R, ND) ou (CPGB_06 = NSP, R, ND) ou (CPGB_07 = NSP, R, ND) ou (CPGB_08 = NSP, R, ND) ou (CPGB_09 = NSP, R, ND) ou (CPGB_10 = NSP, R, ND) ou (CPGB_13 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

95	CPGB_02 = 5	Les questions sur la gravité du jeu pathologique n'ont pas été posées au répondant parce qu'il ne se considère pas comme un joueur.
0	CPGBFGAM = 1 et CPGB_02 = SO	Les questions de l'indice de gravité n'ont pas été posées aux répondants qui ont joué cinq ou moins fois par année pour chaque activité de jeu mentionnée. On leur attribue une cote de 0.
CPGRQ03 + CPGRQ04 + CPGRQ05 + CPGRQ06 + CPGRQ07 + CPGRQ08 + CPGRQ09 + CPGRQ10 + CPGRQ13 (min : 0; max : 27)	(CPGRQ03 = 0, 1, 2, 3) et (CPGRQ04 = 0, 1, 2, 3) et (CPGRQ05 = 0, 1, 2, 3) et (CPGRQ06 = 0, 1, 2, 3) et (CPGRQ07 = 0, 1, 2, 3) et (CPGRQ08 = 0, 1, 2, 3) et (CPGRQ09 = 0, 1, 2, 3) et (CPGRQ10 = 0, 1, 2, 3) et (CPGRQ13 = 0, 1, 2, 3)	Calcul de l'indice de gravité. Les problèmes liés au jeu sont d'autant plus importants que la cote est élevée.

3) Type de joueur

Nom de la variable : CPGBDTYP

Basée sur : CPGBDSEV, CPGBFGAM

Description : Cette variable classe les répondants selon la gravité de leurs problèmes de jeu.

Nota : Un des changements par rapport à l'ICJE réside dans le fait que les répondants qui ont déclaré ne pas être « parieur » à la question CPGB_02 ne se sont pas fait poser les questions sur la gravité des problèmes de jeu et ce, même s'ils ont rapporté des activités de jeu au cours des douze derniers mois. Ces répondants se sont vus attribuer la valeur 95 pour la présente variable. De plus, les répondants qui déclareraient avoir pratiqué chacune des activités de jeu (CPGB_01A à CPGB_01M) cinq fois ou moins au cours de la dernière année ne se sont pas fait poser les questions sur les problèmes de jeu. Enfin, dans le questionnaire, les activités de jeu ont été classées en moins de catégories que dans l'ICJE. Les modifications apportées à l'outil original ont été approuvées par le Dr. Wynne. Pour obtenir davantage d'information sur les changements apportés au questionnaire, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur.

Référence : Version modifiée d'une variable de l'ICJE (Indice canadien du jeu excessif) développée par Harold Wynne et Jackie Ferris. « L'indice canadien du jeu excessif : Rapport final » Jackie Ferris et Harold Wynne. Soumis au Centre canadien de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies. 2001.

Valeur de CPGBDTYP	Condition(s)	Explication
ND	CPGBDSEV = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul.
1	CPGBFGAM = 2	Non-joueur
2	CPGBDSEV = 0	Joueur non pathologique
3	(CPGBDSEV = 1, 2)	Joueur à faible risque
4	(CPGBDSEV = 3, 4, 5, 6, 7)	Joueur à risque moyen
5	CPGBDSEV ≥ 8	Joueur pathologique
95	CPGBDSEV = 95	Les questions sur la gravité du jeu pathologique n'ont pas été posées au répondant parce qu'il ne se considère pas comme un joueur.

4) Nombre de catégories d'activité de jeu dans la liste utilisée pour calculer l'ICJE

Nom de la variable : CPGBDACT

Basée sur : CPGB_01A, CPGB_01B, CPGB_01C, CPGB_01D, CPGB_01E, CPGB_01F, CPGB_01G, CPGB_01H, CPGB_01I, CPGB_01J, CPGB_01K, CPGB_01L, CPGB_01M

Description : Cette variable indique le nombre de catégories différentes d'activités de jeu auxquelles la personne a participé.

Reformatages Temporaires

Reformatage temporaires : Initialiser les variables provisoires à leurs valeurs respectives (c.-à-d. fixer la valeur de CPGRQ01A à celle figurant dans CPGB_01A), puis fixer la valeur à zéro lorsque la condition est vérifiée.	
Reformatage	Explication
Si CPGB_01A = 8 alors CPGRQ01A = 0 Si CPGB_01B = 8 alors CPGRQ01B = 0 Si CPGB_01C = 8 alors CPGRQ01C = 0 Si CPGB_01D = 8 alors CPGRQ01D = 0 Si CPGB_01E = 8 alors CPGRQ01E = 0 Si CPGB_01F = 8 alors CPGRQ01F = 0 Si CPGB_01G = 8 alors CPGRQ01G = 0 Si CPGB_01H = 8 alors CPGRQ01H = 0 Si CPGB_01I = 8 alors CPGRQ01I = 0 Si CPGB_01J = 8 alors CPGRQ01J = 0 Si CPGB_01K = 8 alors CPGRQ01K = 0 Si CPGB_01L = 8 alors CPGRQ01L = 0 Si CPGB_01M = 8 alors CPGRQ01M = 0	Recoder provisoirement la valeur 8 à 0 de sorte que les réponses « jamais » ne comptent pas dans la somme des diverses catégories d'activité de jeu auxquelles la personne a participé.
Si 1 <= CPGB_01A <= 7 alors CPGRQ01A = 1 Si 1 <= CPGB_01B <= 7 alors CPGRQ01B = 1 Si 1 <= CPGB_01C <= 7 alors CPGRQ01C = 1 Si 1 <= CPGB_01D <= 7 alors CPGRQ01D = 1 Si 1 <= CPGB_01E <= 7 alors CPGRQ01E = 1 Si 1 <= CPGB_01F <= 7 alors CPGRQ01F = 1 Si 1 <= CPGB_01G <= 7 alors CPGRQ01G = 1 Si 1 <= CPGB_01H <= 7 alors CPGRQ01H = 1 Si 1 <= CPGB_01I <= 7 alors CPGRQ01I = 1 Si 1 <= CPGB_01J <= 7 alors CPGRQ01J = 1 Si 1 <= CPGB_01K <= 7 alors CPGRQ01K = 1 Si 1 <= CPGB_01L <= 7 alors CPGRQ01L = 1 Si 1 <= CPGB_01M <= 7 alors CPGRQ01M = 1	Recoder provisoirement les valeurs 1 à 7 à la valeur 1 de sorte que chaque activité puisse être comptée comme une catégorie distincte d'activité de jeu à laquelle la personne a participé.

Valeur de CPGBDACT	Condition(s)	Explication
ND	(CPGB_01A = NSP, R) ou (CPGB_01B = NSP, R, ND) ou (CPGB_01C = NSP, R, ND) ou (CPGB_01D = NSP, R, ND) ou (CPGB_01E = NSP, R, ND) ou (CPGB_01F = NSP, R, ND) ou (CPGB_01G = NSP, R, ND) ou (CPGB_01H = NSP, R, ND) ou (CPGB_01I = NSP, R, ND) ou (CPGB_01J = NSP, R, ND) ou (CPGB_01K = NSP, R, ND) ou (CPGB_01L = NSP, R, ND) ou (CPGB_01M = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

CPGRQ01A + CPGRQ01B + CPGRQ01C + CPGRQ01D + CPGRQ01E + CPGRQ01F + CPGRQ01G + CPGRQ01H + CPGRQ01I + CPGRQ01J + CPGRQ01K + CPGRQ01L + CPGRQ01M (min : 0; max : 13)	(CPGRQ01A = 0, 1) et (CPGRQ01B = 0, 1) et (CPGRQ01C = 0, 1) et (CPGRQ01D = 0, 1) et (CPGRQ01E = 0, 1) et (CPGRQ01F = 0, 1) et (CPGRQ01G = 0, 1) et (CPGRQ01H = 0, 1) et (CPGRQ01I = 0, 1) et (CPGRQ01J = 0, 1) et (CPGRQ01K = 0, 1) et (CPGRQ01L = 0, 1) et (CPGRQ01M = 0, 1)	Nombre de catégories distinctes d'activité de jeu auxquelles la personne a participé.
---	---	---

Troubles alimentaires (2 VD)

Le module des troubles alimentaires est fondé sur le test des attitudes alimentaires (Eating Attitudes Test - EAT) élaboré par le Dr David M. Garner. L'EAT-26 est probablement la mesure normalisée la plus répandue des symptômes et préoccupations caractéristiques des troubles alimentaires, même si elle ne produit pas de diagnostic précis.

1) Cote sur l'échelle des attitudes alimentaires - modifiée

Nom de la variable : ETABDIND

Basée sur : ETAB_01A, ETAB_01B, ETAB_02, ETAB_03, ETAB_04, ETAB_05, ETAB_06, ETAB_07, ETAB_08, ETAB_09, ETAB_10, ETAB_11, ETAB_12, ETAB_13, ETAB_14, ETAB_15, ETAB_16, ETAB_17, ETAB_18, ETAB_19, ETAB_20, ETAB_21, ETAB_22, ETAB_23, ETAB_24, ETAB_25, ETAB_26, ETAB_27

Description : La variable qui suit est une mesure des symptômes et préoccupations caractéristiques des troubles alimentaires. Le EAT est généralement administré aux individus qui ont manifesté des symptômes ou des préoccupations reliés à leurs attitudes et comportements relatifs à l'alimentation. Afin d'évaluer les préoccupations quant aux comportements et attitudes alimentaires au cours des 12 derniers mois et au cours de la vie, deux « questions-filtres » ont été ajoutées au cycle 1.2 de l'ESCC. Les répondants qui ont fourni des réponses positives aux « questions-filtres » se sont fait poser l'éventail complet des items/questions du EAT-26. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur.

Les troubles alimentaires sont d'autant plus prononcés que la cote est élevée.

Reformatages temporaires

Reformatage	Explication
For ETAB_02--ETAB_26: Si ETAB_xx = 01 alors ETARQxx = 3 Si ETAB_xx = 02 alors ETARQxx = 2 Si ETAB_xx = 03 alors ETARQxx = 1 Si ETAB_xx = 04 alors ETARQxx = 0 Si ETAB_xx = 05 alors ETARQxx = 0 Si ETAB_xx = 06 alors ETARQxx = 0	Recoder les valeurs de 0 à 3 pour toutes les questions pour lesquelles la valeur ne manque pas.
For ETAB_27: Si ETAB_27 = 01 alors ETARQ27 = 0 Si ETAB_27 = 02 alors ETARQ27 = 0 Si ETAB_27 = 03 alors ETARQ27 = 0 Si ETAB_27 = 04 alors ETARQ27 = 1 Si ETAB_27 = 05 alors ETARQ27 = 2 Si ETAB_27 = 06 alors ETARQ27 = 3	Recoder les valeurs de 0 à 3 pour toutes les questions pour lesquelles la valeur ne manque pas.

Valeur de ETABDIND	Condition(s)	Explication
ND	(ETAB_01A = NSP, R, ND) ou (ETAB_01B = NSP, R, ND) ou (ETAB_02 = NSP, R, ND) ou (ETAB_03 = NSP, R, ND) ou (ETAB_04 = NSP, R, ND) ou (ETAB_05 = NSP, R, ND) ou (ETAB_06 = NSP, R, ND) ou (ETAB_07 = NSP, R, ND) ou (ETAB_08 = NSP, R, ND) ou (ETAB_09 = NSP, R, ND) ou (ETAB_10 = NSP, R, ND) ou (ETAB_11 = NSP, R, ND) ou (ETAB_12 = NSP, R, ND) ou	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

	(ETAB_13 = NSP, R, ND) ou (ETAB_14 = NSP, R, ND) ou (ETAB_15 = NSP, R, ND) ou (ETAB_16 = NSP, R, ND) ou (ETAB_17 = NSP, R, ND) ou (ETAB_18 = NSP, R, ND) ou (ETAB_19 = NSP, R, ND) ou (ETAB_20 = NSP, R, ND) ou (ETAB_21 = NSP, R, ND) ou (ETAB_22 = NSP, R, ND) ou (ETAB_23 = NSP, R, ND) ou (ETAB_24 = NSP, R, ND) ou (ETAB_25 = NSP, R, ND) ou (ETAB_26 = NSP, R, ND) ou (ETAB_27 = NSP, R, ND)	
SO	ETAB_01A = 2 ou ETAB_01B = 2	Le répondant n'a manifesté aucune crainte ni préoccupation concernant l'excès de poids et n'a pas été considéré comme courant le risque de présenter un trouble alimentaire.
ETARQ02 + ETARQ03 + ETARQ04 + ETARQ05 + ETARQ06 + ETARQ07 + ETARQ08 + ETARQ09 + ETARQ10 + ETARQ11 + ETARQ12 + ETARQ13 + ETARQ14 + ETARQ15 + ETARQ16 + ETARQ17 + ETARQ18 + ETARQ19 + ETARQ20 + ETARQ21 + ETARQ22 + ETARQ23 + ETARQ24 + ETARQ25 + ETARQ26 + ETARQ27 (min : 0; max : 78)	1 <= ETAB_02 <= 6 et 1 <= ETAB_03 <= 6 et 1 <= ETAB_04 <= 6 et 1 <= ETAB_05 <= 6 et 1 <= ETAB_06 <= 6 et 1 <= ETAB_07 <= 6 et 1 <= ETAB_08 <= 6 et 1 <= ETAB_09 <= 6 et 1 <= ETAB_10 <= 6 et 1 <= ETAB_11 <= 6 et 1 <= ETAB_12 <= 6 et 1 <= ETAB_13 <= 6 et 1 <= ETAB_14 <= 6 et 1 <= ETAB_15 <= 6 et 1 <= ETAB_16 <= 6 et 1 <= ETAB_17 <= 6 et 1 <= ETAB_18 <= 6 et 1 <= ETAB_19 <= 6 et 1 <= ETAB_20 <= 6 et 1 <= ETAB_21 <= 6 et 1 <= ETAB_22 <= 6 et 1 <= ETAB_23 <= 6 et 1 <= ETAB_24 <= 6 et 1 <= ETAB_25 <= 6 et 1 <= ETAB_26 <= 6 et 1 <= ETAB_27 <= 6	Score obtenu sur l'échelle EAT-26.

2) Indicateur de risque de troubles alimentaires - modifiée

Nom de la variable : ETABFIND

Basée sur : ETABDIND

Description : Indicateur fondé sur la cote obtenue sur l'échelle des attitudes alimentaires. Les personnes dont la cote est supérieure au seuil établi courent le risque de présenter des troubles alimentaires.

Valeur de ETABFIND	Condition(s)	Explication
ND	(ETABDIND = NSP, R, ND)	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable nécessaire au calcul.
1	$21 \leq \text{ETABDIND} \leq 78$	Le répondant court le risque de présenter des troubles alimentaires.
2	$0 \leq \text{ETABDIND} \leq 20$ ou ETABDIND = SO	Le répondant ne présente vraisemblablement pas de troubles alimentaires.

Limitation des activités (5 VD)

1) Cause du problème de santé - Variable groupée

Nom de la variable : RACBG5

Basée sur : RACB_5

Description : La variable suivante indique la cause du problème de santé.

Valeur de RACBG5	Condition(s)	Explication
1	1 <= RACB_5 <= 4	Blessure (y compris les blessures survenues à la maison, et celles liées à des activités sportives ou récréatives, à la conduite d'un véhicule à moteur ou au travail)
2	RACB_5 = 7	Maladie
3	RACB_5 = 8	Vieillessement
4	RACB_5 = 9 ou RACB_5 = 10	Problème relié aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogues.
5	RACB_5 = 5 ou RACB_5 = 6 ou RACB_5 = 11	Autre (y compris existence à la naissance, milieu de travail, violence psychologique/physique, autre)
ND	RACB_5 = NSP, R ou ND	Non déclaré
SO	RACB_5 = SO	Sans objet

2) Incidences des problèmes de santé

Nom de la variable : RACBDIMP

Basée sur : RACB_2A, RACB_2B1 RACB_2B2, RACB_2C

Description : La variable est une mesure brute de l'incidence des problèmes de santé physique, de santé mentale et de santé à long terme dans les principales sphères de la vie : la maison, le travail, l'école et d'autres activités.

Nota : Il ne faut pas utiliser cette variable pour obtenir le taux d'incapacité ou de limitation des activités au sein de la population. La variable est calculée d'après RACB_2A, RACB_2B1, RACB_2B2 et RACB_2C. Ces questions, plus RACB_1, ont été posées dans le cadre du Recensement de 2001 dans le but de prélever un échantillon en vue de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités (EPLA) post-censitaire de 2001. De plus, compte tenu de différences dans la formulation des questions entre l'ESCC et l'Enquête nationale sur la santé de la population (les questions de l'ENSP sont des questions du Recensement de 1991), RACBDIMP NE doit PAS être comparées aux variables RES_FLG, RAC6F1, RAC8F1, ou RAC0F1 de l'ENSP.

Valeur de RACBDIMP	Condition(s)	Explication
ND	(RACB_2A = NSP, R, ND) ou (RACB_2B1 = NSP, R, ND) ou (RACB_2B2 = NSP, R, ND) ou (RACB_2C = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
2	RACB_2A = 2 ou RACB_2B1 = 2 ou RACB_2B2 = 2 ou RACB_2C = 2	Souvent

1	RACB_2A = 1 ou RACB_2B1 = 1 ou RACB_2B2 = 1 ou RACB_2C = 1	Parfois
3	RACB_2A = 3 et (RACB_2B1 = 3, 4) et (RACB_2B2 = 3, 4) et RACB_2C = 3	Jamais

3) Participation et limitations d'activités

Nom de la variable : RACBDPAL

Basée sur : RACB_1, RACB_2A, RACB_2B1, RACB_2B2, RACB_2C

Description : La variable est la même que la variable RACBDIMP, sauf qu'il est tenu compte de la réponse à la question RACB_1 dans RACBDPAL. Cette variable dérivée est une modification de la variable dérivée de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités (EPLA). L'attribution de la cote est la même dans l'EPLA, sauf pour le calcul de la non-réponse. Dans le cas de l'EPLA, on considère que les réponses « ne sait pas » et « refus » sont négatives (fixées à « jamais »), plutôt qu'une non-réponse. Ce traitement est incompatible avec la façon dont les réponses « NSP » et « R » sont traitées dans le cas de l'ESCC et, par conséquent, lors du calcul de notre variable dérivée, les réponses « NSP » et « R » demeurent équivalentes à « non déclaré ».

Valeur de RACBDPAL	Condition(s)	Explication
ND	(RACB_2A = NSP, R, ND) ou (RACB_2B1 = NSP, R, ND) ou (RACB_2B2 = NSP, R, ND) ou (RACB_2C = NSP, R, ND) ou (RACB_1 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
2	RACB_2A = 2 ou RACB_2B1 = 2 ou RACB_2B2 = 2 ou RACB_2C = 2 ou RACB_1 = 2	Souvent
1	RACB_2A = 1 ou RACB_2B1 = 1 ou RACB_2B2 = 1 ou RACB_2C = 1 ou RACB_1 = 1	Parfois
3	RACB_2A = 3 et (RACB_2B1 = 3, 4) et (RACB_2B2 = 3, 4) et RACB_2C = 3 et RACB_1 = 3	Jamais

4) A besoin d'aide pour certaines tâches

Nom de la variable : RACBF6R

Basée sur : RACB_6A, RACB_6B1, RACB_6C, RACB_6D, RACB_6E, RACB_6F, RACB_6G

Description : La dépendance renvoie au besoin d'aide (pour des raisons de santé) pour les activités de la vie quotidienne, comme la préparation des repas, l'épicerie ou d'autres nécessités, les travaux ménagers quotidiens, les travaux lourds (le lavage des murs, les travaux à l'extérieur) et les soins personnels (se laver, s'habiller ou manger), se déplacer dans la maison, ou payer les factures.

Nota : RACBF6R est modifiée, comparativement à RACAF6 (ESCC Cycle 1.1), par ajout de RACB_6G. La série de tâches comprises a été révisée en prenant pour base l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités. Donc, cette variable dérivée ayant été modifiée pour tenir compte d'une série de tâches révisée, elle n'est pas strictement comparable à RACAF6.

Valeur de RACBF6R	Condition(s)	Explication
1	RACB_6A = 1 ou RACB_6B1 = 1 ou RACB_6C = 1 ou RACB_6D = 1 ou RACB_6E = 1 ou RACB_6F = 1 ou RACB_6G = 1	A besoin d'aide pour au moins une tâche.
2	RACB_6A = 2 et RACB_6B1 = 2 et RACB_6C = 2 et RACB_6D = 2 et RACB_6E = 2 et RACB_6F = 2 et RACB_6G = 2	N'a pas besoin d'aide.
ND	(RACB_6A = NSP, R, ND) ou (RACB_6B1 = NSP, R, ND) ou (RACB_6C = NSP, R, ND) ou (RACB_6D = NSP, R, ND) ou (RACB_6E = NSP, R, ND) ou (RACB_6F = NSP, R, ND) ou (RACB_6G = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

5) Difficultés dans les situations sociales

Nom de la variable : RACBF7

Basée sur : RACB_7A, RACB_7B, RACB_7C

Description : Cette variable a trait aux difficultés éprouvées (pour des raisons de santé) dans des situations telles que se faire ou garder des amis, avoir affaire à des personnes que l'on ne connaît pas bien, ou amorcer ou entretenir une conversation.

Valeur de RACBF7	Condition(s)	Explication
1	RACB_7A = 1 ou RACB_7B = 1 ou RACB_7C = 1	Éprouve de la difficulté dans au moins une des situations sociales.
2	RACB_7A = 2 et RACB_7B = 2 et RACB_7C = 2	Le répondant n'éprouve aucune difficulté dans les situations sociales.
ND	(RACB_7A = NSP, R, ND) ou (RACB_7B = NSP, R, ND) ou (RACB_7C = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

Incapacité au cours des deux dernières semaines (5 VD)

Reformatages temporaires

Reformatage	Explication
Si TWDB_2 = SO alors TWDB_2 = 0	Remettre les valeurs SO de TWDB_2 à 0.
Si TWDB_4 = SO alors TWDB_4 = 0	Remettre les valeurs SO de TWDB_4 à 0.

1) Nombre total de jours d'incapacité

Nom de la variable : TWDBDDDY

Basée sur : TWDB_2, TWDB_4

Description : Le nombre de jours au cours des deux dernières semaines pendant lesquelles le répondant a été alité ou a dû limiter ses activités à cause d'une maladie ou d'une blessure.

Source : Enquête sociale générale – Santé, cycle 6 (1991)

Site Web de Statistique Canada : <http://www.statcan.ca/français/sdds/3894f.htm>

Valeur de TWDBDDDY	Condition(s)	Explication
ND	(TWDB_2 = NSP, R, ND) ou (TWDB_4 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
TWDRQ2 + TWDRQ4 (min : 0; max : 14)	TWDRQ2 < 15 et TWDRQ4 < 15	Le nombre de jours au cours des deux dernières semaines pendant lesquelles le répondant a été alité ou a dû limiter ses activités.

2) Nombre total de jours d'alitement à cause d'un problème de santé mentale

Nom de la variable : TWDBDMQ2

Basée sur : TWDB_2, TWDB_2A, TWDB_2B

Description : Nombre de jours, au cours des deux dernières semaines, où le répondant a dû garder le lit à cause d'une maladie ou d'une blessure liée à sa santé émotionnelle ou mentale ou à sa consommation d'alcool ou de drogue.

Valeur de TWDBDMQ2	Condition(s)	Explication
TWDB_2 (min : 0; max : 1)	TWDB_2A = 1	Nombre de jours d'alitement pour des problèmes liés à la santé émotionnelle ou mentale
0	TWDB_2A = 2	Aucun jour d'alitement pour des problèmes liés à la santé émotionnelle ou mentale
TWDB_2B (min : 0; max : 14)	TWDB_2B < 15	Nombre de jours d'alitement pour des problèmes liés à la santé émotionnelle ou mentale
0	TWDB_2 = SO	Aucun jour d'alitement pour des problèmes liés à la santé émotionnelle ou mentale
ND	(TWDB_2A = NSP, R, ND) ou (TWDB_2B = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

3) Nombre total de jours de limitation des activités à cause d'un problème lié à la santé mentale

Nom de la variable : TWDBDMQ4

Basée sur : TWDB_4, TWDB_4A, TWDB_4B

Description : Nombre de jours, au cours des deux dernières semaines, où le répondant a dû limiter ses activités à cause d'une maladie ou d'une blessure liée à sa santé émotionnelle ou mentale ou à sa consommation d'alcool ou de drogue.

Valeur de TWDBDMQ4	Condition(s)	Explication
TWDB_4 (min : 0; max : 14)	TWDB_4A = 1	Nombre de jours de limitation des activités pour des problèmes liés à la santé émotionnelle ou mentale
0	TWDB_4A = 2	Aucun jour de limitation des activités pour des problèmes liés à la santé émotionnelle ou mentale
TWDB_4B (min : 0; max : 14)	TWDB_4B < 15	Nombre de jours de limitation des activités pour des problèmes liés à la santé émotionnelle ou mentale
0	TWDB_4 = SO	Aucun jour de limitation des activités pour des problèmes liés à la santé émotionnelle ou mentale
ND	(TWDB_4A = NSP, R, ND) ou (TWDB_4B = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

4) Nombre total de jours exigeant un effort supplémentaire à cause de problèmes liés à la santé mentale

Nom de la variable : TWDBDMQ6

Basée sur : TWDB_6, TWDB_6A, TWDB_6B

Description : Nombre de jours, au cours des deux dernières semaines, où le répondant a dû faire plus d'efforts pour accomplir, au niveau habituel, son travail ou d'autres activités quotidiennes à cause d'une maladie ou d'une blessure due à sa santé émotionnelle ou mentale ou à sa consommation d'alcool ou de drogue.

Valeur de TWDBDMQ6	Condition(s)	Explication
TWDB_6 (min : 0; max : 1)	TWDB_6A = 1	Nombre de jours d'effort supplémentaire à cause de problèmes liés à la santé émotionnelle ou mentale
0	TWDB_6A = 2	Aucun jour d'effort supplémentaire à cause de problèmes liés à la santé émotionnelle ou mentale
TWDB_6B (min : 0; max : 14)	TWDB_6B < 15	Nombre de jours d'effort supplémentaire à cause de problèmes liés à la santé émotionnelle ou mentale
0	TWDB_6 = SO	Aucun jour d'effort supplémentaire à cause de problèmes liés à la santé émotionnelle ou mentale
ND	(TWDB_6A = NSP, R, ND) ou (TWDB_6B = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

5) Nombre total de journées d'incapacité à cause de problèmes liés à la santé mentale

Nom de la variable : TWDBDMH

Basée sur : TWDBDMQ2, TWDBDMQ4

Description : Nombre de jours, au cours des deux dernières semaines, où le répondant a gardé le lit ou a limité ses activités à cause d'une maladie ou d'une blessure liée à sa santé émotionnelle ou mentale ou à sa consommation d'alcool ou de drogue.

Valeur de TWDBDMH	Condition(s)	Explication
ND	TWDBDMQ2 = ND ou TWDBDMQ4 = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une variable dérivée nécessaire au calcul.
TWDBDMQ2 + TWDBDMQ4 (min : 0; max : 14)	TWDBDMQ2 < 15 et TWDBDMQ4 < 15	Nombre total, au cours des deux dernières semaines, de jours d'incapacité à cause de problèmes liés à la santé émotionnelle ou mentale.

Utilisation des services de santé (36 VD)

Ces variables se rapportent à l'utilisation de services et de ressources pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou la consommation d'alcool ou de drogues. Les services comprennent entre autres l'hospitalisation, la consultation auprès de tout type de professionnel et l'utilisation de diverses ressources informelles. Les types de services et de ressources utilisés au cours de la vie et durant les 12 derniers mois sont notés.

On a demandé aux répondants s'ils avaient senti, au cours des 12 mois précédents l'enquête, avoir besoin d'aide pour leurs émotions, leur santé mentale ou leur consommation d'alcool ou de drogues mais ne pas l'avoir obtenue. Les raisons pour lesquelles les besoins de soins de santé ne sont pas satisfaits peuvent être classées dans trois catégories :

- 1) disponibilité des services (p. ex., périodes d'attente),
- 2) accessibilité des services (p. ex., problèmes de coût ou de transport),
- 3) acceptabilité des services (p. ex., circonstances personnelles, comme les attitudes à l'égard du système de santé ou des prestataires de services qui ont empêché le répondant d'obtenir certaines formes de soins de santé.)

Ces catégories ont été décrites dans l'article de Jiajian Chen et Feng Hou intitulé « Besoins non satisfaits de soins de santé » publié dans *Rapports sur la santé*, vol. 13, no 2, janvier 2002.

1) Durée totale des hospitalisations pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogues – au cours des 12 derniers mois – Variable groupée

Nom de la variable : SERBG09

Basée sur : SERB_09A (JOURS), SERB_09B (SEMAINES), SERB_09C (MOIS)

Description : Cette variable indique la durée totale des hospitalisations pour des problèmes reliés à la santé mentale au cours des 12 derniers mois.

Afin de s'assurer que les individus ne sont pas identifiables, des enregistrements ont été groupés.

Valeur de SERBG09	Condition(s)	Explication
SO	SERB_09A = SO et SERB_09B = SO et SERB_09C = SO	Sans Objet
1	1 <= SERB_09A <= 3	1 à 3 jours
2	4 <= SERB_09A <= 7 ou SERB_09B = 1	1 semaine (4 à 7 jours)
3	8 <= SERB_09A <= 14 ou SERB_09B = 2	2 semaines (8 à 14 jours)
4	15 <= SERB_09A <= 21 ou SERB_09B = 3	3 semaines (15 à 21 jours)
5	22 <= SERB_09A <= 31 ou SERB_09B = 4 ou SERB_09C = 1	1 mois
6	32 <= SERB_09A <= 60 ou 5 <= SERB_09B <= 8 ou SERB_09C = 2	2 mois
7	61 <= SERB_09A <= 91 ou 9 <= SERB_09B <= 13 ou SERB_09C = 3	3 mois
8	92 <= SERB_09A <= 120 ou 14 <= SERB_09B <= 17 ou SERB_09C = 4	4 mois

9	121 <= SERB_09A <= 151 ou 18 <= SERB_09B <= 21 ou SERB_09C = 5	5 mois
10	152 <= SERB_09A <= 180 ou 22 <= SERB_09B <= 26 ou SERB_09C = 6	6 mois
11	181 <= SERB_09A <= 211 ou 27 <= SERB_09B <= 30 ou SERB_09C = 7	7 mois
12	212 <= SERB_09A <= 240 ou 31 <= SERB_09B <= 34 ou SERB_09C = 8	8 mois
13	241 <= SERB_09A <= 271 ou 35 <= SERB_09B <= 39 ou SERB_09C = 9	9 mois
14	272 <= SERB_09A <= 300 ou 40 <= SERB_09B <= 44 ou SERB_09C = 10	10 mois
15	301 <= SERB_09A <= 331 ou 45 <= SERB_09B <= 48 ou SERB_09C = 11	11 mois
16	332 <= SERB_09A <= 365 ou 49 <= SERB_09B <= 52 ou SERB_09C = 12	1 an
ND	SERB_09A = (NSP, R, ND) ou SERB_09B = (NSP, R, ND) ou SERB_09C = (NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

2) Consulté un psychiatre – clinique externe – Variable groupée

Nom de la variable : SERBG24F

Basée sur : SERB_24D, SERB_24E, SERB_24F

Description : Cette variable indique si le répondant a contacté un psychiatre dans les types de cliniques externes suivantes : de psychiatrie, de désintoxication, ou de autre clinique externe d'un hôpital.

Afin de s'assurer que les individus ne sont pas identifiables, des enregistrements ont été groupés.

Valeur de SERBG24F	Condition(s)	Explication
SO	SERB_24D = SO ou SERB_24E = SO ou SERB_24F = SO	Sans objet
1	SERB_24D = 1 ou SERB_24E = 1 ou SERB_24F = 1	Le répondant a répondu « oui » à au moins une des questions sur le contact avec un psychiatre dans une clinique externe.
2	SERB_24D = 2 et SERB_24E = 2 et SERB_24F = 2	Le répondant a répondu « non » aux questions sur le contact avec un psychiatre dans une clinique externe.
ND	SERB_24D = (NSP, R, ND) ou SERB_24E = (NSP, R, ND) ou SERB_24F = (NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à une des questions nécessaires au calcul.

3) Consulté un psychiatre – autre clinique – Variable groupée

Nom de la variable : SERBG24I

Basée sur : SERB_24G, SERB_24H, SERB_24I

Description : Cette variable indique si le répondant a contacté un psychiatre dans les types de cliniques suivantes : sans rendez-vous, avec rendez-vous, ou CLSC / Centre de santé communautaire.

Afin de s'assurer que les individus ne sont pas identifiables, des enregistrements ont été groupés.

Valeur de SERBG24I	Condition(s)	Explication
SO	SERB_24G = SO ou SERB_24H = SO ou SERB_24I = SO	Sans objet
1	SERB_24G = 1 ou SERB_24H = 1 ou SERB_24I = 1	Le répondant a répondu « oui » à au moins une des questions sur le contact avec un psychiatre dans un autre type de clinique.
2	SERB_24G = 2 et SERB_24H = 2 et SERB_24I = 2	Le répondant a répondu « non » aux questions sur le contact avec un psychiatre dans un autre type de clinique.
ND	SERB_24G = (NSP, R, ND) ou SERB_24H = (NSP, R, ND) ou SERB_24I = (NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à une des questions nécessaires au calcul.

4) Consulté un psychiatre – travail, école, autre endroit – Variable groupée

Nom de la variable : SERBG24O

Basée sur : SERB_24J, SERB_24K, SERB_24O

Description : Cette variable indique si le répondant a contacté un psychiatre au travail, à l'école ou à un autre endroit.

Afin de s'assurer que les individus ne sont pas identifiables, des enregistrements ont été groupés.

Valeur de SERBG24O	Condition(s)	Explication
SO	SERB_24J = SO ou SERB_24K = SO ou SERB_24O = SO	Sans objet
1	SERB_24J = 1 ou SERB_24K = 1 ou SERB_24O = 1	Le répondant a répondu « oui » à au moins une des questions sur le contact avec un psychiatre au travail, à l'école ou à un autre endroit.
2	SERB_24J = 2 et SERB_24K = 2 et SERB_24O = 2	Le répondant a répondu « non » aux questions sur le contact avec un psychiatre au travail, à l'école ou à un autre endroit.
ND	SERB_24J = (NSP, R, ND) ou SERB_24K = (NSP, R, ND) ou SERB_24O = (NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à une des questions nécessaires au calcul.

5) Consulté un médecin de famille – clinique externe – Variable groupée

Nom de la variable : SERBG34F

Basée sur : SERB_34D, SERB_34E, SERB_34F

Description : Cette variable indique si le répondant a contacté un médecin de famille dans les types de cliniques externes suivantes : de psychiatrie, de désintoxication ou autre clinique externe d'un hôpital.

Afin de s'assurer que les individus ne sont pas identifiables, des enregistrements ont été groupés.

Valeur de SERBG34F	Condition(s)	Explication
SO	SERB_34D = SO ou SERB_34E = SO ou SERB_34F = SO	Sans objet
1	SERB_34D = 1 ou SERB_34E = 1 ou SERB_34F = 1	Le répondant a répondu « oui » à au moins une des questions sur le contact avec un médecin de famille dans une clinique externe.
2	SERB_34D = 2 et SERB_34E = 2 et SERB_34F = 2	Le répondant a répondu « non » aux questions sur le contact avec un médecin de famille dans une clinique externe.
ND	SERB_34D = (NSP, R, ND) ou SERB_34E = (NSP, R, ND) ou SERB_34F = (NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à une des questions nécessaires au calcul.

6) Consulté un médecin de famille – autre clinique – Variable groupée

Nom de la variable : SERBG34I

Basée sur : SERB_34G, SERB_34H, SERB_34I

Description : Cette variable indique si le répondant a contacté un médecin de famille dans les types de cliniques suivantes : sans rendez-vous, avec rendez-vous ou CLSC / Centre de santé communautaire.

Afin de s'assurer que les individus ne sont pas identifiables, des enregistrements ont été groupés.

Valeur de SERBG34I	Condition(s)	Explication
SO	SERB_34G = SO ou SERB_34H = SO ou SERB_34I = SO	Sans objet
1	SERB_34G = 1 ou SERB_34H = 1 ou SERB_34I = 1	Le répondant a répondu « oui » à au moins une des questions sur le contact avec un médecin de famille dans un autre type de clinique.
2	SERB_34G = 2 et SERB_34H = 2 et SERB_34I = 2	Le répondant a répondu « non » aux questions sur le contact avec un médecin de famille dans un autre type de clinique.
ND	SERB_34G = (NSP, R, ND) ou SERB_34H = (NSP, R, ND) ou SERB_34I = (NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à une des questions nécessaires au calcul.

7) Consulté un médecin de famille – travail, école, autre endroit – Variable groupée

Nom de la variable : SERBG34O

Basée sur : SERB_34J, SERB_34K, SERB_34O

Description : Cette variable indique si le répondant a contacté un médecin de famille au travail, à l'école ou à un autre endroit.

Afin de s'assurer que les individus ne sont pas identifiables, des enregistrements ont été groupés.

Valeur de SERBG34O	Condition(s)	Explication
SO	SERB_34J = SO ou SERB_34K = SO ou SERB_34O = SO	Sans objet
1	SERB_34J = 1 ou SERB_34K = 1 ou SERB_34O = 1	Le répondant a répondu « oui » à au moins une des questions sur le contact avec un médecin de famille au travail, à l'école ou à un autre endroit.

2	SERB_34J = 2 et SERB_34K = 2 et SERB_34O = 2	Le répondant a répondu « non » aux questions sur le contact avec un médecin de famille au travail, à l'école ou à un autre endroit.
ND	SERB_34J = (NSP, R, ND) ou SERB_34K = (NSP, R, ND) ou SERB_34O = (NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à une des questions nécessaires au calcul.

8) Consulté un autre médecin – clinique externe – Variable groupée

Nom de la variable : SERBG44F

Basée sur : SERB_44D, SERB_44E, SERB_44F

Description : Cette variable indique si le répondant a contacté un autre médecin dans les types de cliniques externes suivantes : de psychiatrie, de désintoxication ou autre clinique externe d'un hôpital.

Afin de s'assurer que les individus ne sont pas identifiables, des enregistrements ont été groupés.

Valeur de SERBG44F	Condition(s)	Explication
SO	SERB_44D = SO ou SERB_44E = SO ou SERB_44F = SO	Sans objet
1	SERB_44D = 1 ou SERB_44E = 1 ou SERB_44F = 1	Le répondant a répondu « oui » à au moins une des questions sur le contact avec un autre médecin dans une clinique externe.
2	SERB_44D = 2 et SERB_44E = 2 et SERB_44F = 2	Le répondant a répondu « non » aux questions sur le contact avec un autre médecin dans une clinique externe.
ND	SERB_44D = (NSP, R, ND) ou SERB_44E = (NSP, R, ND) ou SERB_44F = (NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à une des questions nécessaires au calcul.

9) Consulté un autre médecin – autre clinique – Variable groupée

Nom de la variable : SERBG44I

Basée sur : SERB_44G, SERB_44H, SERB_44I

Description : Cette variable indique si le répondant a contacté un autre médecin dans les types de cliniques suivantes : sans rendez-vous, avec rendez-vous ou CLSC / Centre de santé communautaire.

Afin de s'assurer que les individus ne sont pas identifiables, des enregistrements ont été groupés.

Valeur de SERBG44I	Condition(s)	Explication
SO	SERB_44G = SO ou SERB_44H = SO ou SERB_44I = SO	Sans objet
1	SERB_44G = 1 ou SERB_44H = 1 ou SERB_44I = 1	Le répondant a répondu « oui » à au moins une des questions sur le contact avec un autre médecin dans un autre type de clinique.
2	SERB_44G = 2 et SERB_44H = 2 et SERB_44I = 2	Le répondant a répondu « non » aux questions sur le contact avec un autre médecin dans un autre type de clinique.
ND	SERB_44G = (NSP, R, ND) ou SERB_44H = (NSP, R, ND) ou SERB_44I = (NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à une des questions nécessaires au calcul.

10) Consulté un autre médecin – travail, école, autre endroit – Variable groupée**Nom de la variable :** SERBG44O**Basée sur :** SERB_44J, SERB_44K, SERB_44O**Description :** Cette variable indique si le répondant a contacté un autre médecin au travail, à l'école ou à un autre endroit.

Afin de s'assurer que les individus ne sont pas identifiables, des enregistrements ont été groupés.

Valeur de SERBG44O	Condition(s)	Explication
SO	SERB_44J = SO ou SERB_44K = SO ou SERB_44O = SO	Sans objet
1	SERB_44J = 1 ou SERB_44K = 1 ou SERB_44O = 1	Le répondant a répondu « oui » à au moins une des questions sur le contact avec un autre médecin au travail, à l'école ou à un autre endroit.
2	SERB_44J = 2 et SERB_44K = 2 et SERB_44O = 2	Le répondant a répondu « non » aux questions sur le contact avec un autre médecin au travail, à l'école ou à un autre endroit.
ND	SERB_44J = (NSP, R, ND) ou SERB_44K = (NSP, R, ND) ou SERB_44O = (NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à une des questions nécessaires au calcul.

11) Consulté un psychologue – clinique externe – Variable groupée**Nom de la variable :** SERBG54F**Basée sur :** SERB_54D, SERB_54E, SERB_54F**Description :** Cette variable indique si le répondant a contacté un psychologue dans les types de cliniques externes suivantes : de psychiatrie, de désintoxication ou autre clinique externe d'un hôpital.

Afin de s'assurer que les individus ne sont pas identifiables, des enregistrements ont été groupés.

Valeur de SERBG54F	Condition(s)	Explication
SO	SERB_54D = SO ou SERB_54E = SO ou SERB_54F = SO	Sans objet
1	SERB_54D = 1 ou SERB_54E = 1 ou SERB_54F = 1	Le répondant a répondu « oui » à au moins une des questions sur le contact avec un psychologue dans une clinique externe.
2	SERB_54D = 2 et SERB_54E = 2 et SERB_54F = 2	Le répondant a répondu « non » aux questions sur le contact avec un psychologue dans une clinique externe.
ND	SERB_54D = (NSP, R, ND) ou SERB_54E = (NSP, R, ND) ou SERB_54F = (NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à une des questions nécessaires au calcul.

12) Consulté un psychologue – autre clinique – Variable groupée**Nom de la variable :** SERBG54I**Basée sur :** SERB_54G, SERB_54H, SERB_54I**Description :** Cette variable indique si le répondant a contacté un psychologue dans les types de cliniques suivantes : sans rendez-vous, avec rendez-vous ou CLSC / Centre de santé communautaire.

Afin de s'assurer que les individus ne sont pas identifiables, des enregistrements ont été groupés.

Valeur de SERBG54I	Condition(s)	Explication
SO	SERB_54G = SO ou SERB_54H = SO ou SERB_54I = SO	Sans objet
1	SERB_54G = 1 ou SERB_54H = 1 ou SERB_54I = 1	Le répondant a répondu « oui » à au moins une des questions sur le contact avec un psychologue dans un autre type de clinique.
2	SERB_54G = 2 et SERB_54H = 2 et SERB_54I = 2	Le répondant a répondu « non » aux questions sur le contact avec un psychologue dans un autre type de clinique.
ND	SERB_54G = (NSP, R, ND) ou SERB_54H = (NSP, R, ND) ou SERB_54I = (NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à une des questions nécessaires au calcul.

13) Consulté un psychologue – travail, école, autre endroit – Variable groupée

Nom de la variable : SERBG54O

Basée sur : SERB_54J, SERB_54K, SERB_54O

Description : Cette variable indique si le répondant a contacté un psychologue au travail, à l'école ou à un autre endroit.

Afin de s'assurer que les individus ne sont pas identifiables, des enregistrements ont été groupés.

Valeur de SERBG54O	Condition(s)	Explication
SO	SERB_54J = SO ou SERB_54K = SO ou SERB_54O = SO	Sans objet
1	SERB_54J = 1 ou SERB_54K = 1 ou SERB_54O = 1	Le répondant a répondu « oui » à au moins une des questions sur le contact avec un psychologue au travail, à l'école ou à un autre endroit.
2	SERB_54J = 2 et SERB_54K = 2 et SERB_54O = 2	Le répondant a répondu « non » aux questions sur le contact avec un psychologue au travail, à l'école ou à un autre endroit.
ND	SERB_54J = (NSP, R, ND) ou SERB_54K = (NSP, R, ND) ou SERB_54O = (NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à une des questions nécessaires au calcul.

14) Consulté une infirmière – clinique externe – Variable groupée

Nom de la variable : SERBG64F

Basée sur : SERB_64D, SERB_64E, SERB_64F

Description : Cette variable indique si le répondant a contacté une infirmière dans les types de cliniques externes suivantes : de psychiatrie, de désintoxication ou autre clinique externe d'un hôpital.

Afin de s'assurer que les individus ne sont pas identifiables, des enregistrements ont été groupés.

Valeur de SERBG64F	Condition(s)	Explication
SO	SERB_64D = SO ou SERB_64E = SO ou SERB_64F = SO	Sans objet
1	SERB_64D = 1 ou SERB_64E = 1 ou SERB_64F = 1	Le répondant a répondu « oui » à au moins une des questions sur le contact avec une infirmière dans une clinique externe.

2	SERB_64D = 2 et SERB_64E = 2 et SERB_64F = 2	Le répondant a répondu « non » aux questions sur le contact avec une infirmière dans une clinique externe.
ND	SERB_64D = (NSP, R, ND) ou SERB_64E = (NSP, R, ND) ou SERB_64F = (NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à une des questions nécessaires au calcul.

15) Consulté une infirmière – autre clinique – Variable groupée

Nom de la variable : SERBG64I

Basée sur : SERB_64G, SERB_64H, SERB_64I

Description : Cette variable indique si le répondant a contacté une infirmière dans les types de cliniques suivantes : sans rendez-vous, avec rendez-vous ou CLSC / Centre de santé communautaire.

Afin de s'assurer que les individus ne sont pas identifiables, des enregistrements ont été groupés.

Valeur de SERBG64I	Condition(s)	Explication
SO	SERB_64G = SO ou SERB_64H = SO ou SERB_64I = SO	Sans objet
1	SERB_64G = 1 ou SERB_64H = 1 ou SERB_64I = 1	Le répondant a répondu « oui » à au moins une des questions sur le contact avec une infirmière dans un autre type de clinique.
2	SERB_64G = 2 et SERB_64H = 2 et SERB_64I = 2	Le répondant a répondu « non » aux questions sur le contact avec une infirmière dans un autre type de clinique.
ND	SERB_64G = (NSP, R, ND) ou SERB_64H = (NSP, R, ND) ou SERB_64I = (NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à une des questions nécessaires au calcul.

16) Consulté une infirmière – travail, école, autre endroit – Variable groupée

Nom de la variable : SERBG64O

Basée sur : SERB_64J, SERB_64K, SERB_64O

Description : Cette variable indique si le répondant a contacté une infirmière au travail, à l'école ou à un autre endroit.

Afin de s'assurer que les individus ne sont pas identifiables, des enregistrements ont été groupés.

Valeur de SERBG64O	Condition(s)	Explication
SO	SERB_64J = SO ou SERB_64K = SO ou SERB_64O = SO	Sans objet
1	SERB_64J = 1 ou SERB_64K = 1 ou SERB_64O = 1	Le répondant a répondu « oui » à au moins une des questions sur le contact avec une infirmière au travail, à l'école ou à un autre endroit.
2	SERB_64J = 2 et SERB_64K = 2 et SERB_64O = 2	Le répondant a répondu « non » aux questions sur le contact avec une infirmière au travail, à l'école ou à un autre endroit.
ND	SERB_64J = (NSP, R, ND) ou SERB_64K = (NSP, R, ND) ou SERB_64O = (NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à une des questions nécessaires au calcul.

17) Consulté un travailleur social – clinique externe – Variable groupée**Nom de la variable :** SERBG74F**Basée sur :** SERB_74D, SERB_74E, SERB_74F**Description :** Cette variable indique si le répondant a contacté un travailleur social dans les types de cliniques externes suivantes : de psychiatrie, de désintoxication ou autre clinique externe d'un hôpital.

Afin de s'assurer que les individus ne sont pas identifiables, des enregistrements ont été groupés.

Valeur de SERBG74F	Condition(s)	Explication
SO	SERB_74D = SO ou SERB_74E = SO ou SERB_74F = SO	Sans objet
1	SERB_74D = 1 ou SERB_74E = 1 ou SERB_74F = 1	Le répondant a répondu « oui » à au moins une des questions sur le contact avec un travailleur social dans une clinique externe.
2	SERB_74D = 2 et SERB_74E = 2 et SERB_74F = 2	Le répondant a répondu « non » aux questions sur le contact avec un travailleur social dans une clinique externe.
ND	SERB_74D = (NSP, R, ND) ou SERB_74E = (NSP, R, ND) ou SERB_74F = (NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à une des questions nécessaires au calcul.

18) Consulté un travailleur social – autre clinique – Variable groupée**Nom de la variable :** SERBG74I**Basée sur :** SERB_74G, SERB_74H, SERB_74I**Description :** Cette variable indique si le répondant a contacté un travailleur social dans les types de cliniques suivantes : sans rendez-vous, avec rendez-vous ou CLSC / Centre de santé communautaire.

Afin de s'assurer que les individus ne sont pas identifiables, des enregistrements ont été groupés.

Valeur de SERBG74I	Condition(s)	Explication
SO	SERB_74G = SO ou SERB_74H = SO ou SERB_74I = SO	Sans objet
1	SERB_74G = 1 ou SERB_74H = 1 ou SERB_74I = 1	Le répondant a répondu « oui » à au moins une des questions sur le contact avec un travailleur social dans un autre type de clinique.
2	SERB_74G = 2 et SERB_74H = 2 et SERB_74I = 2	Le répondant a répondu « non » aux questions sur le contact avec un travailleur social dans un autre type de clinique.
ND	SERB_74G = (NSP, R, ND) ou SERB_74H = (NSP, R, ND) ou SERB_74I = (NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à une des questions nécessaires au calcul.

19) Consulté un travailleur social – travail, école, autre endroit – Variable groupée**Nom de la variable :** SERBG74O**Basée sur :** SERB_74J, SERB_74K, SERB_74O**Description :** Cette variable indique si le répondant a contacté un travailleur social au travail, à l'école ou à un autre endroit.

Afin de s'assurer que les individus ne sont pas identifiables, des enregistrements ont été groupés.

Valeur de SERBG74O	Condition(s)	Explication
SO	SERB_74J = SO ou SERB_74K = SO ou SERB_74O = SO	Sans objet
1	SERB_74J = 1 ou SERB_74K = 1 ou SERB_74O = 1	Le répondant a répondu « oui » à au moins une des questions sur le contact avec un travailleur social au travail, à l'école ou à un autre endroit.
2	SERB_74J = 2 et SERB_74K = 2 et SERB_74O = 2	Le répondant a répondu « non » aux questions sur le contact avec un travailleur social au travail, à l'école ou à un autre endroit.
ND	SERB_74J = (NSP, R, ND) ou SERB_74K = (NSP, R, ND) ou SERB_74O = (NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à une des questions nécessaires au calcul.

20) Consulté un conseiller religieux – clinique externe – Variable groupée

Nom de la variable : SERBG84F

Basée sur : SERB_84D, SERB_84E, SERB_84F

Description : Cette variable indique si le répondant a contacté un conseiller religieux dans les types de cliniques externes suivantes : de psychiatrie, de désintoxication ou autre clinique externe d'un hôpital.

Afin de s'assurer que les individus ne sont pas identifiables, des enregistrements ont été groupés.

Valeur de SERBG84F	Condition(s)	Explication
SO	SERB_84D = SO ou SERB_84E = SO ou SERB_84F = SO	Sans objet
1	SERB_84D = 1 ou SERB_84E = 1 ou SERB_84F = 1	Le répondant a répondu « oui » à au moins une des questions sur le contact avec un conseiller religieux dans une clinique externe.
2	SERB_84D = 2 et SERB_84E = 2 et SERB_84F = 2	Le répondant a répondu « non » aux questions sur le contact avec un conseiller religieux dans une clinique externe.
ND	SERB_84D = (NSP, R, ND) ou SERB_84E = (NSP, R, ND) ou SERB_84F = (NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à une des questions nécessaires au calcul.

21) Consulté un conseiller religieux – autre clinique – Variable groupée

Nom de la variable : SERBG84I

Basée sur : SERB_84G, SERB_84H, SERB_84I

Description : Cette variable indique si le répondant a contacté un conseiller religieux dans les types de cliniques suivantes : sans rendez-vous, avec rendez-vous ou CLSC / Centre de santé communautaire.

Afin de s'assurer que les individus ne sont pas identifiables, des enregistrements ont été groupés.

Valeur de SERBG84I	Condition(s)	Explication
SO	SERB_84G = SO ou SERB_84H = SO ou SERB_84I = SO	Sans objet
1	SERB_84G = 1 ou SERB_84H = 1 ou SERB_84I = 1	Le répondant a répondu « oui » à au moins une des questions sur le contact avec un conseiller religieux dans un autre type de clinique.

2	SERB_84G = 2 et SERB_84H = 2 et SERB_84I = 2	Le répondant a répondu « non » aux questions sur le contact avec un conseiller religieux dans un autre type de clinique.
ND	SERB_84G = (NSP, R, ND) ou SERB_84H = (NSP, R, ND) ou SERB_84I = (NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à une des questions nécessaires au calcul.

22) Consulté un conseiller religieux – travail, école, autre endroit – Variable groupée

Nom de la variable : SERBG84O

Basée sur : SERB_84J, SERB_84K, SERB_84O

Description : Cette variable indique si le répondant a contacté un conseiller religieux au travail, à l'école ou à un autre endroit.

Afin de s'assurer que les individus ne sont pas identifiables, des enregistrements ont été groupés.

Valeur de SERBG84O	Condition(s)	Explication
SO	SERB_84J = SO ou SERB_84K = SO ou SERB_84O = SO	Sans objet
1	SERB_84J = 1 ou SERB_84K = 1 ou SERB_84O = 1	Le répondant a répondu « oui » à au moins une des questions sur le contact avec un conseiller religieux au travail, à l'école ou à un autre endroit.
2	SERB_84J = 2 et SERB_84K = 2 et SERB_84O = 2	Le répondant a répondu « non » aux questions sur le contact avec un conseiller religieux au travail, à l'école ou à un autre endroit.
ND	SERB_84J = (NSP, R, ND) ou SERB_84K = (NSP, R, ND) ou SERB_84O = (NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à une des questions nécessaires au calcul.

23) Consulté un autre professionnel – clinique externe – Variable groupée

Nom de la variable : SERBG94F

Basée sur : SERB_94D, SERB_94E, SERB_94F

Description : Cette variable indique si le répondant a contacté un autre professionnel dans les types de cliniques externes suivantes : de psychiatrie, de désintoxication ou autre clinique externe d'un hôpital.

Afin de s'assurer que les individus ne sont pas identifiables, des enregistrements ont été groupés.

Valeur de SERBG94F	Condition(s)	Explication
SO	SERB_94D = SO ou SERB_94E = SO ou SERB_94F = SO	Sans objet
1	SERB_94D = 1 ou SERB_94E = 1 ou SERB_94F = 1	Le répondant a répondu « oui » à au moins une des questions sur le contact avec un autre professionnel dans une clinique externe.
2	SERB_94D = 2 et SERB_94E = 2 et SERB_94F = 2	Le répondant a répondu « non » aux questions sur le contact avec un autre professionnel dans une clinique externe.
ND	SERB_94D = (NSP, R, ND) ou SERB_94E = (NSP, R, ND) ou SERB_94F = (NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à une des questions nécessaires au calcul.

24) Consulté un autre professionnel – autre clinique – Variable groupée

Nom de la variable : SERBG94I

Basée sur : SERB_94G, SERB_94H, SERB_94I

Description : Cette variable indique si le répondant a contacté un autre professionnel dans les types de cliniques suivantes : sans rendez-vous, avec rendez-vous ou CLSC / Centre de santé communautaire.

Afin de s'assurer que les individus ne sont pas identifiables, des enregistrements ont été groupés.

Valeur de SERBG94I	Condition(s)	Explication
SO	SERB_94G = SO ou SERB_94H = SO ou SERB_94I = SO	Sans objet
1	SERB_94G = 1 ou SERB_94H = 1 ou SERB_94I = 1	Le répondant a répondu « oui » à au moins une des questions sur le contact avec un autre professionnel dans un autre type de clinique.
2	SERB_94G = 2 et SERB_94H = 2 et SERB_94I = 2	Le répondant a répondu « non » aux questions sur le contact avec un autre professionnel dans un autre type de clinique.
ND	SERB_94G = (NSP, R, ND) ou SERB_94H = (NSP, R, ND) ou SERB_94I = (NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à une des questions nécessaires au calcul.

25) Consulté un autre professionnel – travail, école, autre endroit – Variable groupée

Nom de la variable : SERBG94O

Basée sur : SERB_94J, SERB_94K, SERB_94O

Description : Cette variable indique si le répondant a contacté un autre professionnel au travail, à l'école ou à un autre endroit.

Afin de s'assurer que les individus ne sont pas identifiables, des enregistrements ont été groupés.

Valeur de SERBG94O	Condition(s)	Explication
SO	SERB_94J = SO ou SERB_94K = SO ou SERB_94O = SO	Sans objet
1	SERB_94J = 1 ou SERB_94K = 1 ou SERB_94O = 1	Le répondant a répondu « oui » à au moins une des questions sur le contact avec un autre professionnel au travail, à l'école ou à un autre endroit.
2	SERB_94J = 2 et SERB_94K = 2 et SERB_94O = 2	Le répondant a répondu « non » aux questions sur le contact avec un autre professionnel au travail, à l'école ou à un autre endroit.
ND	SERB_94J = (NSP, R, ND) ou SERB_94K = (NSP, R, ND) ou SERB_94O = (NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à une des questions nécessaires au calcul.

26) Indicateur signalant si la personne a déjà été hospitalisée pendant une nuit ou plus au cours de sa vie pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue

Nom de la variable : SERBFLHO

Basée sur : SERB_02, DEPB_C5, DEPB_ABA, DEPB_DBA, DEPB_87, MIAB_48, PADB_65, SOPB_39, AGPB_38

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà été hospitalisé pendant une nuit ou plus, dans n'importe quel genre de centre de soins de santé pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue.

Valeur de SERBFLHO	Condition(s)	Explication
1	SERB_02 = 1 ou DEPB_C5 = 1 ou DEPB_ABA = 1 ou DEPB_DBA = 1 ou DEPB_87 = 1 ou MIAB_48 = 1 ou PADB_65 = 1 ou SOPB_39 = 1 ou AGPB_38 = 1	Le répondant a été hospitalisé une nuit ou plus pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue.
2	SERB_02 = 2	Le répondant n'a jamais été hospitalisé une nuit ou plus pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue.
ND	(SERB_02 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

27) Nombre total de jours passés à l'hôpital au cours de la vie pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue - Variable groupée

Nom de la variable : SERBGHDY

Basée sur : SERB_05A, SERB_05C, SERB_05D, SERB_05E, SERB_05F, SERB_05G, SERB_07, SERB_07A, SERB_07B, SERB_07C, SERB_07D, SERBT5DY, SERBT7DY

Description : Cette variable indique la durée totale de l'hospitalisation pendant une nuit ou plus dans n'importe quel genre de centre de soins de santé pour des problèmes liés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue. Ceci représente le nombre total de jours d'hospitalisation pour des problèmes de ce type au cours de la vie.

Des enregistrements ont été regroupés afin d'assurer la confidentialité. Voir dictionnaire de données.

27a) Variable temporaire - Répondants hospitalisés une seule fois au cours de la vie

Nom de la variable : SERBT5DY

Basée sur : SERB_05A, SERB_05C, SERB_05D, SERB_05E, SERB_05F, SERB_05G

Valeur de SERBT5DY	Condition(s)	Explication
SO	SERB_05A = SO	Le répondant n'a pas eu d'hospitalisation ou a été hospitalisé plus d'une fois.
ND	(SERB_05C = NSP, R, ND) ou (SERB_05D = NSP, R, ND) ou (SERB_05E = NSP, R, ND) ou (SERB_05F = NSP, R, ND) ou (SERB_05G = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

Valeur dans SERB_05D	SERB_05C = 1	Nombre total de jours passés à l'hôpital pour des problèmes liés à la santé mentale : répondants hospitalisés une seule fois au cours de la vie. Nombre de jours = nombre de jours déclarés
Valeur dans SERB_05E * 7	SERB_05C = 2	Nombre total de jours passés à l'hôpital pour des problèmes reliés à la santé mentale : répondants hospitalisés une seule fois au cours de la vie. Nombre de jours = nombre de semaines * 7
Valeur dans SERB_05F * 30	SERB_05C = 3	Nombre total de jours passés à l'hôpital pour des problèmes liés à la santé mentale : répondants hospitalisés une seule fois au cours de la vie. Nombre de jours = nombre de mois * 30
Valeur dans SERB_05G * 365	SERB_05C = 4	Nombre total de jours passés à l'hôpital pour des problèmes reliés à la santé mentale : répondants hospitalisés une seule fois au cours de la vie. Nombre de jours = nombre d'années * 365

27b) Variable temporaire - Répondants hospitalisés plus d'une fois au cours de la vie**Nom de la variable :** SERBT7DY**Basée sur :** SERB_07, SERB_07A, SERB_07B, SERB_07C, SERB_07D

Valeur de SERBT7DY	Condition(s)	Explication
SO	SERB_07 = SO	Le répondant n'a jamais été hospitalisé ou a rapporté une seule hospitalisation.
ND	(SERB_07 = NSP, R, ND) ou (SERB_07A = NSP, R, ND) ou (SERB_07B = NSP, R, ND) ou (SERB_07C = NSP, R, ND) ou (SERB_07D = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
Valeur dans SERB_07A	SERB_07 = 1	Nombre total de jours passés à l'hôpital pour des problèmes liés à la santé mentale : répondants comptant plus d'une hospitalisation au cours de la vie. Nombre de jours = nombre de jours déclarés

Valeur dans SERB_07B * 7	SERB_07 = 2	Nombre total de jours passés à l'hôpital pour des problèmes liés à la santé mentale : répondants comptant plus d'une hospitalisation au cours de la vie. Nombre de jours = nombre de semaines * 7
Valeur dans SERB_07C * 30	SERB_07 = 3	Nombre total de jours passés à l'hôpital pour des problèmes liés à la santé mentale : répondants comptant plus d'une hospitalisation au cours de la vie. Nombre de jours = nombre de mois * 30
Valeur dans SERB_07D * 365	SERB_07 = 4	Nombre total de jours passés à l'hôpital pour des problèmes liés à la santé mentale : répondants comptant plus d'une hospitalisation au cours de la vie. Nombre de jours = nombre d'années * 365

Évaluation du nombre total de jours passés à l'hôpital pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue

Valeur de SERBDHDY	Condition(s)	Explication
SO	SERBT7DY = SO et SERBT5DY = SO	Le répondant n'a pas été hospitalisé pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale, ou à la consommation d'alcool ou de drogue.
ND	SERBT7DY = ND ou SERBT5DY = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à une des variables dérivées nécessaire au calcul.
Valeur dans SERBT7DY	$1 \leq \text{SERBT7DY} < \text{SO}$	Nombre total de jours passés à l'hôpital pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale, ou à la consommation d'alcool ou de drogue (pour les répondants comptant plus d'une hospitalisation de ce genre au cours de la vie).
Valeur dans SERBT5DY	$1 \leq \text{SERBT5DY} < \text{SO}$	Nombre total de jours passés à l'hôpital au cours de la vie pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale, ou à la consommation d'alcool ou de drogue (pour les répondants ne comptant qu'une seule hospitalisation de ce genre au cours de la vie).

28) Indicateur d'hospitalisation au cours des 12 derniers mois pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool et de drogue

Nom de la variable : SERBFHYR

Basée sur : SERB_05A, SERB_08

Description : Cette variable indique si le répondant a été hospitalisé une nuit ou plus au cours des 12 derniers mois dans n'importe quel genre de centre de soins de santé pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue.

Valeur de SERBDHYR	Condition(s)	Explication
ND	(SERB_05A = NSP, R, ND) ou (SERB_08 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
1	(SERB_05A = 1, 2, 3) ou (SERB_08 = 1)	Le répondant a été hospitalisé une nuit ou plus au cours des 12 derniers mois.
2	SERB_05A = 4 ou SERB_08 = 2 ou (SERB_05A = SO et SERB_08 = SO)	Le répondant n'a pas été hospitalisé une nuit ou plus au cours des 12 derniers mois.

29) Indicateur de consultation, au cours de la vie, de professionnel (n'importe quel) au sujet de problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue

Nom de la variable : SERBFLAP

Basée sur : SERB_10I

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà consulté un professionnel au cours de sa vie au sujet de problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue.

Nota : Cette variable est similaire à HCUAFHPC de l'ESCC Cycle 1.1. Cette variable du premier cycle est restreinte aux 12 derniers mois et se réfère à la santé émotionnelle ou mentale; elle exclut la mention explicite de l'alcool et des drogues. Les questions de l'ESCC Cycle 1.1 comprennent plusieurs catégories de professionnels de la santé. D'autres variables mesurant l'utilisation des services de santé existent : ESCC Cycle 1.1 : HCUAFHPC; ENSP Cycle 4 : HCC0DHPC; ENSP Cycle 3 : HCC8DHPC; ENSP Cycle 2 : HCC6DHPC; et ENSP Cycle 1 : HCC4DHPC.

Valeur de SERBFLAP	Condition(s)	Explication
1	SERB_10I = 2	Le répondant a consulté au moins une fois dans sa vie un professionnel pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue.
2	SERB_10I = 1	Le répondant n'a jamais consulté de professionnel au sujet de problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue.
ND	(SERB_10I = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

30) Indicateur d'utilisation de toute ressource pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue au cours de la vie

Nom de la variable : SERBFLRU

Basée sur : SERB_02, SERB_10I, SERB_AOA, SERB_A1A, SERB_A2A

Description : Cette variable indique si le répondant a déjà utilisé des ressources pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue. Spécifiquement, a déjà passé la nuit à l'hôpital ou a déjà consulté un professionnel, a utilisé un groupe de soutien ou de discussion sur Internet, assisté aux réunions d'un groupe d'entraide ou utilisé une ligne d'aide téléphonique au cours de sa vie.

Valeur de SERBFLRU	Condition(s)	Explication
1	(SERB_02 = 1, SO) ou SERB_10I = 2 ou SERB_AOA = 1 ou SERB_A1A = 1 ou SERB_A2A = 1	Le répondant a utilisé au moins une ressource pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue.
2	SERB_02 = 2 et SERB_10I = 1 et SERB_AOA = 2 et SERB_A1A = 2 et SERB_A2A = 2	Le répondant n'a jamais utilisé de ressource pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue.
ND	(SERB_02 = NSP, R, ND) ou (SERB_10I = NSP, R, ND) ou (SERB_AOA = NSP, R, ND) ou (SERB_A1A = NSP, R, ND) ou (SERB_A2A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

31) Nombre de catégories de ressources utilisées, au cours de la vie, pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue

Nom de la variable : SERBDRCT

Basée sur : SERB_02, SERB_10A, SERB_10B, SERB_10C, SERB_10D, SERB_10E, SERB_10F, SERB_10G, SERB_10H, SERB_AOA, SERB_A1A, SERB_A2A

Description : Cette variable indique le nombre de différents types de ressources utilisées au cours de la vie pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue.

Reformatages temporaires

Reformatage	Explication
Si SERB_02 = 2 alors SERRQ002 = 0 Si SERB_02 = SO alors SERRQ002 = 1	A été hospitalisé pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue : reformater Non à 0 et SO à 1.
Si SERB_10A = 2 alors SERRQ010A = 0 Si SERB_10B = 2 alors SERRQ010B = 0 Si SERB_10C = 2 alors SERRQ010C = 0 Si SERB_10D = 2 alors SERRQ010D = 0 Si SERB_10E = 2 alors SERRQ010E = 0 Si SERB_10F = 2 alors SERRQ010F = 0 Si SERB_10G = 2 alors SERRQ010G = 0 Si SERB_10H = 2 alors SERRQ010H = 0	A consulté un professionnel pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue : reformater Non à 0.

Si SERB_AOA = 2 alors SERRQ100A = 0	A utilisé un groupe de soutien ou de discussion sur Internet pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue : reformater Non à 0.
Si SERB_A1A = 2 alors SERRQ101A = 0	A utilisé un groupe d'entraide pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue : reformater Non à 0.
Si SERB_A2A = 2 alors SERRQ102A = 0	A utilisé une ligne d'aide téléphonique pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue : reformater Non à 0.

Valeur de SERBDRCT	Condition(s)	Explication
ND	(SERB_02 = NSP, R, ND) ou (SERB_10A = NSP, R, ND) ou (SERB_10B = NSP, R, ND) ou (SERB_10C = NSP, R, ND) ou (SERB_10D = NSP, R, ND) ou (SERB_10E = NSP, R, ND) ou (SERB_10F = NSP, R, ND) ou (SERB_10G = NSP, R, ND) ou (SERB_10H = NSP, R, ND) ou (SERB_AOA = NSP, R, ND) ou (SERB_A1A = NSP, R, ND) ou (SERB_A2A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
SERRQ002 + SERRQ010A + SERRQ010B + SERRQ010C + SERRQ010D + SERRQ010E + SERRQ010F + SERRQ010G + SERRQ010H + SERRQ100A + SERRQ101A + SERRQ102A (min : 0; max : 12)	(SERRQ002 = 0, 1) et (SERRQ010A = 0, 1) et (SERRQ010B = 0, 1) et (SERRQ010C = 0, 1) et (SERRQ010D = 0, 1) et (SERRQ010E = 0, 1) et (SERRQ010F = 0, 1) et (SERRQ010G = 0, 1) et (SERRQ010H = 0, 1) et (SERRQ100A = 0, 1) et (SERRQ101A = 0, 1) et (SERRQ102A = 0, 1)	Nombre de ressources utilisées au cours de la vie pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue.

32) Indicateur d'utilisation de toute ressource pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue au cours des 12 derniers mois

Nom de la variable : SERBFYRU

Basée sur : SERB_05A, SERB_08, SERB_21, SERB_31, SERB_41, SERB_51, SERB_61, SERB_71, SERB_81, SERB_91, SERB_AOB, SERB_A1C, SERB_A2C

Description : Cette variable indique si le répondant a utilisé au cours des 12 derniers mois des ressources pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue.

Spécifiquement, a déjà passé la nuit à l'hôpital ou a déjà consulté un professionnel, a utilisé un groupe de soutien ou de discussion sur Internet, assisté aux réunions d'un groupe d'entraide ou utilisé une ligne d'aide téléphonique au cours des 12 mois précédents l'enquête.

Valeur de SERBFYRU	Condition(s)	Explication
1	1 <= SERB_05A <= 3 ou SERB_08 = 1 ou 1 <= SERB_21 <= 3 ou 1 <= SERB_31 <= 3 ou 1 <= SERB_41 <= 5 ou	Le répondant a utilisé au moins une ressource au cours des 12 derniers mois pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de

	1 <= SERB_51 <= 3 ou 1 <= SERB_61 <= 3 ou 1 <= SERB_71 <= 3 ou 1 <= SERB_81 <= 3 ou 1 <= SERB_91 <= 13 ou 1 <= SERB_AOB <= 3 ou 1 <= SERB_A1C <= 3 ou 1 <= SERB_A2C <= 3	drogue.
2	(SERB_05A = 4, SO) et (SERB_08 = 2, SO) et (SERB_21 = 4, SO) et (SERB_31 = 4, SO) et (SERB_41 = 6, SO) et (SERB_51 = 4, SO) et (SERB_61 = 4, SO) et (SERB_71 = 4, SO) et (SERB_81 = 4, SO) et (SERB_91 = 14, SO) et (SERB_AOB = 4, SO) et (SERB_A1C = 4, SO) et (SERB_A2C = 4, SO)	Le répondant n'a pas utilisé de ressource au cours des 12 derniers mois pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue.
ND	(SERB_05A = NSP, R, ND) ou (SERB_08 = NSP, R, ND) ou (SERB_21 = NSP, R, ND) ou (SERB_31 = NSP, R, ND) ou (SERB_41 = NSP, R, ND) ou (SERB_51 = NSP, R, ND) ou (SERB_61 = NSP, R, ND) ou (SERB_71 = NSP, R, ND) ou (SERB_81 = NSP, R, ND) ou (SERB_91 = NSP, R, ND) ou (SERB_AOB = NSP, R, ND) ou (SERB_A1C = NSP, R, ND) ou (SERB_A2C = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

33) Nombre de catégories de ressources utilisées au cours des 12 derniers mois pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue

Nom de la variable : SERBDYCT

Basée sur : SERB_05A, SERB_08, SERB_21, SERB_31, SERB_41, SERB_51, SERB_61, SERB_71, SERB_81, SERB_91, SERB_AOB, SERB_A1C, SERB_A2C

Description : Cette variable indique le nombre de différents types de ressources utilisées au cours des 12 derniers mois pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue.

Reformatages temporaires

Reformatage	Explication
Si (SERB_05A = 4, SO) alors SERRQ005A = 0 Si 1 <= SERB_05A <= 3 alors SERRQ005A = 1 Si (SERB_08 = 2, SO) alors SERRQ008 = 0	Recoder 4 (« il y a plus d'un an ») et SO à 0 (Non). Recoder 1, 2, 3 (« Durant le dernier mois » à « il y a entre 7-12 mois ») à 1 (Oui). Recoder 2, SO à 0 (Non).
Si (SERB_21 = 4, SO) alors SERRQ021 = 0 Si 1 <= SERB_21 <= 3 alors SERRQ021 = 1	Recoder 4 (« il y a plus d'un an ») et SO à 0 (Non). Recoder 1, 2, 3 (« Durant le dernier mois » à « il y a entre 7-12 mois ») à 1 (Oui).

<p>Si (SERB_31 = 4, SO) alors SERRQ031 = 0 Si 1 <= SERB_31 <= 3 alors SERRQ031 = 1</p> <p>Si (SERB_41 = 6, SO) alors SERRQ041 = 0 Si 1 <= SERB_41 <= 5 alors SERRQ041 = 1</p> <p>Si (SERB_51 = 4, SO) alors SERRQ051 = 0 Si 1 <= SERB_51 <= 3 alors SERRQ051 = 1</p> <p>Si (SERB_61 = 4, SO) alors SERRQ061 = 0 Si 1 <= SERB_61 <= 3 alors SERRQ061 = 1</p> <p>Si (SERB_71 = 4, SO) alors SERRQ071 = 0 Si 1 <= SERB_71 <= 3 alors SERRQ071 = 1</p> <p>Si (SERB_81 = 4, SO) alors SERRQ081 = 0 Si 1 <= SERB_81 <= 3 alors SERRQ081 = 1</p>	<p>Recoder 6 (« aucun » il y a plus d'un an) et SO à 0 (Non). Recoder 1 à 5 (a rapporté avoir consulté un autre type de médecin au cours des 12 derniers mois) à 1 (Oui).</p>
<p>Si (SERB_91 = 14, SO) alors SERRQ091 = 0 Si 1 <= SERB_91 <= 13 alors SERRQ091 = 1</p>	<p>Reformater 14 (« aucun ») et SO à 0 (Non). Reformater 1 à 13 à 1 (Oui).</p>
<p>Si (SERB_AOB = 4, SO) alors SERRQ100B = 0 Si 1 <= SERB_AOB <= 3 alors SERRQ100B = 1</p>	<p>Recoder 4 (« il y a plus d'un an ») et SO à 0 (Non). Recoder 1, 2, 3 (« Durant le dernier mois » à « il y a entre 7-12 mois ») à 1 (Oui).</p>
<p>Si (SERB_A1C = 4, SO) alors SERRQ101C = 0 Si 1 <= SERB_A1C <= 3 alors SERRQ101C = 1</p>	<p>Recoder 4 (« il y a plus d'un an ») et SO à 0 (Non). Recoder 1, 2, 3 (« Durant le dernier mois » à « il y a entre 7-12 mois ») à 1 (Oui).</p>
<p>Si (SERB_A2C = 4, SO) alors SERRQ102C = 0 Si 1 <= SERB_A2C <= 3 alors SERRQ102C = 1</p>	<p>Recoder 4 (« il y a plus d'un an ») et SO à 0 (Non). Recoder 1, 2, 3 (« Durant le dernier mois » à « il y a entre 7-12 mois ») à 1 (Oui).</p>

Valeur de SERBDYCT	Condition(s)	Explication
ND	(SERB_05A = NSP, R, ND) ou (SERB_08 = NSP, R, ND) ou (SERB_21 = NSP, R, ND) ou (SERB_31 = NSP, R, ND) ou (SERB_41 = NSP, R, ND) ou (SERB_51 = NSP, R, ND) ou (SERB_61 = NSP, R, ND) ou (SERB_71 = NSP, R, ND) ou (SERB_81 = NSP, R, ND) ou (SERB_91 = NSP, R, ND) ou (SERB_AOB = NSP, R, ND) ou (SERB_A1C = NSP, R, ND) ou (SERB_A2C = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
<p>SERRQ005A + SERRQ008 + SERRQ021 + SERRQ031 + SERRQ041 + SERRQ051 + SERRQ061 + SERRQ071 + SERRQ081 + SERRQ091 + SERRQ100B + SERRQ101C + SERRQ102C</p> <p>(min : 0; max : 12)</p>	<p>(SERRQ005A = 0, 1) et (SERRQ008 = 0, 1) et (SERRQ021 = 0, 1) et (SERRQ031 = 0, 1) et (SERRQ041 = 0, 1) et (SERRQ051 = 0, 1) et (SERRQ061 = 0, 1) et (SERRQ071 = 0, 1) et (SERRQ081 = 0, 1) et (SERRQ091 = 0, 1) et (SERRQ100B = 0, 1) et (SERRQ101C = 0, 1) et (SERRQ102C = 0, 1)</p>	Nombre de ressources utilisées au cours des 12 derniers mois pour des problèmes liés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogue.

34) Indicateur signalant des obstacles à l'obtention de services de santé mentale relatifs à l'accessibilité

Nom de la variable : SERBFACS

Basée sur : SERB_A5A, SERB_A5E, SERB_A5F, SERB_A3

Description : Cet indicateur signale si le répondant a rapporté des besoins de soins de santé mentale perçus comme étant non satisfaits et qui ont trait à l'accessibilité. Les problèmes d'accessibilité sont des obstacles à l'obtention des services de santé pour les émotions, la santé mentale ou la consommation d'alcool ou de drogues tels que le coût, l'absence de moyen de transport ou ne pas savoir comment et où obtenir de l'aide.

Valeur de SERBFACS	Condition(s)	Explication
ND	SERB_A5A = (NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
1	SERB_A5E = 1 ou SERB_A5F = 1	Le répondant n'a pu obtenir les services de santé mentale dont il avait besoin à cause de problèmes d'accès.
2	(SERB_A5E = 2 et SERB_A5F = 2) ou SERB_A3 = 2	Le répondant n'a jamais eu de problèmes d'accès au système de santé mentale.

35) Indicateur signalant les obstacles à l'obtention de services de soins de santé mentale relatifs à l'acceptabilité

Nom de la variable : SERBFACP

Basée sur : SERB_A5A, SERB_A5B, SERB_A5C, SERB_A5D, SERB_A5J, SERB_A5K, SERB_A5L, SERB_A3

Description : Cet indicateur signale si le répondant a rapporté des besoins de soins de santé mentale perçus comme étant non satisfaits et qui ont trait à un problème d'acceptabilité. Les problèmes d'acceptabilité sont ceux où une personne choisit de se passer des soins de santé à cause de demandes concurrentes de son temps ou à cause de son attitude à l'égard de la maladie, des prestataires de soins de santé ou du système de santé. Décider de ne pas se tracasser, ne pas avoir le temps de s'en occuper, préférer s'en occuper soi-même, penser que rien ne pourrait aider ou avoir peur de demander de l'aide sont des exemples de problèmes d'acceptabilité.

Valeur de SERBFACP	Condition(s)	Explication
ND	(SERB_A5A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
1	SERB_A5A = 1 ou SERB_A5B = 1 ou SERB_A5C = 1 ou SERB_A5D = 1 ou SERB_A5J = 1 ou SERB_A5K = 1 ou SERB_A5L = 1	Le répondant n'a pu obtenir les services de santé mentale dont il avait besoin à cause de problèmes d'acceptabilité.
2	(SERB_A5A = 2 et SERB_A5B = 2 et SERB_A5C = 2 et SERB_A5D = 2 et SERB_A5J = 2 et SERB_A5K = 2 et SERB_A5L = 2) ou SERB_A3 = 2	Le répondant n'a jamais eu de difficulté à obtenir des services de santé mentale à cause de problèmes d'acceptabilité.

36) Indicateur signalant des obstacles à l'obtention de services de santé mentale relatifs à la disponibilité

Nom de la variable : SERBFAVA

Basée sur : SERB_A5A, SERB_A5G, SERB_A5H, SERB_A5I, SERB_A3

Description : Cet indicateur signale si le répondant a rapporté des besoins de soins de santé mentale perçus comme étant non satisfaits et qui ont trait à la disponibilité des services. Un temps d'attente trop long ou l'aide nécessaire est non disponible dans la région ou au moment requis sont des exemples de problèmes de disponibilité.

Valeur de SERBFAVA	Condition(s)	Explication
ND	(SERB_A5A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
1	SERB_A5G = 1 ou SERB_A5H = 1 ou SERB_A5I = 1	Le répondant a eu des difficultés à obtenir les services de santé mentale à cause de problèmes de disponibilité.
2	(SERB_A5G = 2 et SERB_A5H = 2 et SERB_A5I = 2) ou SERB_A3 = 2	Le répondant n'a eu aucune difficulté à obtenir les services de santé mentale à cause de problèmes de disponibilité.

Codes de médicaments (1 VD)

Nom de la variable : MEDBG03A à MEDBG03L

Basée sur : MEDBC03A à MEDBC03L

Description : La classification des médicaments se fonde sur le Système de classification anatomique thérapeutique chimique (ATC). Les codes utilisés ici ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament allant de A à Z. Le codage est fourni pour les médicaments.

L'ensemble complet de codes figure dans le fichier maître (MEDBC03A à MEDBC03L). Ils peuvent être obtenus sur demande spéciale.

1. Tube digestif et métabolisme

Formules diététiques pour le traitement d'obésité, excluant les préparations diététiques

Suppléments de minéraux

Préparations d'enzymes

Anti-reflux

Antiflatulents

Digestifs, incluant les enzymes

Antémétiques et antinauséeux

Modificateurs de la motilité intestinale

Purgatifs/laxatifs

Laxatifs - agents de masse

Laxatifs de contact

Laxatifs lubrifiants, émollients

Laxatifs osmotiques

Système génito-urinaire, divers

Cholélithe et cholérétique

Traitement de l'ulcère peptique (antagonistes des récepteurs H2)

Traitement de l'ulcère peptique (autres)

Antiacides

Médicaments utilisés pour le diabète

Médicaments utilisés pour le diabète (insulines)

Médicaments utilisés pour le diabète (hypoglycémiant oraux)

Anti-hypoglycémiques

Autres suppléments de minéraux

Suppléments nutritionnels

Formules diététiques pour le traitement de l'obésité

2. Sang et organes sanguinoformateurs

Anticoagulants

Antiplaquettaires

Préparations antianémiques (fer)

Solutions affectant la balance d'électrolytes (alcalin)

Solutions d'irrigations

3. Système cardio-vasculaire

Vasodilatateurs périphériques

Hémorragiques

Anti-hyperlipidémiques

Médicaments pour les affections cardiaques.

Thérapie cardiaque (glycosides et autres)

Thérapie cardiaque (antiarythmiques)

Thérapie cardiaque (bloqueurs des canaux calciques)

Agents antihypertenseurs

Agents antihypertenseurs (agents bloqueurs bêta)
Agents antihypertenseurs (inhibiteurs de l'enzyme de conversion -IECA)
Agents antihypertenseurs (agents adrénergiques- bloqueurs neuronaux)
Agents antihypertenseurs (bloqueurs alpha)
Agents antihypertenseurs (autres)
Vasodilatateurs (nitrates/nitrites)
Vasodilatateurs (autres)
Diurétiques
Diurétiques (thiazidiques et dérivés)
Diurétiques (dit de l'«anse»)
Diurétiques (d'épargne potassique)

4. Produits dermatologiques

Préparations cutanées/muqueuses
Antibiotiques
Antiviraux
Antifongiques
Autres anti-infectieux
Anesthésiques à usage local/antiprurigineux
Préparations pour le traitement de l'acné
Médicaments contre le psoriasis et protecteurs
Kératolytiques
Kératoplastie
Astringents
Dépigmentation/pigmentation
Anti-inflammatoires (corticostéroïdes)
Protecteurs contre les radiations UV
Préparations dermatologiques diverses

7. Système génito-urinaire et hormones sexuelles

Agents anti-infectieux urinaires
Androgènes
Contraceptifs oraux
Progestatifs
Estrogènes
Gonadotropines
Antispasmodiques génito-urinaires

8. Préparations hormonales systématiques excluant les hormones sexuelles

Hormones
Thérapie aux corticostéroïdes
Hormones hypophysaires et hypothalamiques
Thérapie thyroïdienne/antithyroïdienne
Hormonothérapie thyroïdienne
Préparations antithyroïdes

10. Anti-infectieux généraux pour usage systémique

Antimycosiques pour usage systémique
Agents contre les mycobactéries
Antiviraux pour usage systémique
Aminosides antibactériens
Céphalosporine et produits apparentés
Macrolides
Antibactériens dérivés des quinolones
Sulfamidés
Tétracyclines

Pénicillines
Pénicillines (naturelle)
Pénicillines (résistant à la pénicillinase)
Pénicillines (à large spectre)
Antibactériens divers

12. Agents antinéoplasiques

Antinéoplasiques
Alcoylants
Anti-métabolites
Antinéoplasiques divers
Agents immunosuppresseurs

13. Système musculo-squelettique

Relaxants musculaires
Relaxants musculaires (action centrale)
Relaxants musculaires (association)
Analgésiques/antipyrétiques
Anti-inflammatoires et antirhumatismaux
Préparations augmentant l'excrétion d'acide urique
Préparations de sels d'ou
Produits topiques pour douleurs articulaires et musculaires

14. Système nerveux

Parasympathomimétiques
Anticholinergiques, antimuscariniques/antispasmodiques
Alcaloïdes de l'ergot de seigle
Anticonvulsants
Préparations contre la migraine
Antiparkinsoniens
Alcool
Analgésiques/antipyrétiques (acide salicylique et dérivés)
Analgésiques/antipyrétiques (opiacés)
Analgésiques/antipyrétiques (opiacés-association)
Analgésiques/antipyrétiques (opiacés-Codéine)
Analgésiques/antipyrétiques (divers)
Analgésiques/antipyrétiques (acétaminophène)
Antidépresseurs
Antidépresseurs (inhibiteurs de la monoamine oxydase)
Antidépresseurs (tricycliques)
Antidépresseurs (inhibiteurs de sérotonine)
Antidépresseurs (autres)
Anxiolytiques, sédatifs, hypnotiques
Anxiolytiques (Benzodiazépines demi-vie courte)
Anxiolytiques (Benzodiazépines demi-vie moyenne)
Anxiolytiques (Benzodiazépines demi-vie longue)
Anxiolytiques (autres)
Hypnotiques et sédatifs (barbituriques)
Hypnotiques et sédatifs (autres)
Antipsychotiques (phénothiazine)
Antipsychotiques (autres)
Psychostimulants
Neuroleptiques (lithium)

16. Produits antiparasitaires

Antiprotozoaires (antipaludiques)

18. Système respiratoire

Antihistaminiques (général)
Antihistaminiques (pour usage systémique)
Antihistaminiques (pour usage systémique - autres)
Stimulants respiratoires
Antiallergiques et autres antiasthmatiques (inhalateurs)
Antiasthmatiques (théophylline)
Antiasthmatiques (Agoniste-B)
Antiasthmatiques (autres)

19. Organes sensoriels

Anti-infectieux
Anti-inflammatoire
Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique
Préparations pour le glaucome et miotiques
Mydriatiques
Rince-bouches et gargarismes
Décongestionnants nasaux et systémiques (nasal)
Préparations ophtalmologiques et otologiques
Anti-infectieux (antiviraux)
Anti-infectieux (sulfamidés)
Anti-infectieux (divers)

22. Divers

Agents contre le tabagisme
Métaux lourds - antagonistes
Anesthésiques locaux (parentéraux)
Vaccins
Dérivés de vitamine A
Complexe vitaminique B
Vitamine C
Vitamine D
Vitamine E
Vitamine K
Préparations diverses vitaminiques
Multivitamines
Placebo
Thérapies non classées

24. Médecines douces

Médecines naturelles
Herbes médicinales
Cure de réduction pondérale naturelle
Tisanes
Médecine chinoise
Immuno-antiallergiques naturels
Micro-algues
Protéines
Acides aminés
Nucléosides
Aminés sucrés
Acides gras
Huiles naturelles, épices
Enzymes naturels
Vitamines naturelles

Anti-oxydants
Minéraux naturels
Produits nutritifs
Thérapies alternatives
Thérapies aromatiques
Homéopathie
Médicaments naturels (divers)

26. Produits manquants

Produits et médicaments manquants

Soutien social (4 VD)

La « Medical Outcomes Study (MOS) Social Support Survey » donne des indicateurs de quatre catégories de soutien social. On a réduit un groupe initial de 50 éléments à 19 éléments de soutien fonctionnel couvrant cinq dimensions :

- Soutien émotionnel – l'expression d'une affectivité positive, d'une compréhension empathique et de l'encouragement des expressions des sentiments.
- Soutien informationnel – l'offre de conseils, d'information, d'orientation ou de rétroaction.
- Soutien concret – la prestation d'aide matérielle ou d'aide en terme de comportement.
- Interaction sociale positive – la capacité que les autres personnes ont d'avoir du plaisir avec vous.
- Affection – qui concerne l'expression d'amour et d'affection.

Les analyses empiriques ont montré que les éléments concernant le soutien émotionnel et informationnel devraient être regroupés.

Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, « The MOS Support Survey » (Medical Outcomes Study Social Support Survey), *Social Sciences & Medicine*; 32: 705 - 714

Reformatages temporaires

Reformatage	Explication
Si SSMB_02 <= 5 alors SSMB_02 = (SSMB_02 - 1) Si SSMB_03 <= 5 alors SSMB_03 = (SSMB_03 - 1) Si SSMB_04 <= 5 alors SSMB_04 = (SSMB_04 - 1) Si SSMB_05 <= 5 alors SSMB_05 = (SSMB_05 - 1) Si SSMB_06 <= 5 alors SSMB_06 = (SSMB_06 - 1) Si SSMB_07 <= 5 alors SSMB_07 = (SSMB_07 - 1) Si SSMB_08 <= 5 alors SSMB_08 = (SSMB_08 - 1) Si SSMB_09 <= 5 alors SSMB_09 = (SSMB_09 - 1) Si SSMB_10 <= 5 alors SSMB_10 = (SSMB_10 - 1) Si SSMB_11 <= 5 alors SSMB_11 = (SSMB_11 - 1) Si SSMB_12 <= 5 alors SSMB_12 = (SSMB_12 - 1) Si SSMB_13 <= 5 alors SSMB_13 = (SSMB_13 - 1) Si SSMB_14 <= 5 alors SSMB_14 = (SSMB_14 - 1) Si SSMB_15 <= 5 alors SSMB_15 = (SSMB_15 - 1) Si SSMB_16 <= 5 alors SSMB_16 = (SSMB_16 - 1) Si SSMB_17 <= 5 alors SSMB_17 = (SSMB_17 - 1) Si SSMB_18 <= 5 alors SSMB_18 = (SSMB_18 - 1) Si SSMB_19 <= 5 alors SSMB_19 = (SSMB_19 - 1) Si SSMB_20 <= 5 alors SSMB_20 = (SSMB_20 - 1)	Modifier l'échelle des réponses de 1 à 5, à 0 à 4 pour les questions avec catégories de réponses. Où 0 renvoie à « jamais » et 4 renvoie à « tout le temps ».

1) Soutien concret – sous-échelle MOS

Nom de la variable : SSMBDTNG

Basée sur : SSMB_02, SSMB_05, SSMB_12, SSMB_15

Description : La variable détermine le soutien concret dont dispose le répondant. On a demandé au répondant si quelqu'un pourrait l'aider s'il était confiné au lit, pour aller chez le médecin, pour lui préparer des repas ou pour faire les travaux ménagers.

Valeur de SSMBDTNG	Condition(s)	Explication
ND	(SSMB_02 = NSP, R, ND) ou (SSMB_05 = NSP, R, ND) ou (SSMB_12 = NSP, R, ND) ou (SSMB_15 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

SSMB_02 + SSMB_05 + SSMB_12 + SSMB_15 (min : 0; max : 16)	0 <= SSMB_02 <= 4 et 0 <= SSMB_05 <= 4 et 0 <= SSMB_12 <= 4 et 0 <= SSMB_15 <= 4	Quantité de soutien concret.
---	---	------------------------------

2) Affection – sous échelle MOS

Nom de la variable : SSMBDAFF

Basée sur : SSMB_06, SSMB_10, SSMB_20

Description : La variable détermine l'affection que le répondant reçoit. On a demandé au répondant si quelqu'un lui témoignait de l'amour, le prenait dans ses bras ou si quelqu'un l'aimait et le faisait se sentir désirable.

Valeur de SSMBDAFF	Condition(s)	Explication
ND	(SSMB_06 = NSP, R, ND) ou (SSMB_10 = NSP, R, ND) ou (SSMB_20 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
SSMB_06 + SSMB_10 + SSMB_20 (min : 0; max : 12)	0 <= SSMB_06 <= 4 et 0 <= SSMB_10 <= 4 et 0 <= SSMB_20 <= 4	Quantité d'affection reçu

3) Interaction sociale positive – sous-échelle MOS

Nom de la variable : SSMBDSOC

Basée sur : SSMB_07, SSMB_11, SSMB_14, SSMB_18

Description : La variable détermine dans quelle mesure le répondant prend part à des interactions sociales positives. On a demandé au répondant s'il pouvait passer un bon moment avec quelqu'un, relaxer avec quelqu'un, faire des activités avec quelqu'un pour se changer les idées ou faire des choses plaisantes avec quelqu'un.

Valeur de SSMBDSOC	Condition(s)	Explication
ND	(SSMB_07 = NSP, R, ND) ou (SSMB_11 = NSP, R, ND) ou (SSMB_14 = NSP, R, ND) ou (SSMB_18 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
SSMB_07 + SSMB_11 + SSMB_14 + SSMB_18 (min : 0; max : 16)	0 <= SSMB_07 <= 4 et 0 <= SSMB_11 <= 4 et 0 <= SSMB_14 <= 4 et 0 <= SSMB_18 <= 4	Quantité d'interaction sociale positive.

4) Soutien émotionnel ou informationnel – sous-échelle MOS

Nom de la variable : SSMBDEMO

Basée sur : SSMB_03, SSMB_04, SSMB_08, SSMB_09, SSMB_13, SSMB_16, SSMB_17, SSMB_19

Description : La variable suivante détermine le soutien émotionnel ou informationnel du répondant. On a demandé au répondant si quelqu'un pouvait l'écouter et le conseiller en temps de crise, lui donner des renseignements ou s'il avait quelqu'un à qui il pouvait se confier et parler, ou quelqu'un qui comprend ses problèmes.

Valeur de SSMBDEMO	Condition(s)	Explication
ND	(SSMB_03 = NSP, R, ND) ou (SSMB_04 = NSP, R, ND) ou (SSMB_08 = NSP, R, ND) ou (SSMB_09 = NSP, R, ND) ou (SSMB_13 = NSP, R, ND) ou (SSMB_16 = NSP, R, ND) ou (SSMB_17 = NSP, R, ND) ou (SSMB_19 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
SSMB_03 + SSMB_04 + SSMB_08 + SSMB_09 + SSMB_13 + SSMB_16 + SSMB_17 + SSMB_19 (min : 0; max : 32)	0 <= SSMB_03 <= 4 et 0 <= SSMB_04 <= 4 et 0 <= SSMB_08 <= 4 et 0 <= SSMB_09 <= 4 et 0 <= SSMB_13 <= 4 et 0 <= SSMB_16 <= 4 et 0 <= SSMB_17 <= 4 et 0 <= SSMB_19 <= 4	Le soutien émotionnel ou informationnel est d'autant plus prononcée que la cote est élevée.

Caractéristiques sociodémographiques (4 VD)

1) Pays de naissance - Variable groupée

Nom de la variable : SDCBGCBG

Basée sur : SDCBCCB

Description : Cette variable classe le répondant en fonction de son pays de naissance en groupes précis.

Spécifications techniques : Cette variable est codée automatiquement d'après SDCB_1 et les réponses en toutes lettres provenant de la catégorie « autre, précisez ». Ces dernières sont inscrites au moyen du fichier de référence du Recensement.

Valeur de SDCBGCB	Condition(s)	Explication
ND	(SDCBCCB = 000, NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
1	$0 < \text{SDCBCCB} < 14$	Canada
2	$100 \leq \text{SDCBCCB} < 900$	Autre

2) Indicateur d'immigration

Nom de la variable : SDCBFIMM

Basée sur : SDCB_3

Description : Cette variable indique si le répondant est un immigrant.

Valeur de SDCBFIMM	Condition(s)	Explication
2	$\text{SDCB}_3 = \text{SO}$	Le répondant n'est pas un immigrant.
1	$\text{SDCB}_3 < \text{SO}$	Le répondant est un immigrant.
ND	(SDCB_3 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

3) Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - Variable groupée

Nom de la variable : SDCBGRES

Basée sur : SDCB_3, C_YEAR

Description : Cette variable identifie le nombre d'années que le répondant est au Canada depuis son immigration.

Certaines valeurs ont été regroupées, tel qu'indiqué ci-bas.

Valeur de SDCBGRES	Condition(s)	Explication
SO	$\text{SDCB}_3 = \text{SO}$	Le répondant n'est pas un immigrant.
ND	(SDCB_3 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
1	C_YEAR (présente année) $0 \leq \text{SDCB}_3 < 10$	Code de réponse valide.
2	C_YEAR (présente année) $\text{SDCB}_3 \geq 10$ ou plus	Code de réponse valide.

4) Langue(s) parlée(s) par le répondant - Variable groupée

Nom de la variable : SDCBGLNG

Basée sur : SDCB_5A, SDCB_5B, SDCB_5C, SDCB_5D, SDCB_5E, SDCB_5F, SDCB_5G, SDCB_5H, SDCB_5I, SDCB_5J, SDCB_5K, SDCB_5L, SDCB_5M, SDCB_5N, SDCB_5O, SDCB_5P, SDCB_5Q, SDCB_5R, SDCB_5S, SDCB_5T, SDCB_5U, SDCB_5V, SDCB_5W

Description : Cette variable représente la ou les langues que le répondant peut parler.

Certaines valeurs ont été regroupées, tel qu'indiqué au tableau suivant :

Valeur de SDCBGLNG	Condition(s)	Explication
ND	(SDCB_5A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
1	(SDCB_5A = 1 et SDCB_5B > 1) et (SDCB_5C = 1 ou SDCB_5D = 1 ou SDCB_5E = 1 ou SDCB_5F = 1 ou SDCB_5G = 1 ou SDCB_5H = 1 ou SDCB_5I = 1 ou SDCB_5J = 1 ou SDCB_5K = 1 ou SDCB_5L = 1 ou SDCB_5M = 1 ou SDCB_5N = 1 ou SDCB_5O = 1 ou SDCB_5P = 1 ou SDCB_5Q = 1 ou SDCB_5R = 1 ou SDCB_5S = 1 ou SDCB_5T = 1 ou SDCB_5U = 1 ou SDCB_5V = 1 ou SDCB_5W = 1)	Anglais (avec ou sans une langue autre que le français)
2	(SDCB_5A > 1 et SDCB_5B = 1) et (SDCB_5C = 1 ou SDCB_5D = 1 ou SDCB_5E = 1 ou SDCB_5F = 1 ou SDCB_5G = 1 ou SDCB_5H = 1 ou SDCB_5I = 1 ou SDCB_5J = 1 ou SDCB_5K = 1 ou SDCB_5L = 1 ou SDCB_5M = 1 ou SDCB_5N = 1 ou SDCB_5O = 1 ou SDCB_5P = 1 ou SDCB_5Q = 1 ou SDCB_5R = 1 ou SDCB_5S = 1 ou SDCB_5T = 1 ou SDCB_5U = 1 ou SDCB_5V = 1 ou SDCB_5W = 1)	Français (avec ou sans une langue autre que l'anglais)

3	(SDCB_5A = 1 et SDCB_5B = 1) et (SDCB_5C = 1 ou SDCB_5D = 1 ou SDCB_5E = 1 ou SDCB_5F = 1 ou SDCB_5G = 1 ou SDCB_5H = 1 ou SDCB_5I = 1 ou SDCB_5J = 1 ou SDCB_5K = 1 ou SDCB_5L = 1 ou SDCB_5M = 1 ou SDCB_5N = 1 ou SDCB_5O = 1 ou SDCB_5P = 1 ou SDCB_5Q = 1 ou SDCB_5R = 1 ou SDCB_5S = 1 ou SDCB_5T = 1 ou SDCB_5U = 1 ou SDCB_5V = 1 ou SDCB_5W = 1)	Anglais & français (avec ou sans une autre langue)
4	(SDCB_5A > 1 et SDCB_5B > 1) et (SDCB_5C = 1 ou SDCB_5D = 1 ou SDCB_5E = 1 ou SDCB_5F = 1 ou SDCB_5G = 1 ou SDCB_5H = 1 ou SDCB_5I = 1 ou SDCB_5J = 1 ou SDCB_5K = 1 ou SDCB_5L = 1 ou SDCB_5M = 1 ou SDCB_5N = 1 ou SDCB_5O = 1 ou SDCB_5P = 1 ou SDCB_5Q = 1 ou SDCB_5R = 1 ou SDCB_5S = 1 ou SDCB_5T = 1 ou SDCB_5U = 1 ou SDCB_5V = 1 ou SDCB_5W = 1)	Ni anglais ni français (autre)

Population active (8 VD)

1) Situation en regard de l'activité la semaine dernière (questionnaire abrégé)

Nom de la variable : LBFBDWSS

Basée sur : LBFB_01, LBFB_02

Description : Cette variable détermine la situation en regard de l'activité du répondant au cours de la semaine précédant l'interview.

Valeur de LBFBDWSS	Condition(s)	Explication
SO	LBFB_01 = SO	Exclusions de la population – les personnes âgées de plus de 75 ans ou moins de 15 ans.
1	LBFB_01 = 1	Le répondant travaillait à un emploi ou à une entreprise.
2	LBFB_02 = 1	Le répondant avait un emploi mais ne travaillait pas (absent).
3	LBFB_02 = 2	Le répondant n'avait pas d'emploi.
4	LBFB_01 = 3	Le répondant souffrait d'incapacité permanente.
ND	(LBFB_02 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

2) Situation en regard de l'activité la semaine dernière (questionnaire complet)

Nom de la variable : LBFBDWSL

Basée sur : LBFB_01, LBFB_11, LBFB_41

Description : Cette variable permet de classer le répondant en fonction de sa situation en regard de l'activité au cours de la semaine précédant l'interview et inclut les raisons pour lesquelles il ne travaille pas.

Valeur de LBFBDWSL	Condition(s)	Explication
SO	LBFB_01 = SO	Exclusions de la population – les personnes âgées de plus de 75 ans ou moins de 15 ans.
1	LBFB_01 = 1	Le répondant travaillait à un emploi ou à une entreprise.
2	(LBFB_41 = 8, 9, 10, 12, 13)	Le répondant avait un emploi – mise à pied temporaire ou saisonnière.
3	0 < LBFB_41 < 8 ou LBFB_41 = 11 ou 13 < LBFB_41 < SO	Le répondant avait un emploi – absent pour d'autres raisons.
4	LBFB_11 = 1	Le répondant n'avait pas d'emploi – était à la recherche d'un emploi au cours des quatre dernières semaines.
5	LBFB_11 = 2	Le répondant n'avait pas d'emploi – n'était pas à la recherche d'un emploi au cours des quatre dernières semaines.
6	LBFB_01 = 3	Le répondant souffrait d'incapacité permanente.

ND	(LBFB_11 = NSP, R, ND) ou (LBFB_41 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
----	---	--

3) Raison principale pour ne pas travailler au cours de la semaine dernière - Variable groupée

Nom de la variable : LBFBGRNW

Basée sur : LBFB_01, LBFB_11, LBFB_13, LBFB_41

Description : Cette variable indique la raison principale pour laquelle le répondant ne travaillait pas au cours de la semaine précédant l'interview.

Certaines valeurs ont été regroupées, tel qu'indiqué au tableau suivant :

Valeur de LBFBGRNW	Condition(s)	Explication
SO	LBFB_01 = SO	Exclusions de la population – les personnes âgées de plus de 75 ans ou moins de 15 ans.
SO	LBFB_01 = 1	Le répondant travaillait.
1	LBFB_01 = 3 ou LBFB_13 = 1 ou LBFB_41 = 1	Incapacité permanente de travailler, maladie ou incapacité
2	LBFB_13 = 2 ou LBFB_41 = 2 ou LBFB_13 = 3 ou LBFB_41 = 3 ou LBFB_13 = 4 ou LBFB_41 = 4	Obligations familiales
3	LBFB_13 = 7 LBFB_41 = 14	École ou congé d'étude
4	LBFB_41 = 7 ou LBFB_41 = 8 ou LBFB_41 = 9 ou LBFB_41 = 10 ou LBFB_41 = 12 ou LBFB_41 = 13	Conflit de travail / mise à pied
5	LBFB_13 = 8	À la retraite
6	LBFB_11 = 1	Cherchait du travail
7	LBFB_13 = 5 ou LBFB_41 = 5 ou LBFB_13 = 6 ou LBFB_41 = 6 ou LBFB_13 = 9 ou LBFB_41 = 11 ou LBFB_13 = 10 ou LBFB_41 = 15	Autres raisons
ND	(LBFB_11 = NSP, R, ND) ou (LBFB_13 = NSP, R, ND) ou (LBFB_41 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

4) Emplois multiples

Nom de la variable : LBFBDMJS

Basée sur : LBFB_01, LBFB_03, LBFB_21, LBFB_23, LBFB_51

Description : Cette variable permet de classer le répondant en fonction du fait qu'il a eu et qu'il a ou non des emplois multiples au cours de la dernière année.

Valeur de LBFBDMJS	Condition(s)	Explication
SO	LBFB_01 = SO	Exclusions de la population – les personnes âgées de plus de 75 ans ou moins de 15 ans.
1	LBFB_51 = 52	A présentement des emplois multiples – en a eus pendant toute l'année dernière.
2	LBFB_03 = 1 et LBFB_51 < 52	A présentement des emplois multiples – pas tout au long de la dernière année.
3	LBFB_03 = 2	A présentement seulement un emploi.
4	LBFB_23 = 1	N'a présentement pas d'emploi – a eu des emplois multiples au cours de la dernière année.
5	LBFB_23 = 2 ou LBFB_21 = 2	N'a présentement pas d'emploi – n'a pas eu d'emplois multiples au cours de la dernière année.
ND	(LBFB_03 = NSP, R, ND) ou (LBFB_21 = NSP, R, ND) ou (LBFB_23 = NSP, R, ND) ou (LBFB_51 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

5) Le statut de travail autonome - entreprise ou emploi principal - Variable groupée

Nom de la variable : LBFBG31

Fondé sur : LBFB_01, LBFB_31

Description : La variable suivante détermine le statut de travail autonome du répondant.

Valeur de LBFBG31	Condition(s)	Explication
1	LBFB_31 = 1	Répondant est employé
2	LBFB_31 = 2	Répondant travaille à son compte
ND	(LBFB_31 = 3) ou (LBFB_31 = NSP, R ou ND)	Non déclaré ou travailleur non rémunéré dans une entreprise familiale
SO	LBFB_31 = SO	Sans objet

6) Nombre total d'heures habituellement travaillées par semaine

Nom de la variable : LBFB DHPW

Basée sur : LBFB_01, LBFB_42, LBFB_53

Description : Cette variable identifie le nombre total d'heures habituellement travaillées par semaine par le répondant.

Valeur de LBFB DHPW	Condition(s)	Explication
SO	LBFB_01 = SO	Exclusions de la population – les personnes âgées de plus de 75 ans ou moins de 15 ans.
SO	LBFB_42 = SO	Le répondant n'a pas travaillé au cours de la dernière année.
LBFB_42	LBFB_42 < SO et LBFB_53 = SO	Le nombre d'heures habituellement travaillées dans le cas des répondants n'ayant qu'un emploi.
LBFB_42 + LBFB_53	LBFB_42 < SO et LBFB_53 < SO	Le nombre d'heures habituellement travaillées par les répondants qui ont plus d'un emploi.

ND	(LBFB_42 = NSP, R, ND) ou (LBFB_53 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
----	---	--

7) Emploi à temps plein/temps partiel (pour le nombre total d'heures habituelles)

Nom de la variable : LBFBDPFT

Basée sur : LBFBDHPW

Description : Cette variable indique si le répondant travaillait à temps plein ou à temps partiel.

Valeur de LBFBDPFT	Condition(s)	Explication
SO	LBFBDHPW = SO	Exclusions de la population – les personnes âgées de plus de 75 ans ou moins de 15 ans ou les non travailleurs.
ND	LBFBDHPW = ND	Le répondant a une valeur de non-réponse (non déclaré) à la variable dérivée nécessaire au calcul.
1	LBFBDHPW \geq 30	Temps plein
2	LBFBDHPW < 30	Temps partiel

8) Situation d'emploi au cours de la dernière année - Variable groupée

Nom de la variable : LFBFGJST

Basée sur : LBFB_01, LBFB_11, LBFB_22, LBFB_61, LBFB_71, LBFB_21

Description : Cette variable indique la situation d'emploi du répondant au cours de la dernière année.

Pour assurer la confidentialité, certaines valeurs ont été regroupées.

Valeur de LFBFGJST	Condition(s)	Explication
SO	LBFB_01 = SO	Exclusions de la population – les personnes âgées de plus de 75 ans ou moins de 15 ans.
1	LBFB_61 = 52	Le répondant avait un emploi tout au long de la dernière année.
2	LBFB_71 = 52 ou LBFB_22 = 2 ou [LBFB_71 < 52 et LBFB_21 = 2 et (LBFB_11 = 1 ou LBFB_22 = 1)]	Le répondant était sans emploi et a recherché ou non du travail pendant une partie ou la totalité de l'année précédente.
3	[(LBFB_61 + LBFB_71) = 52 et 0 < LBFB_71 < 52 et LBFB_61 < 52] ou [LBFB_61 < 52 et LBFB_71 = 0] ou [(LBFB_61 + LBFB_71) < 52 et (0 < LBFB_71 < 52) et (LBFB_61 < 52)]	Le répondant a eu un emploi durant une partie de l'année et a été sans emploi et a recherché ou non du travail pendant l'autre partie de l'année.
ND	(LBFB_22 = NSP, R, ND) ou (LBFB_61 = NSP, R, ND) ou (LBFB_71 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

Stress au travail (6 VD)

Les questions relatives au stress au travail ont été subdivisées en six composantes. Comme c'est le cas pour l'indice global, les réponses aux questions reflètent les perceptions des répondants et les différentes dimensions de leur travail. Le nom de chaque sous-échelle reflète la dimension mesurée. On a demandé aux répondants âgés de 15 à 75 ans qui travaillaient ou qui avaient une entreprise en tout temps au cours des 12 derniers mois d'évaluer leur principal emploi. L'indice de 12 questions, fondé sur un ensemble plus large de questions de Karasek (voir Karasek R, Theorell T. *Healthy Work: Stress, Productivity and the Reconstruction of Working Life*. New York: Basic Books, Inc. 1990.), reflète les perceptions qu'ont les répondants des différentes dimensions de leur travail, comme la sécurité au travail, le soutien social, la monotonie, les efforts physiques requis et l'étendue de leur participation au processus de prise de décisions. Le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée.

Références : aller voir : Schwartz J, Pieper C, Karasek RA. « A procedure for linking psychosocial job characteristics data to health surveys. » *American Journal of Public Health* 1988; 78: 904-9.

Karasek R, Theorell T. *Healthy Work: Stress, Productivity and the Reconstruction of Working Life*. New York: Basic Books, Inc. 1990.

Reformatages temporaires

Reformatage	Explication
Si WSTB_401 <= 5 alors WSTB_401 = (WSTB_401 - 1) Si WSTB_402 <= 5 alors WSTB_402 = (WSTB_402 - 1) Si WSTB_403 <= 5 alors WSTB_403 = (WSTB_403 - 1) Si WSTB_404 <= 5 alors WSTB_404 = (WSTB_404 - 1) Si WSTB_405 <= 5 alors WSTB_405 = (WSTB_405 - 1) Si WSTB_406 <= 5 alors WSTB_406 = (WSTB_406 - 1) Si WSTB_407 <= 5 alors WSTB_407 = (WSTB_407 - 1) Si WSTB_408 <= 5 alors WSTB_408 = (WSTB_408 - 1) Si WSTB_409 <= 5 alors WSTB_409 = (WSTB_409 - 1) Si WSTB_410 <= 5 alors WSTB_410 = (WSTB_410 - 1) Si WSTB_411 <= 5 alors WSTB_411 = (WSTB_411 - 1) Si WSTB_412 <= 5 alors WSTB_412 = (WSTB_412 - 1)	Modifier l'échelle des réponses pour les questions WSTB_401 à WSTB_412 de 1 à 5, à 0 à 4 pour toutes les questions ayant des catégories de réponse valide.
Si WSTB_404 <= 5 alors WSTB_404 = (5 - WSTB_404) Si WSTB_405 <= 5 alors WSTB_405 = (5 - WSTB_405) Si WSTB_408 <= 5 alors WSTB_408 = (5 - WSTB_408) Si WSTB_410 <= 5 alors WSTB_410 = (5 - WSTB_410)	Inverser l'échelle des questions pour lesquelles l'échelle a été modifiée WSTB_404, WSTB_405, WSTB_408, WSTB_410 quand ces questions ont des catégories de réponse valide (c.-à-d., codes de réponse de 0 à 4).

1) Échelle de l'indice du stress au travail – Latitude de décision : discrétion relative à la compétence (aptitudes requises)

Nom de la variable : WSTBDSKI

Basée sur : WSTB_401, WSTB_402, WSTB_404

Description : Cette variable détermine la diversité des tâches du répondant dans le cadre de son emploi principal au cours des 12 derniers mois. On demandait aux répondants s'ils devaient continuellement apprendre de nouvelles choses ou si leur travail exigeait un degré élevé de compétences et si leur travail consistait à refaire toujours les mêmes choses.

Valeur de WSTBDSKI	Condition(s)	Explication
SO	WSTB_401 = SO	Exclusions de la population –moins de 15 ans ou plus de 75 ans; et (GENB_08 <> 1 et LBFB_21<>1)
ND	(WSTB_401 = NSP, R, ND) ou (WSTB_402 = NSP, R, ND) ou (WSTB_404 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.

WSTB_401 + WSTB_402 + WSTB_404 (min : 0; max : 12)	0 <= WSTB_401 <= 4 et 0 <= WSTB_402 <= 4 et 0 <= WSTB_404 <= 4	Score obtenu de la sous-échelle de latitude de décision : discrétion relative à la compétence.
--	--	--

2) Échelle de l'indice du stress au travail – latitude de décision : pouvoir décisionnel

Nom de la variable : WSTBDAUT

Basée sur : WSTB_401, WSTB_403, WSTB_409

Description : Cette variable détermine si le principal emploi du répondant au cours des 12 derniers mois lui permet une marge de manœuvre suffisante et s'il a son mot à dire dans le déroulement des choses.

Valeur de WSTBDAUT	Condition(s)	Explication
SO	WSTB_401 = SO	Exclusions de la population – moins de 15 ans ou plus de 75 ans; et (GENB_08 <> 1 et LBFB_21 <> 1)
ND	(WSTB_403 = NSP, R, ND) ou (WSTB_409 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
WSTB_403 + WSTB_409 (min : 0; max : 8)	0 <= WSTB_403 <= 4 et 0 <= WSTB_409 <= 4	Score obtenu de la sous-échelle de latitude de décision : pouvoir décisionnel.

3) Échelle de l'indice du stress au travail – demandes psychologiques

Nom de la variable : WSTBDPSY

Basée sur : WSTB_401, WSTB_405, WSTB_406

Description : Cette variable détermine si le répondant a pu éviter d'être touché par les demandes conflictuelles des autres employés et si l'horaire de son principal emploi au cours des 12 derniers mois a été très chargé.

Valeur de WSTBDPSY	Condition(s)	Explication
SO	WSTB_401 = SO	Exclusions de la population – moins de 15 ans ou plus de 75 ans; et (GENB_08 <> 1 et LBFB_21 <> 1)
ND	(WSTB_405 = NSP, R, ND) ou (WSTB_406 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
WSTB_405 + WSTB_406 (min : 0; max : 8)	0 <= WSTB_405 <= 4 et 0 <= WSTB_406 <= 4	Score obtenu de la sous-échelle des demandes psychologiques.

4) Échelle de l'indice du stress au travail – menace de perdre son emploi

Nom de la variable : WSTBDJIN

Basée sur : WSTB_401, WSTB_407

Description : Cette variable détermine si le répondant estime que la sécurité de son emploi principal était bonne.

Valeur de WSTBDJIN	Condition(s)	Explication
SO	WSTB_401 = SO	Exclusions de la population – moins de 15 ans ou plus de 75 ans; et (GENB_08 <> 1 et LBFB_21 <> 1)
ND	(WSTB_407 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.

WSTB_407 (min : 0 ; max : 4)	0 <= WSTB_407 <= 4	Score obtenu de la sous-échelle des menaces de perdre son emploi.
---------------------------------	--------------------	---

5) Échelle de l'indice du stress au travail – exigences physiques

Nom de la variable : WSTBDPHY

Basée sur : WSTB_401, WSTB_408

Description : Cette variable détermine si le principal emploi du répondant au cours des 12 derniers mois exigeait beaucoup d'efforts physiques.

Valeur de WSTBDPHY	Condition(s)	Explication
SO	WSTB_401 = SO	Exclusions de la population – moins de 15 ans ou plus de 75 ans; et (GENB_08 <> 1 et LBFB_21<>1)
ND	(WSTB_408 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question nécessaire au calcul.
WSTB_408 (min : 0; max : 4)	0 <= WSTB_408 <= 4	Score obtenu de la sous-échelle des exigences physiques.

6) Échelle de l'indice du stress au travail – soutien social

Nom de la variable : WSTBDSOC

Basée sur : WSTB_401, WSTB_410, WSTB_411, WSTB_412

Description : Cette variable détermine si le superviseur et les collègues du répondant l'aident ou non dans l'exercice de ses fonctions. De plus, elle détermine si le répondant a été exposé à de l'hostilité ou à des conflits de la part de ses collègues dans le cadre de son principal emploi au cours des 12 derniers mois.

Valeur de WSTBDSOC	Condition(s)	Explication
SO	WSTB_401 = SO	Exclusions de la population – moins de 15 ans ou plus de 75 ans; et (GENB_08 <> 1 et LBFB_21<>1)
ND	(WSTB_410 = NSP, R, ND) ou (WSTB_411 = NSP, R, ND) ou (WSTB_412 = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire au calcul.
WSTB_410 + WSTB_411 + WSTB_412 (min : 0; max : 12)	0 <= WSTB_410 <= 4 et 0 <= WSTB_411 <= 4 et 0 <= WSTB_412 <= 4	Score obtenu de la sous-échelle de soutien social.

Revenu (6 VD)

1) Revenu total du ménage, principale source - Variable groupée

Nom de la variable : INCBG2

Fondé sur : INCB_2

Description : La variable groupe les sources de revenu total du ménage dans quatre 4 catégories.

Valeur de INCBG2	Condition(s)	Explication
1	INCB_2 = 1, 2	Salaires et traitements ou travail autonome
2	INCB_2 = 4, 5, 10	Prestations - d'assurance-emploi ou Indemnités d'accident du travail ou aide sociale
3	INCB_2 = 6, 7, 8	Régime du Canada ou de Rentes du Québec ou Prestations - d'un régime de retraite ou Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti
4	INCB_2 = 3, 9, 11, 12, 13, 14	Dividendes et intérêts ou Crédit d'impôt pour enfants ou Pension alimentaire - aux enfants ou Pension alimentaire - au conjoint(e) ou autre ou aucune
ND	INCB_2 = NSP, R ou ND	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à la question

2) Revenu total du ménage, deux catégories

Nom de la variable : INCBDA2

Basée sur : DHHBDHSZ, INCB_3A, INCB_3B, INCB_3C, INCB_3D, INCB_3E, INCB_3F

Description : La variable classe le revenu total du ménage dans 2 catégories basé sur le revenu total du ménage et le nombre de personnes vivant dans le ménage.

Valeur de INCBDA2	Condition(s)	Explication
ND	(INCB_3A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) aux questions sur le revenu.
1	(DHHBDHSZ = 1, 2) et [INCB_3A = 3 ou INCB_3B = 1 ou INCB_3D = 1] ou (DHHBDHSZ = 3, 4) et (INCB_3A = 1, 3) ou DHHBDHSZ >= 5 et [(INCB_3A = 1, 3) ou INCB_3F = 1]	Faible revenu Moins de 15 000 \$ (1, 2 personnes); Moins de 20 000 \$ (3, 4 personnes) Moins de 30 000 \$ (5 personnes et plus)

2	(DHHBDHSZ = 1, 2) et [INCB_3A = 2 ou INCB_3D = 2] ou (DHHBDHSZ = 3, 4) et INCB_3A = 2 ou DHHBDHSZ >= 5 et [INCB_3E = 2 ou INCB_3F = 2]	Revenu moyen ou élevé 15 000 \$ et plus (1, 2 personnes) 20 000 \$ et plus (3, 4 personnes) 30 000 \$ et plus (5 personnes et plus)
ND	Autre	Le répondant n'a pas donné suffisamment de renseignements pour qu'on puisse le classer.

3) Revenu total du ménage, quatre catégories

Nom de la variable : INCBDA4

Basée sur : DHHBDHSZ, INCB_3A, INCB_3B, INCB_3C, INCB_3D, INCB_3E, INCB_3F, INCB_3G

Description : La variable permet de classer le revenu total du ménage en quatre catégories selon le revenu total du ménage et le nombre de personnes qui le composent.

Valeur de INCBDA4	Condition(s)	Explication
ND	(INCB_3A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) aux questions sur le revenu.
1	(DHHBDHSZ = 1, 2) et [INCB_3A = 3 ou INCB_3B = 1 ou INCB_3D = 1] ou (DHHBDHSZ = 3, 4) et (INCB_3A = 1, 3) ou DHHBDHSZ >= 5 et [(INCB_3A = 1, 3) ou INCB_3F = 1]	Revenu inférieur Moins de 15 000 \$ (1, 2 personnes); Moins de 20 000 \$ (3, 4 personnes) Moins de 30 000 \$ (5 personnes et plus)
2	(DHHBDHSZ = 1, 2) et [INCB_3D = 2 ou INCB_3F = 1] ou (DHHBDHSZ = 3, 4) et (INCB_3E = 1) ou DHHBDHSZ >= 5 et [INCB_3F = 2 ou (INCB_3G = 1, 2)]	Revenu inférieur ou moyen De 15 000 \$ à 29 999 \$ (1, 2 personnes); De 20 000 \$ à 39 999 \$ (3, 4 personnes); De 30 000 \$ à 59 999 \$ (5 personnes et plus)
3	(DHHBDHSZ = 1, 2) et [INCB_3F = 2 ou INCB_3G = 1, 2] ou (DHHBDHSZ = 3, 4) et (INCB_3G = 1, 2, 3) ou DHHBDHSZ >= 5 et INCB_3G = 3	Revenu supérieur moyen De 30 000 \$ à 59 999 \$ (1, 2 personnes); De 40 000 \$ à 79 999 \$ (3, 4 personnes); De 60 000 \$ à 79 999 \$ (5 personnes ou plus)

4	(DHHBDHSZ = 1, 2) et (INCB_3G = 3, 4) ou DHHBDHSZ >= 3 et INCB_3G = 4	Revenu supérieur 60 000 \$ et plus (1, 2 personnes); 80 000 \$ et plus (3 personnes et plus)
ND	Autre	Le répondant n'a pas donné suffisamment de renseignements pour qu'on puisse le classer.

4) Revenu total du ménage, cinq catégories

Nom de la variable : INCBDA5

Basée sur : DHHBDHSZ, INCB_3A, INCB_3B, INCB_3C, INCB_3D, INCB_3E, INCB_3F, INCB_3G

Description : La variable permet de classer le revenu total du ménage en cinq catégories en fonction du revenu total du ménage et du nombre de personnes qui le composent.

Valeur de INCBDA5	Condition(s)	Explication
ND	(INCB_3A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) aux questions sur le revenu.
1	DHHBDHSZ < 5 et [INCB_3A = 3 ou INCB_3B = 1] ou DHHBDHSZ >= 5 et [INCB_3A = 3 ou INCB_3B = 1 ou INCB_3D = 1]	Revenu inférieur Moins de 10 000 \$ (1 à 4 personnes); Moins de 15 000 \$ (5 personnes et plus)
2	(DHHBDHSZ = 1, 2) et INCB_3D = 1 ou (DHHBDHSZ = 3, 4) et INCB_3B = 2 ou DHHBDHSZ >= 5 et [INCB_3D = 2 ou INCB_3F = 1]	Revenu inférieur moyen De 10 000 \$ à 14 999 \$ (1, 2 personnes); De 10 000 \$ à 19 999 \$ (3, 4 personnes); De 15 000 \$ à 29 999 \$ (5 personnes ou plus) +
3	(DHHBDHSZ = 1, 2) et [INCB_3D = 2 ou INCB_3F = 1] ou (DHHBDHSZ = 3, 4) et INCB_3E = 1 ou DHHBDHSZ >= 5 et [INCB_3F = 2 ou (INCB_3G = 1, 2)]	Revenu moyen De 15 000 \$ à 29 999 \$ (1, 2 personnes); De 20 000 \$ à 39 999 \$ (3, 4 personnes); De 30 000 \$ à 59 999 \$ (5 personnes et plus)

4	(DHHBDHSZ = 1, 2) et [INCB_3F = 2 ou (INCB_3G = 1, 2)] ou (DHHBDHSZ = 3, 4) et (INCB_3G = 1, 2, 3) ou DHHBDHSZ >= 5 et INCB_3G = 3	Revenu supérieur moyen De 30 000 \$ à 59 999 \$ (1, 2 personnes); De 40 000 \$ à 79 999 \$ (3, 4 personnes); De 60 000 \$ à 79 999 \$ (5 personnes et plus)
5	(DHHBDHSZ = 1, 2) et (INCB_3G = 3, 4) ou DHHBDHSZ >= 3 et INCB_3G = 4	Revenu supérieur 60 000 \$ et plus (1, 2 personnes); 80 000 \$ et plus (3 personnes et plus)
ND	Autre	Le répondant n'a pas donné suffisamment de renseignements pour qu'on puisse le classer.

5) Revenu total du ménage, toutes provenances - Variable groupée

Nom de la variable : INCBGHH

Basée sur : INCB_3A, INCB_3B, INCB_3C, INCB_3D, INCB_3E, INCB_3F, INCB_3G

Description : La variable regroupe le revenu total du ménage de toutes provenances.

Afin de s'assurer que les individus ne sont pas identifiables, des enregistrements ont été groupés.

Valeur de INCBGHH	Condition(s)	Explication
ND	(INCB_3A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) aux questions sur le revenu.
1	INCB_3A = 3	Aucun revenu
2	INCB_3C = 1 ou 2, ou INCB_3D = 1	Mois de \$15,000
3	INCB_3D = 2 ou INCB_3F = 1	\$15,000 à \$29,999
4	INCB_3F = 2 ou INCB_3G = 1	\$30,000 à \$49,999
5	INCB_3G = 2 ou INCB_3G = 3	\$50,000 à \$79,999
6	INCB_3G = 4	\$80,000 ou plus
ND	Autre	Le répondant n'a pas donné suffisamment de renseignements pour qu'on puisse le classer.

6) Revenu personnel, toutes provenances - Variable groupée

Nom de la variable : INCBGPER

Basée sur : DHHB_AGE, INCB_4A, INCB_4B, INCB_4C, INCB_4D, INCB_4E, INCB_4F, INCB_4G

Description : La variable détermine le revenu personnel du répondant de toutes provenances.

Afin de s'assurer que les individus ne sont pas identifiables, des enregistrements ont été groupés.

Valeur de INCBGPER	Condition(s)	Explication
SO	DHHB_AGE < 15	Population exclue – Âge < 15
ND	(INCB_4A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) aux questions sur le revenu.
1	(INCB_4A = 3, SO)	Aucun revenu
2	INCB_4C = 1 ou 2, ou INCB_4D = 1	Moins de \$15,000

3	INCB_4D = 2 ou INCB_4F = 1	\$15,000 à \$29,999
4	INCB_4F = 2 ou INCB_4G = 1	\$30,000 à \$49,999
5	INCB_4G = 2 ou INCB_4G = 3	\$50,000 à \$79,999
6	INCB_4G = 4	\$80,000 +
ND	Autre	Le répondant n'a pas donné suffisamment de renseignements pour qu'on puisse le classer.