

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 1

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
ADMB_RNO	Numéro d'enregistrement séquentiel	ADM	1
AGPB_01A	Peur - être seul à la maison	AGP	399
AGPB_01B	Peur - être dans des foules	AGP	400
AGPB_01C	Peur - voyager loin de chez soi	AGP	400
AGPB_01D	Peur - voyager/être seul loin de chez soi	AGP	401
AGPB_01E	Peur - utiliser les transports en commun	AGP	401
AGPB_01F	Peur - conduire une voiture	AGP	402
AGPB_01G	Peur - attendre en ligne dans un lieu public	AGP	402
AGPB_01H	Peur - être dans un magasin	AGP	403
AGPB_01I	Peur - être dans un cinéma, auditorium, église	AGP	403
AGPB_01J	Peur - être dans un restaurant/autres lieux publics	AGP	404
AGPB_01K	Peur - être dans un grand espace ouvert/grande rue	AGP	404
AGPB_02	Peur agora déjà causée par peur sociale/de performance	AGP	405
AGPB_02A	Peur agora toujours causée par peur sociale/de performance	AGP	405
AGPB_031	A remémoré l'âge exact de la première fois eu peur agora	AGP	406
AGPB_04A	Type de peur - être seul ou séparé des personnes chères	AGP	409
AGPB_04B	Type de peur - un danger réel comme être volé ou agressé	AGP	410
AGPB_04C	Type de peur - puisse avoir des nausées/diarrhée	AGP	410
AGPB_04D	Type de peur - puisse avoir une attaque de panique	AGP	411
AGPB_04E	Type de peur - puisse avoir crise cardiaque/autre urgence	AGP	411
AGPB_04F	Type de peur - puisse devenir physiquement malade/sans aide	AGP	412
AGPB_04G	Type de peur - puisse être diff./embarrassant de s'échapper	AGP	412
AGPB_04H	Type de peur - une autre chose terrible puisse arriver	AGP	413
AGPB_061	Étape de vie lorsque première fois a évité situations agora	AGP	415
AGPB_08	Incident particulier a déclenché toute 1ère peur agora	AGP	415
AGPB_08A	Eu attaque de panique à la suite de l'incident particulier	AGP	416
AGPB_09A	Symptôme - coeur a battu fort/trop vite	AGP	416
AGPB_09B	Symptôme - eu des sueurs	AGP	417
AGPB_09C	Symptôme - eu des tremblements/frémissements	AGP	417
AGPB_09D	Symptôme - eu la bouche sèche	AGP	418
AGPB_11A	Symptôme - eu du mal à respirer normalement	AGP	418
AGPB_11B	Symptôme - eu l'impression d'étouffer	AGP	419
AGPB_11C	Symptôme - eu de la douleur ou malaise à la poitrine	AGP	419
AGPB_11D	Symptôme - eu des nausées ou mal à l'estomac	AGP	420
AGPB_11E	Symptôme - eu des vertiges ou des étourdissements	AGP	420
AGPB_11F	Symptôme - eu peur perdre le contrôle/devenir fou/s'évanouir	AGP	421

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 2

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
AGPB_11G	Symptôme - eu peur de mourir	AGP	421
AGPB_11H	Symptôme - eu des bouffées de chaleur ou des frissons	AGP	422
AGPB_11I	Symptôme - eu des engourdissements ou des picotements	AGP	422
AGPB_11J	Symptôme - eu l'impression de ne pas vraiment être là	AGP	423
AGPB_11K	Symptôme - senti que choses autour n'étaient pas réelles	AGP	423
AGPB_13	Incapable quitter maison pendant journée entière dû à peur	AGP	424
AGPB_14	Incapable de quitter la maison sans accompagnement	AGP	426
AGPB_15	Peur/évitement troublé travail/social/relations	AGP	426
AGPB_16	Bouleversé/inquiet à cause de la peur/évitement	AGP	427
AGPB_17	Eu peur ou évité intensivement situations agora - 12 m.	AGP	427
AGPB_17A	Période de référence plus récente peur/évitement agora- 12m.	AGP	428
AGPB_18	Intensité de la peur hypothétique	AGP	430
AGPB_19	Fréquence - évité situations agora qui font peur - 12 m.	AGP	430
AGPB_201	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.	AGP	432
AGPB_202	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.	AGP	433
AGPB_20A	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.	AGP	431
AGPB_20C	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.	AGP	434
AGPB_20D	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.	AGP	435
AGPB_22	Nbre de jours/365 incapable totalement dû à la peur - 12 m.	AGP	436
AGPB_24	Consulté médecin/autre prof. pour peur agora	AGP	436
AGPB_35	A reçu traitement qui a aidé pour peur agora	AGP	438
AGPB_37	Reçu traitement professionnel pour peur agora - 12 m.	AGP	441
AGPB_38	Hospitalisé pour une nuit ou plus pour peur agora - vie	AGP	442
AGPB_3B1	Étape de vie quand toute première fois eu peur agora	AGP	409
AGPBDA	Critère A, partie 1 et 2 - (D)	AGP	443
AGPBDAP	Algorithme agoraphobie - vie - (D)	AGP	445
AGPBDAPP	Algorithme agoraphobie sans panique - vie - (D)	AGP	446
AGPBDB	Critère B -(D)	AGP	445
AGPBDB1	Critère B, partie 1 - (D)	AGP	444
AGPBDB2	Critère B, partie 2 - (D)	AGP	444
AGPBDB3	Critère B, partie 3 - (D)	AGP	444
AGPBDINT	Trouble occasionné par l'agoraphobie - moyenne - (D)	AGP	453
AGPBDPA	Critère A, partie 1 et 2 - (D)	AGP	446
AGPBDPA2	Critère A, partie 2 - (D)	AGP	445
AGPBDPB	Critère B - (D)	AGP	446
AGPBDPY	Algorithme agoraphobie - 12 m. - (D)	AGP	452

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 3

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
AGPBDPYP	Algorithme agora. sans trouble de panique - 12 m. - (D)	AGP	453
AGPBFINT	Indicateur : trouble par agoraphobie	AGP	454
AGPBG03A	Âge - exact première fois eu peur agora - (G)	AGP	407
AGPBG03B	Âge - approximatif première fois eu peur agora - (G)	AGP	408
AGPBG06	Âge - 1ère fois commencé à éviter situations agora - (G)	AGP	414
AGPBG13A	Période plus longue incapable quitter maison - (G)	SOP	425
AGPBG17B	Âge - dernière fois intensivement eu peur/évit ^é situat - (G)	AGP	429
AGPBG24A	Âge - première fois consulté prof. au sujet peur agora - (G)	AGP	437
AGPBG35A	Âge - 1ère fois reçu traitement qui a aidé peur agora - (G)	AGP	439
AGPBG35B	Nbre de prof. consulté avant traitement qui a aidé peur	AGP	440
AGPBG35C	Nbre total de prof. consulté au sujet peur agora - vie - (G)	AGP	441
AGPBG381	Nombre de proches parents avec peurs intenses d'agora. - (G)	AGP	443
AGPBG38A	Âge - première fois hospitalisé nuit pour peur agora - (G)	AGP	442
AGPBGON	Âge à l'apparation de l'agoraphobie - (D,G)	AGP	447
AGPBGONP	Âge à l'apparation de l'agoraphobie (sans panique) - (D,G)	AGP	450
AGPBGPER	Le plus long épisode relatif à l'agoraphobie - (D,G)	AGP	449
AGPBGPRP	Nbre d'ans de persistance de l'agora.(sans panique) - (D,G)	AGP	452
AGPBGRCP	Âge au plus récent épisode d'agora. (sans panique) - (D,G)	AGP	451
AGPBGREC	Âge au plus récent épisode d'agoraphobie - (D,G)	AGP	448
ALCB_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	ALC	459
ALCB_10	Consommation régulière de plus de 12 verres/semaine - vie	ALC	466
ALCB_2	Fréquence - consommation d'alcool - 12 m.	ALC	459
ALCB_3	Fréquence - consommation de 5 verres ou plus - 12 m.	ALC	460
ALCB_4	Consommation régulière de plus de 12 verres/semaine - 12 m.	ALC	460
ALCB_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine passée	ALC	461
ALCB_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	ALC	461
ALCB_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	ALC	462
ALCB_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	ALC	462
ALCB_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	ALC	463
ALCB_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	ALC	463
ALCB_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	ALC	464
ALCB_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	ALC	464
ALCB_5B	A déjà pris un verre d'alcool - vie	ALC	465
ALCB_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	ALC	466
ALCB_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	ALC	467
ALCB_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	ALC	467

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 4

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALCB_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	ALC	468
ALCB_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	ALC	468
ALCB_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	ALC	469
ALCB_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	ALC	469
ALCB_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	ALC	470
ALCB_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	ALC	470
ALCB_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	ALC	471
ALCB_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	ALC	471
ALCB_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	ALC	472
ALCB_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	ALC	472
ALCB_8	Âge commencé à boire de l'alcool	ALC	473
ALCB_9	Période 1 an où bu 5 verres ou + chaque mois/occasion - vie	ALC	465
ALCBDTYP	Genre de buveur - (D)	ALC	473
ALCBDWKY	Nombre de verres d'alcool - semaine passée - (D)	ALC	474
ALCBGDLY	Quantité moyenne de consommation d'alcool par jour - (D,G)	ALC	474
ALDB_01	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant - 12 m.	ALD	475
ALDB_01A	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant - vie	ALD	475
ALDB_01L	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant - vie	ALD	493
ALDB_02	Nombre de fois - soûl au travail/école/soin enfant - 12 m.	ALD	476
ALDB_02L	Nombre de fois - soûl au travail/école/soin enfant - vie	ALD	493
ALDB_03	Être soûl augmentait les chances de se blesser - 12 m.	ALD	476
ALDB_03A	Être soûl augmentait les chances de se blesser - vie	ALD	477
ALDB_03L	Être soûl augmentait les chances de se blesser - vie	ALD	494
ALDB_04	Difficultés émotionnelles/psychologiques dues à alc - 12 m.	ALD	477
ALDB_04A	Difficultés émotionnelles/psychologiques dues à alcool - vie	ALD	478
ALDB_04L	Difficultés émotionnelles/psychologiques dues à alcool - vie	ALD	494
ALDB_05	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool - 12 m.	ALD	478
ALDB_05A	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool - vie	ALD	479
ALDB_05L	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool - vie	ALD	495
ALDB_06	A passé un mois ou plus à s'enivrer - 12 m.	ALD	479
ALDB_06A	A passé un mois ou plus à s'enivrer - vie	ALD	480
ALDB_06L	A passé un mois ou plus à s'enivrer - vie	ALD	495
ALDB_07	A bu beaucoup plus que prévu - 12 m.	ALD	480
ALDB_07A	A bu beaucoup plus que prévu - vie	ALD	481
ALDB_07L	A bu beaucoup plus que prévu - vie	ALD	496
ALDB_08	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu - 12 m.	ALD	481

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 5

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALDB_08L	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu - vie	ALD	496
ALDB_09	Devait boire plus pour ressentir le même effet - 12 m.	ALD	482
ALDB_09A	Devait boire plus pour ressentir le même effet - vie	ALD	482
ALDB_09L	Devait boire plus pour ressentir le même effet - vie	ALD	497
ALDB_10	Eu symptôme lors de période dimuntion/sans alcool - 12 m.	ALD	483
ALDB_10A	Eu symptôme lors de période dimuntion/sans alcool - vie	ALD	483
ALDB_10L	Eu symptôme lors de période dimuntion/sans alcool - vie	ALD	497
ALDB_11	A bu de l'alcool - même si promis de ne pas le faire - 12 m.	ALD	484
ALDB_11A	A bu de l'alcool - même si promis de ne pas le faire - vie	ALD	484
ALDB_11L	A bu de l'alcool - même si promis de ne pas le faire - vie	ALD	498
ALDB_12	A bu de l'alcool - peu de temps pour autre chose - 12 m.	ALD	485
ALDB_12A	A bu de l'alcool - peu de temps pour autre chose - vie	ALD	485
ALDB_12L	A bu de l'alcool - peu de temps pour autre chose - vie	ALD	498
ALDB_13	A réduit activités importantes - à cause de l'alcool - 12 m.	ALD	486
ALDB_13A	A réduit activités importantes - à cause de l'alcool - vie	ALD	486
ALDB_13L	A réduit activités importantes - à cause de l'alcool - vie	ALD	499
ALDB_14	Continué à prendre alcool malgré problèmes de santé - 12 m.	ALD	487
ALDB_14A	Continué à prendre alcool malgré problèmes de santé - vie	ALD	487
ALDB_14L	Continué à prendre alcool malgré problèmes de santé - vie	ALD	499
ALDB_15A	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.	ALD	488
ALDB_15C	Niveau de trouble - capacités relations proches - 12 m.	ALD	491
ALDB_15D	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.	ALD	492
ALDB_5B1	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.	ALD	489
ALDB_5B2	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.	ALD	490
ALDBDINT	Trouble occasionné par alcool - moyenne - 12 mois - (D)	ALD	501
ALDBDPP	Dépendance à l'alcool - probabilité prévue - 12 m. - (D)	ALD	500
ALDBDSF	Dépendance alcool/marque questionnaire court - 12 m. - (D)	ALD	500
ALDBFINT	Indicateur : trouble occasionné par alcool - 12 m.	ALD	501
CCCB_011	A des allergies alimentaires	CCC	26
CCCB_021	A des allergies autres que des allergies alimentaires	CCC	26
CCCB_031	Fait de l'asthme	CCC	27
CCCB_041	Souffre de fibromyalgie	CCC	27
CCCB_051	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	CCC	28
CCCB_061	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	CCC	28
CCCB_071	Fait de l'hypertension	CCC	29
CCCB_081	A des migraines	CCC	29

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 6

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCCB_101	Est atteint du diabète	CCC	31
CCCB_111	Est atteint d'épilepsie	CCC	31
CCCB_121	Souffre d'une maladie cardiaque	CCC	32
CCCB_131	Souffre d'un cancer	CCC	32
CCCB_141	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	CCC	33
CCCB_151	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CCC	33
CCCB_171	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite	CCC	34
CCCB_191	Est atteint de cataracte	CCC	34
CCCB_201	Est atteint de glaucome	CCC	35
CCCB_211	Est atteint d'un problème de la thyroïde	CCC	35
CCCB_251	Souffre du syndrome de fatigue chronique	CCC	36
CCCB_261	Souffre de sensibilités aux agresseurs chimiques	CCC	36
CCCB_291	Souffre d'un trouble obsessionnel-compulsif	CCC	37
CCCB_311	Souffre du syndrome de stress post-traumatique	CCC	37
CCCB_331	A des troubles d'apprentissage	CCC	38
CCCB_91A	Est atteint de bronchite chronique	CCC	30
CCCB_91B	Souffre d'emphysème / bronchopneumopathie chronique obstruc.	CCC	30
CCCBF1	Est atteint d'un problème de santé chronique	CCC	39
CCCBG281	Est atteint de toutes autres formes de psychose - (G)	CCC	37
CCCBG901	Autre prob. de santé phys. ou mentale de longue durée - (G)	CCC	38
CPGB_01A	Fréquence - dépensé argent pour billets loterie instantanée	CPG	538
CPGB_01B	Fréquence - dépensé argent pour billets de loterie	CPG	539
CPGB_01C	Fréquence - dépensé argent au bingo	CPG	540
CPGB_01D	Fréquence - dépensé argent pour jeu de cartes/jeu de société	CPG	541
CPGB_01E	Fréquence - dépensé argent au loterie vidéo (hors casino)	CPG	542
CPGB_01F	Fréquence - dépensé argent au loterie vidéo (au casino)	CPG	543
CPGB_01G	Fréquence - dépensé argent pour autres jeux (au casino)	CPG	544
CPGB_01H	Fréquence - dépensé argent pour jeux de hasard sur Internet	CPG	545
CPGB_01I	Fréquence - dépensé argent aux courses de chevaux	CPG	546
CPGB_01J	Fréquence - dépensé argent pour loteries sportives	CPG	547
CPGB_01K	Fréquence - dépensé argent pour investissements spéculatifs	CPG	548
CPGB_01L	Fréquence - dépensé argent pour des jeux d'habiletés	CPG	549
CPGB_01M	Fréquence - dépensé argent pour autre type de jeu de hasard	CPG	550
CPGB_01N	Montant d'argent dépensé aux activités de jeu	CPG	551
CPGB_02	Fréquence - dépensé plus d'argent au jeu que l'intention	CPG	552
CPGB_03	Fréquence - jouer plus d'argent pour même sentiment	CPG	552

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 7

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
CPGB_04	Fréquence - retourné pour essayer de regagner l'argent perdu	CPG	553
CPGB_05	Fréquence - emprunté argent/vendu pour obtenir \$ pour jouer	CPG	553
CPGB_06	Fréquence - a pensé peut-être avoir un problème de jeu	CPG	554
CPGB_07	Fréquence - jeu a causé des problèmes de santé quelconques	CPG	554
CPGB_08	Fréquence - personnes ont critiqué les habitudes de jeu	CPG	555
CPGB_09	Fréquence - activités de jeu ont causé problèmes financiers	CPG	555
CPGB_10	Fréquence - senti coupable à propos du jeu	CPG	556
CPGB_11	Fréquence - a menti pour cacher activités de jeu	CPG	556
CPGB_12	Fréquence - voulu arrêter parier mais ne pensait pas pouvoir	CPG	557
CPGB_13	Fréquence - parié plus que pouvait se permettre de perdre	CPG	557
CPGB_14	Fréquence - essayé d'arrêter/de moins jouer; mais incapable	CPG	558
CPGB_15	Fréquence - joué pour oublier problèmes/mieux se sentir	CPG	558
CPGB_16	Fréquence - activités de jeu causé problème avec famille/ami	CPG	559
CPGB_17	Autre membre de la famille avec un problème de jeu	CPG	559
CPGB_18	Consommé de l'alcool ou de la drogue en jouant	CPG	560
CPGBDACT	Nbre de différents types d'activité de jeux de hasard - (D)	CPG	562
CPGBDSEV	Indice de gravité de problème de jeux de hasard - (D)	CPG	561
CPGBDTYP	Type de joueurs - (D)	CPG	561
CPGBFGAM	Indicateur : activité jeux hasard - Parieurs vs non-parieurs	CPG	560
DEPB_01	Période lorsqu'été découragé de ce qui se passait - vie	DEP	113
DEPB_01A	Période quand a perdu intérêt pour plupart des choses - vie	DEP	113
DEPB_01B	Période quand a perdu intérêt pour plupart des choses - vie	DEP	114
DEPB_02	Période quand a perdu intérêt pour plupart des choses - vie	DEP	114
DEPB_09	Période 2 semaines - perdu intérêt plupart des choses - vie	DEP	115
DEPB_12	Période 2 semaines - perdu intérêt plupart des choses - vie	DEP	115
DEPB_16	Durée quotidienne - triste/découragé/manqué intérêt - vie	DEP	116
DEPB_17	Intensité - détresse émotionnelle durant période - vie	DEP	116
DEPB_18	Fréquence - détresse si sévère, rien ne réjouissait - vie	DEP	117
DEPB_19	Fréquence - détresse sévère/pas accomplir quotidien - vie	DEP	117
DEPB_21	Eu symptômes semblables à dépression durant épisodes - vie	DEP	118
DEPB_22	Vécu un épisode particulier nettement pire - vie	DEP	118
DEPB_24A	Symptôme - se sentait triste, vide ou déprimé	DEP	123
DEPB_24B	Symptôme - se sentait si triste que rien ne pouvait réjouir	DEP	123
DEPB_24C	Symptôme - était découragé à propos de ce qui se passait	DEP	124
DEPB_24D	Symptôme - était désespéré quant à l'avenir	DEP	124
DEPB_24E	Symptôme - avait perdu intérêt pour plupart des choses	DEP	125

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 8

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
DEPB_24F	Symptôme - avait impression que rien n'apportait du plaisir	DEP	125
DEPB_261	Symptôme - poids pris dû à croissance physique/grossesse	DEP	127
DEPB_263	Symptôme - poids perdu dû à régime/maladie physique	DEP	128
DEPB_265	Symptôme - incapable faire face responsabilités quotidiennes	DEP	139
DEPB_266	Symptôme - voulait être seul plutôt que d'être avec amis	DEP	139
DEPB_267	Symptôme - avait moins envie de parler qu'à l'habitude	DEP	140
DEPB_268	Symptôme - était souvent en larmes	DEP	140
DEPB_26A	Symptôme - avait beaucoup moins d'appétit qu'à l'habitude	DEP	126
DEPB_26B	Symptôme - avait beaucoup plus d'appétit qu'à l'habitude	DEP	126
DEPB_26C	Symptôme - avait pris du poids sans en avoir l'intention	DEP	127
DEPB_26E	Symptôme - perdait du poids sans en avoir l'intention	DEP	128
DEPB_26G	Symptôme - avait difficulté à s'endormir/rester endormi	DEP	129
DEPB_26H	Symptôme - dormait plus qu'à l'habitude	DEP	129
DEPB_26I	Symptôme - dormait moins qu'à l'habitude/sans fatigué	DEP	130
DEPB_26J	Symptôme - se sentait fatigué/manque d'énergie	DEP	130
DEPB_26K	Symptôme - avait plus d'énergie qu'à l'habitude	DEP	131
DEPB_26L	Symptôme - parlait/déplaçait plus lent qu'à l'habitude	DEP	131
DEPB_26M	Symptôme - autres remarqué répondant parlait/déplaçait lent	DEP	132
DEPB_26N	Symptôme - nerveux/tendu/ne pouvait tenir en place	DEP	132
DEPB_26O	Symptôme - autres ont remarqué répondant était agité	DEP	133
DEPB_26P	Symptôme - pensées étaient plus lentes que d'habitude	DEP	133
DEPB_26Q	Symptôme - pensées sautaient/défilaient rapidement	DEP	134
DEPB_26R	Symptôme - avait plus de difficultés à se concentrer	DEP	134
DEPB_26S	Symptôme - incapable de prendre décision	DEP	135
DEPB_26T	Symptôme - perdu confiance en soi-même	DEP	135
DEPB_26U	Symptôme - se sentait moins bon que les autres	DEP	136
DEPB_26V	Symptôme - se sentait totalement sans valeur	DEP	136
DEPB_26W	Symptôme - se sentait coupable presque tous les jours	DEP	137
DEPB_26X	Symptôme - se sentait irritable/grincheux ou mauvaise humeur	DEP	137
DEPB_26Y	Symptôme - se sentait nerveux/anxieux presque tous les jours	DEP	138
DEPB_26Z	Symptôme - avait attaques intenses de peur ou panique	DEP	138
DEPB_28	Sentiments dépressifs troublé travail/social/relations	DEP	143
DEPB_281	Sentiments dépressifs troublé travail/social/relations	DEP	144
DEPB_28A	Fréquence - sentiments = incapable accomplir activités quot.	DEP	145
DEPB_29A	Épisodes dépressifs dus à des causes physiques	DEP	145
DEPB_29B	Causes physiques ont toujours induit épisodes dépressifs	DEP	146

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 9

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
DEPB_30	Épisodes déjà survenus suite à la mort d'un être proche	DEP	146
DEPB_30A	Épisodes toujours survenus suite à la mort d'un être proche	DEP	147
DEPB_37	A remémoré l'âge exact du tout premier épisode dépressif	DEP	149
DEPB_371	Étape de vie quand tout premier épisode dépressif a eu lieu	DEP	152
DEPB_372	Épisode survenu suite à expérience stressante/à l'improviste	DEP	152
DEPB_38	A eu épisode dépressif 2 semaines ou plus - 12 m.	DEP	154
DEPB_38B	Nombre de jours sur 365 était dans un épisode dépressif	DEP	161
DEPB_58	Déjà eu année entière où avait épisode presque tous les jours	DEP	167
DEPB_64A	Fréquence - se sentait joyeux - 12 m.	DEP	171
DEPB_64B	Fréquence - se sentait au ralenti - 12 m.	DEP	171
DEPB_64C	Fréquence - plaisir à lire/écouter radio/regarder TV - 12 m.	DEP	172
DEPB_65A	Fréquence - pris plaisir aux choses qui plaisaient - 12 m.	DEP	172
DEPB_65B	Fréquence - pouvait rire/voir bon côté des choses - 12 m.	DEP	173
DEPB_65C	Fréquence - était intéressé à son apparence physique - 12 m.	DEP	173
DEPB_65D	Fréquence - se réjouissait d'avance faire des choses - 12 m.	DEP	174
DEPB_661	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.	DEP	176
DEPB_662	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.	DEP	177
DEPB_66A	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.	DEP	175
DEPB_66C	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.	DEP	178
DEPB_66D	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.	DEP	179
DEPB_68	Nbre de jrs/365 incapable totalement dû aux sentiments	DEP	180
DEPB_6A	Symptôme - pensait souvent à sa propre mort/mort en général	DEP	141
DEPB_6B	Symptôme - pensait qu'il vaudrait mieux être mort	DEP	141
DEPB_72	A consulté médecin/autre prof. pour sentiments	DEP	180
DEPB_73	A reçu traitement qui a aidé pour sentiments	DEP	183
DEPB_86	Reçu traitement professionnel pour sentiments - 12 m.	DEP	186
DEPB_87	Hospitalisé pour une nuit ou plus pour sentiments - vie	DEP	187
DEPB_8A	Période de référence de l'épisode dépressif - 12 m.	DEP	154
DEPB_8A2	Mois - quand unique épisode des 12 derniers mois a débuté	DEP	156
DEPB_8A3	Année - quand unique épisode des 12 derniers mois a débuté	DEP	157
DEPB_8A6	Unique épisode des 12 derniers mois - terminé/se poursuit	DEP	159
DEPB_8A9	Premier épisode des 12 derniers mois terminé/se poursuit	DEP	161
DEPB_A	Suicide - idéation durant pire/mauvais épisode	DEP	142
DEPBD664	Niveau de trouble (clôture à 4) - (D)	DEP	195
DEPBD667	Critère E, partie 3A1 - Trouble élevé - (D)	DEP	200
DEPBDA	Critère A, partie 1 et 2 - (D)	DEP	194

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 10

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
DEPBDA1	Critère A, partie 1 - (D)	DEP	191
DEPBDA2	Critère A, partie 2 - (D)	DEP	194
DEPBDA21	Critère A, partie 2 - symptôme 1 - (D)	DEP	191
DEPBDA22	Critère A, partie 2 - symptôme 2 - (D)	DEP	191
DEPBDA23	Critère A, partie 2 - symptôme 3 - (D)	DEP	192
DEPBDA24	Critère A, partie 2 - symptôme 4 - (D)	DEP	192
DEPBDA25	Critère A, partie 2 - symptôme 5 - (D)	DEP	192
DEPBDA26	Critère A, partie 2 - symptôme 6 - (D)	DEP	193
DEPBDA27	Critère A, partie 2 - symptôme 7 - (D)	DEP	193
DEPBDA28	Critère A, partie 2 - symptôme 8 - (D)	DEP	193
DEPBDA29	Critère A, partie 2 - symptôme 9 - (D)	DEP	194
DEPBDC	Critère C, partie 1 et 2 - (D)	DEP	196
DEPBDC1	Critère C, partie 1 - (D)	DEP	195
DEPBDC2	Critère C, partie 2 - (D)	DEP	195
DEPBDDPS	Algorithme épisode dépressif majeur - (D)	DEP	202
DEPBDDY	Algorithme épisode dépressif majeur - 12 m. - (D)	DEP	207
DEPBDE	Critère E, partie 1, 2 et 3 - (D)	DEP	202
DEPBDE1	Critère E, partie 1 - (D)	DEP	196
DEPBDE2	Critère E, partie 2 - (D)	DEP	199
DEPBDE21	Critère E, partie 2.1 - (D)	DEP	196
DEPBDE22	Critère E, partie 2.2 - (D)	DEP	197
DEPBDE23	Critère E, partie 2.3 - (D)	DEP	197
DEPBDE24	Critère E, partie 2.4 - (D)	DEP	198
DEPBDE25	Critère E, partie 2.5 - (D)	DEP	198
DEPBDE26	Critère E, partie 2.6 - (D)	DEP	199
DEPBDE3	Critère E, partie 3 - (D)	DEP	201
DEPBDE3A	Critère E, partie 3A - (D)	DEP	200
DEPBDE3B	Critère E, partie 3B - (D)	DEP	200
DEPBDE3C	Critère E, partie 3C - (D)	DEP	201
DEPBDE3E	Critère E, partie 3E - (D)	DEP	201
DEPBDINT	Trouble occasionné par la dépression - Moyenne - (D)	DEP	209
DEPBDYA	Critère A - 12 mois - (D)	DEP	206
DEPBDYB	Critère B - 12 mois - (D)	DEP	206
DEPBDYC	Critère C - 12 mois - (D)	DEP	207
DEPBFINT	Indicateur : trouble occasionné par dépression	DEP	210
DEPBFSLA	Indicateur : suicide - tentative - vie	DEP	208

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 11

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
DEPBFSLT	Indicateur : suicide - pensée - vie	DEP	207
DEPBFSYA	Indicateur : suicide - tentative - 12 m.	DEP	209
DEPBFSYT	Indicateur : suicide - pensée - 12 m.	DEP	208
DEPBG22A	Âge - lorsque pire épisode a commencé - (G)	DEP	119
DEPBG22B	Durée du pire épisode - (G)	DEP	120
DEPBG23A	Âge - lorsque dernier mauvais épisode a eu lieu - (G)	DEP	121
DEPBG23B	Durée du dernier pire épisode - (G)	DEP	122
DEPBG31	Nombre d'épisodes de 2 semaines ou plus - vie - (G)	DEP	148
DEPBG37A	Âge - exact tout premier épisode dépressif - (G)	DEP	150
DEPBG37B	Âge - approximatif premier épisode dépressif - (G)	DEP	151
DEPBG38C	Âge - lors du dernier épisode dépressif - (G)	DEP	162
DEPBG39A	Durée de l'épisode le plus long - (G)	DEP	163
DEPBG531	Nbre d'épisodes de 2 semaines résultat d'expériences stress.	DEP	164
DEPBG54	Nombre d'années eu au moins un épisode dépressif - (G)	DEP	165
DEPBG56	Plus longue pér. d'an. conséq. eu au moins 1 épis/an - (G)	DEP	166
DEPBG59	Nbre d'années eu épisode presque tous les jours - vie - (G)	DEP	168
DEPBG59A	Âge - 1ère fois où année eu épis. presque tous les jrs - (G)	DEP	169
DEPBG61	Plus longue pér d'an. conséq/épis presque tous les jrs - (G)	DEP	170
DEPBG721	Âge - 1ère fois consulté prof. au sujet de sentiments - (G)	DEP	181
DEPBG72A	Âge - 1ère fois consulté prof. au sujet de sentiments - (G)	DEP	182
DEPBG73A	Âge - 1ère fois reçu traitement qui a aidé pour sent. - (G)	DEP	184
DEPBG73B	Nbre de prof. consulté avant traitement qui a aidé - (G)	DEP	185
DEPBG74	Nbre total prof consulté au sujet des sentiments - vie - (G)	DEP	186
DEPBG7CA	Durée du premier épisode - (G)	DEP	153
DEPBG871	Âge - 1ère fois hospitalisé de nuit pour sentiments - (G)	DEP	188
DEPBG87A	Âge - 1ère fois hospitalisé de nuit pour sentiments - (G)	DEP	189
DEPBG88	Nombre de proches parents déjà eu épisode dépressif - (G)	DEP	190
DEPBG8A1	Nombre d'épisodes différents - 12 m.	DEP	155
DEPBG8AA	Durée de l'épisode unique de 12 mois - (G)	DEP	158
DEPBG8BA	Durée du premier de plusieurs épisode de 12 m. - (G)	DEP	160
DEPBGON	Âge à l'apparition de l'épisode dépressif majeur - (D,G)	DEP	203
DEPBGPER	Le plus long épisode relatif à la dépression - (G)	DEP	205
DEPBGREC	Âge plus récent épisode dépressif majeur - (D,G)	DEP	204
DEPBISYA	Code d'imputation pour DEPBFSYA	DEP	209
DEPBISYT	Code d'imputation pour DEPBFSYT	DEP	208
DHHB_SEX	Sexe	DHH	3

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 12

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
DHHBDECF	Type de ménage - (D)	DHH	902
DHHBG611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D,G)	DHH	901
DHHBGAGE	Âge - (G)	DHH	3
DHHBGBED	Logement - nombre de chambres à coucher - (G)	DHH	903
DHHBGL12	Nbre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D,G)	DHH	900
DHHBGLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D,G)	DHH	901
DHHBGLVG	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D,G)	DHH	903
DHHBGMS	État matrimonial - (G)	DHH	4
DISB_10A	Fréquence - détresse : senti épuisé - mois passé	DIS	95
DISB_10B	Fréquence - détresse : senti nerveux - mois passé	DIS	96
DISB_10C	Fréq/-détresse : si nerveux rien pouvait calmer - mois passé	DIS	96
DISB_10D	Fréquence - détresse : senti désespéré - mois passé	DIS	97
DISB_10E	Fréquence - détresse : senti agité/pas en place - mois passé	DIS	97
DISB_10F	Fréq - détresse : ne pouvait pas rester inactif - mois passé	DIS	98
DISB_10G	Fréquence - détresse : senti triste/déprimé - mois passé	DIS	98
DISB_10H	Fréquence - détresse : déprimé/rien fait sourire - m. passé	DIS	99
DISB_10I	Fréquence - détresse : senti tout était effort - mois passé	DIS	99
DISB_10J	Fréquence - détresse : senti bon à rien - mois passé	DIS	100
DISB_10K	Fréquence - détresse : survenance des sentiments - m. passé	DIS	100
DISB_10L	Degré de survenance élevé des sentiments - mois passé	DIS	101
DISB_10M	Degré de faible survenance des sentiments - mois passé	DIS	101
DISB_10N	Interférence - sentiments dans la vie/activités - mois passé	DIS	102
DISBDCHR	Échelle de chronicité de détresse/incapacité-mois passé-(D)	DIS	103
DISBDDSX	Échelle de détresse - K10 - mois passé - (D)	DIS	102
DISBDK6	Échelle de détresse - K6 - mois passé - (D)	DIS	103
EDUBDH04	Plus haut niveau d'études - ménage, 4 niveaux - (D)	EDU	899
EDUBDH10	Plus haut niveau d'études - ménage, 10 niveaux - (D)	EDU	900
EDUBDR04	Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D)	EDU	898
EDUBDR10	Plus haut niveau d'études - répondant, 10 niveaux - (D)	EDU	899
ETAB_01A	A eu une peur intense d'être trop gros/embonpoint - vie	ETA	562
ETAB_01B	A eu une peur intense d'être trop gros/embonpoint - 12 m.	ETA	563
ETAB_02	Fréquence - été terrifié d'être trop gros	ETA	563
ETAB_03	Fréquence - évité de manger quand avait faim	ETA	564
ETAB_04	Fréquence - été préoccupé par la nourriture	ETA	564
ETAB_05	Fréquence - eu des épisodes de gloutonnerie	ETA	565
ETAB_06	Fréquence - découpé les aliments en petits morceaux	ETA	565

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 13

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
ETAB_07	Fréquence - été conscient de la valeur calorique	ETA	566
ETAB_08	Fréquence - évité les aliments riches en glucide	ETA	566
ETAB_09	Fréquence - manger plus serait apprécié par les autres	ETA	567
ETAB_10	Fréquence - vomis après avoir mangé	ETA	567
ETAB_11	Fréquence - senti coupable après avoir mangé	ETA	568
ETAB_12	Fréquence - préoccupé par le désir d'être plus mince	ETA	569
ETAB_13	Fréquence - préoccupé à brûler calories en faisant exercice	ETA	570
ETAB_14	Fréquence - répondant trop mince selon les autres personnes	ETA	571
ETAB_15	Fréquence - préoccupé d'avoir de la graisse sur le corps	ETA	572
ETAB_16	Fréquence - pris plus de temps à prendre ses repas	ETA	573
ETAB_17	Fréquence - évité de manger des aliments contenant du sucre	ETA	574
ETAB_18	Fréquence - a mangé des aliments diététiques	ETA	575
ETAB_19	Fréquence - eu impression que la nourriture dominait la vie	ETA	576
ETAB_20	Fréquence - démontré capacité à contrôler son alimentation	ETA	577
ETAB_21	Fréquence - autres personnes poussaient à manger	ETA	578
ETAB_22	Fréquence - accordé trop de temps/pensée à la nourriture	ETA	579
ETAB_23	Fréquence - se sentait mal à l'aise après mangé sucreries	ETA	580
ETAB_24	Fréquence - mis à la diète	ETA	581
ETAB_25	Fréquence - aimait avoir l'estomac vide	ETA	582
ETAB_26	Fréquence - ressentait le besoin de vomir après les repas	ETA	583
ETAB_27	Fréquence - aimait des aliments nouveaux et riches	ETA	584
ETABDIND	Résultat de l'indice du Test d'attitudes alimentaires - (D)	ETA	584
ETABFIND	Indicateur : test d'attitudes alimentaires	ETA	585
GENB_01	Évaluation personnelle de la santé	GEN	4
GENB_02	Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier	GEN	5
GENB_03	Nombre d'heures passé à dormir chaque nuit	GEN	6
GENB_04	Fréquence - problèmes à s'endormir	GEN	7
GENB_05	Fréquence - sommeil est réparateur	GEN	7
GENB_06	Fréquence - difficulté à rester éveillé	GEN	8
GENB_07	Évaluation personnelle du stress	GEN	8
GENB_08	A travaillé à un emploi ou entreprise - 12 derniers mois	GEN	9
GENB_09	Évaluation personnelle du stress au travail	GEN	9
GENB_10	Sentiment d'appartenance à la communauté locale	GEN	10
GENBDHDI	Indice de la description de la santé - (D)	GEN	10
GEOB_PRV	Province	GEO	1
GEOBGHR4	Région socio-sanitaire - (G)	GEO	2

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 14

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
HWTB_1	Enceinte actuellement	HWT	39
HWTB_4	Opinion du répondant à propos de son poids	HWT	40
HWTBGBMI	Indice de la masse corporelle - (D,G)	HWT	42
HWTBGHT	Taille - (G)	HWT	41
HWTBGSW	Poids standard - (D,G)	HWT	42
HWTBGWTK	Poids - kilogrammes - (D,G)	HWT	42
IDGB_01	Consommé - marijuana, cannabis ou haschich - vie	IDG	502
IDGB_02	Consommé - marijuana, cannabis ou haschich - 12 m.	IDG	502
IDGB_03	Fréquence - marijuana, cannabis - 12 m.	IDG	503
IDGB_04	Consommé - cocaïne ou crack - vie	IDG	503
IDGB_05	Consommé - cocaïne ou crack - 12 m.	IDG	504
IDGB_06	Fréquence - cocaïne ou crack - 12 m.	IDG	504
IDGB_07	Consommé - speed (amphétamines) - vie	IDG	505
IDGB_08	Consommé - speed (amphétamines) - 12 m.	IDG	505
IDGB_09	Fréquence - speed (amphétamines) - 12 m.	IDG	506
IDGB_10	Consommé - ecstasy (MDMA) - vie	IDG	506
IDGB_11	Consommé - ecstasy (MDMA) - 12 m.	IDG	507
IDGB_12	Fréquence - ecstasy (MDMA) - 12 m.	IDG	507
IDGB_13	Consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - vie	IDG	508
IDGB_14	Consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - 12 m.	IDG	508
IDGB_15	Fréquence - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - 12 m.	IDG	509
IDGB_16	Inhalé - colle, essence ou autres solvants - vie	IDG	509
IDGB_17	Inhalé - colle, essence ou autres solvants - 12 m.	IDG	510
IDGB_18	Fréquence - colle, essence ou autres solvants - 12 m.	IDG	510
IDGB_19	Consommé - héroïne - vie	IDG	511
IDGB_20	Consommé - héroïne - 12 m.	IDG	511
IDGB_21	Fréquence - héroïne - 12 m.	IDG	512
IDGB_22	Consommé - stéroïdes - vie	IDG	512
IDGB_23	Consommé - stéroïdes - 12 m.	IDG	513
IDGB_24	Fréquence - stéroïdes - 12 m.	IDG	513
IDGB_25A	Eu besoin plus de drogues pour ressentir effet - 12 m.	IDG	514
IDGB_25B	Eu symptôme lors de période dimunition/sans drogue - 12 m.	IDG	515
IDGB_25C	Consommé drogues pour éviter d'avoir des symptômes - 12 m.	IDG	516
IDGB_25D	Consommé drogues - même si promis de ne pas le faire - 12 m.	IDG	517
IDGB_25E	A consommé drogues plus fréquemment que prévu - 12 m.	IDG	518
IDGB_25F	Consommé drogues - peu temps pour autre chose - 12 m.	IDG	519

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 15

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
IDGB_25G	A réduit activités importantes - à cause des drogues - 12 m.	IDG	520
IDGB_25H	Continué à prendre drogues malgré problèmes de santé - 12 m.	IDG	521
IDGB_26A	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.	IDG	523
IDGB_26C	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.	IDG	526
IDGB_26D	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.	IDG	527
IDGB_5A1	Eu besoin plus de drogues pour ressentir effet - vie	IDG	515
IDGB_5AA	Consommé drogues au moins 1 fois/mois pendant 1 an - vie	IDG	514
IDGB_5AL	Eu besoin plus de drogues pour ressentir effet - vie	IDG	528
IDGB_5B1	Eu symptôme lors de période dimuntion/sans drogue - vie	IDG	516
IDGB_5BL	Eu symptôme lors de période dimuntion/sans drogue - vie	IDG	528
IDGB_5C1	Consommé drogues pour éviter d'avoir des symptômes - vie	IDG	517
IDGB_5CL	Consommé drogues pour éviter d'avoir des symptômes - vie	IDG	529
IDGB_5D1	Consommé drogues - même si promis de ne pas le faire - vie	IDG	518
IDGB_5DL	Consommé drogues même si promis de ne pas le faire - vie	IDG	529
IDGB_5E1	A consommé drogues plus fréquemment que prévu - vie	IDG	519
IDGB_5EL	A consommé drogues plus fréquemment que prévu - vie	IDG	530
IDGB_5F1	Consommé drogues - peu temps pour autre chose - vie	IDG	520
IDGB_5FL	Consommé drogues - peu temps pour autre chose - vie	IDG	530
IDGB_5G1	A réduit activités importantes - à cause des drogues - vie	IDG	521
IDGB_5GL	A réduit activités importantes - à cause des drogues - vie	IDG	531
IDGB_5H1	Continué à prendre drogues malgré problèmes de santé - vie	IDG	522
IDGB_5HL	Continué à prendre drogues malgré problèmes de santé - vie	IDG	531
IDGB_6B1	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.	IDG	524
IDGB_6B2	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.	IDG	525
IDGBDINT	Trouble occasionné par drogues illicites - moy - 12 m. - (D)	IDG	537
IDGBFINT	Indicateur : trouble occasionné par drogues illicites - 12 m	IDG	538
IDGBFLA	Cons. drogues ill. - incluant une seule fois cannabis - vie	IDG	535
IDGBFLAC	Cons. drogues ill. - excluant une seule fois cannabis - vie	IDG	535
IDGBFLAM	Consommation amphétamines (speed) - vie	IDG	533
IDGBFLCA	Consommation cannabis - incluant une seule fois - vie	IDG	532
IDGBFLCM	Consommation cannabis - excluant une seule fois - vie	IDG	532
IDGBFLCO	Consommation cocaïne / crack - vie	IDG	533
IDGBFLEX	Consommation MDMA (ecstasy) - vie	IDG	533
IDGBFLGL	Consommation colle, essence ou autres solvants - vie	IDG	534
IDGBFLHA	Consommation hallucinogènes, PCP, LSD - vie	IDG	534
IDGBFLHE	Consommation d'héroïne - vie	IDG	534

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 16

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
IDGBFLST	Consommation de stéroïdes - vie	IDG	535
IDGBFYA	Cons. drogues ill. - incl. une seule fois cannabis - 12 m.	IDG	536
IDGBFYAC	Cons. drogues ill. - excl. une seule fois cannabis - 12 m.	IDG	536
IDGBFYCM	Consommation cannabis - excluant une seule fois - 12 m.	IDG	532
IDGBFYDP	Critère - Dépendance aux drogues - 12 m.	IDG	537
INCB DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	INC	923
INCB DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	INC	924
INCB DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	INC	924
INCBG2	Revenu total du ménage - source principale - (G)	INC	923
INCBGHH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D,G)	INC	925
INCBGPER	Revenu personnel total de toutes sources - (D,G)	INC	925
LBFB_31A	Occupation - emploi principal ou entreprise	LBF	907
LBFB DHPW	Total d'heures régulières travaillées par semaine - (D)	LBF	909
LBFB DMJS	L'état d'emploi multiple - (D)	LBF	909
LBFB DPFT	Heures régulières travaillées - temps plein / temps partiel	LBF	910
LBFB DWSL	L'état de l'emploi la semaine dernière - 6 groupes - (D)	LBF	908
LBFB DWSS	L'état de l'emploi la semaine dernière - 4 groupes - (D)	LBF	907
LBFBG31	État du travail à son compte - emploi / entreprise prin -(G)	LBF	906
LBFBGJST	L'état de l'emploi au cours de l'an dernier - (D,G)	LBF	910
LBFBGRNW	Raison principale d'être sans emploi/semaine dern. - (D,G)	LBF	908
MEDB_11A	Consommé des médicaments pour aider à dormir - 12 m.	MED	785
MEDB_11B	Consommé des pilules pour maigrir - 12 m.	MED	786
MEDB_11C	Consommé médicaments pour réduire l'anxiété - 12 m.	MED	786
MEDB_11D	Consommé des régulateurs de l'humeur - 12 m.	MED	787
MEDB_11E	Consommé des antidépresseurs - 12 m.	MED	787
MEDB_11F	Consommé des méd. traiter comportements psychotiques - 12 m.	MED	788
MEDB_11G	Consommé des stimulants - 12 m.	MED	788
MEDB_2	2 derniers jours - nombre de médicaments pris	MED	844
MEDB_3AA	Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 1	MED	846
MEDB_3BA	Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 2	MED	848
MEDB_3CA	Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 3	MED	850
MEDB_3DA	Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 4	MED	852
MEDB_3EA	Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 5	MED	854
MEDB_3FA	Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 6	MED	856
MEDB_3GA	Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 7	MED	858
MEDB_3HA	Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 8	MED	860

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 17

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
MEDB_3IA	Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 9	MED	862
MEDB_3JA	Ordonnance un docteur en médecine ou dentiste-médicament 10	MED	863
MEDB_3KA	Ordonnance un docteur en médecine ou dentiste-médicament 11	MED	865
MEDB_3LA	Ordonnance un docteur en médecine ou dentiste-médicament 12	MED	866
MEDB_4	Assurance couvre entièrement/en partie coût médicaments	MED	866
MEDB_5	Utilisé autres produits de santé pour santé mentale - 12 m.	MED	867
MEDB_6A	Produit pour la santé utilisé - Herbe de Saint-Jean	MED	867
MEDB_6B	Produit pour la santé utilisé - valériane	MED	868
MEDB_6C	Produit pour la santé utilisé - camomille	MED	868
MEDB_6D	Produit pour la santé utilisé - ginseng	MED	869
MEDB_6E	Produit pour la santé utilisé - kava kava	MED	869
MEDB_6F	Produit pour la santé utilisé - lavande	MED	870
MEDB_6G	Produit pour la santé utilisé - poivre des moines	MED	870
MEDB_6H	Produit pour la santé utilisé - actée à grappe noire	MED	871
MEDB_6I	Produit pour la santé utilisé - ginkgo biloba	MED	871
MEDB_6J	Produit pour la santé utilisé - NeuRocover-DA	MED	872
MEDB_6K	Produit pour la santé utilisé - vitamines	MED	872
MEDB_6L	Produit pour la santé utilisé - autre	MED	873
MEDB_7	Produit pour santé recommandé par un professionnel	MED	873
MEDB_8A	Produit pour santé recommandé par un psychiatre	MED	874
MEDB_8B	Produit pour santé recommandé par un médecin/omnipraticien	MED	874
MEDB_8C	Produit pour santé recommandé par un autre médecin	MED	875
MEDB_8D	Produit pour santé recommandé par un psychologue	MED	875
MEDB_8E	Produit pour santé recommandé par un chiropraticien	MED	876
MEDB_8F	Produit pour santé recommandé par une infirmière	MED	876
MEDB_8G	Produit pour santé recommandé par un travailleur social	MED	877
MEDB_8H	Produit pour santé recommandé par un homéopathe/naturopathe	MED	877
MEDB_8I	Produit pour santé recommandé par un herboriste	MED	878
MEDB_8J	Produit pour santé recommandé par un relaxologue	MED	878
MEDB_8K	Produit pour santé recommandé par instructeur de biofeedback	MED	879
MEDB_8L	Produit pour santé recommandé par autre	MED	879
MEDB_A1	Médicaments pour dormir sous supervision professionnelle	MED	789
MEDB_A2A	Médicaments pour dormir prescrits par un psychiatre	MED	789
MEDB_A2B	Médicaments pour dormir prescrits par méd. de famille/omni	MED	790
MEDB_A2C	Médicaments pour dormir prescrits par un autre médecin	MED	790
MEDB_A2D	Médicaments pour dormir prescrits par autre professionnel	MED	791

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 18

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
MEDB_A3	Jours où oublié/pris moins de médicaments pour dormir	MED	791
MEDB_A4A	Raison pas/moins méd - A oublié	MED	792
MEDB_A4B	Raison pas/moins méd - Se sentait mieux	MED	792
MEDB_A4C	Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas	MED	793
MEDB_A4D	Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer	MED	793
MEDB_A4E	Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament	MED	794
MEDB_A4F	Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament	MED	794
MEDB_A4G	Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd.	MED	795
MEDB_A4H	Raison pas/moins méd - Effets secondaires	MED	795
MEDB_A4I	Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant	MED	796
MEDB_A4J	Raison pas/moins méd - Autre raison	MED	796
MEDB_B1	Pilules pour maigrir sous supervision professionnelle	MED	797
MEDB_B2A	Pilules pour maigrir prescrites par un psychiatre	MED	797
MEDB_B2B	Pilules pour maigrir prescrites par méd. de famille/omni	MED	798
MEDB_B2C	Pilules pour maigrir prescrites par un autre médecin	MED	798
MEDB_B2D	Pilules pour maigrir prescrites par autre professionnel	MED	799
MEDB_B3	Jours où oublié/pris moins de pilules pour maigrir	MED	799
MEDB_B4A	Raison pas/moins méd - A oublié	MED	800
MEDB_B4B	Raison pas/moins méd - Se sentait mieux	MED	800
MEDB_B4C	Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas	MED	801
MEDB_B4D	Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer	MED	801
MEDB_B4E	Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament	MED	802
MEDB_B4F	Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament	MED	802
MEDB_B4G	Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd.	MED	803
MEDB_B4H	Raison pas/moins méd - Effets secondaires	MED	803
MEDB_B4I	Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant	MED	804
MEDB_B4J	Raison pas/moins méd - Autre raison	MED	804
MEDB_C1	Médicaments contre anxiété sous supervision professionnelle	MED	805
MEDB_C2A	Médicaments contre anxiété prescrits par un psychiatre	MED	805
MEDB_C2B	Médicaments contre anxiété prescrits par méd. famille/omni	MED	806
MEDB_C2C	Médicaments contre anxiété prescrits par un autre médecin	MED	806
MEDB_C2D	Médicaments contre anxiété prescrits par autre professionnel	MED	807
MEDB_C3	Jours où oublié/pris moins de médicaments contre anxiété	MED	807
MEDB_C4A	Raison pas/moins méd - A oublié	MED	808
MEDB_C4B	Raison pas/moins méd - Se sentait mieux	MED	808
MEDB_C4C	Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas	MED	809

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 19

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
MEDB_C4D	Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer	MED	809
MEDB_C4E	Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament	MED	810
MEDB_C4F	Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament	MED	810
MEDB_C4G	Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd.	MED	811
MEDB_C4H	Raison pas/moins méd - Effets secondaires	MED	811
MEDB_C4I	Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant	MED	812
MEDB_C4J	Raison pas/moins méd - Autre raison	MED	812
MEDB_D1	Régulateurs de l'humeur sous supervision professionnelle	MED	813
MEDB_D2A	Régulateurs de l'humeur prescrits par un psychiatre	MED	813
MEDB_D2B	Régulateurs de l'humeur prescrits par méd. de famille/omni	MED	814
MEDB_D2C	Régulateurs de l'humeur prescrits par un autre médecin	MED	814
MEDB_D2D	Régulateurs de l'humeur prescrits par autre professionnel	MED	815
MEDB_D3	Jours où oublié/pris moins de régulateurs de l'humeur	MED	815
MEDB_D4A	Raison pas/moins méd - A oublié	MED	816
MEDB_D4B	Raison pas/moins méd - Se sentait mieux	MED	816
MEDB_D4C	Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas	MED	817
MEDB_D4D	Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer	MED	817
MEDB_D4E	Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament	MED	818
MEDB_D4F	Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament	MED	818
MEDB_D4G	Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd.	MED	819
MEDB_D4H	Raison pas/moins méd - Effets secondaires	MED	819
MEDB_D4I	Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant	MED	820
MEDB_D4J	Raison pas/moins méd - Autre raison	MED	820
MEDB_E1	Antidépresseurs sous supervision professionnelle	MED	821
MEDB_E2A	Antidépresseurs prescrits par un psychiatre	MED	821
MEDB_E2B	Antidépresseurs prescrits par méd. de famille/omni	MED	822
MEDB_E2C	Antidépresseurs prescrits par un autre médecin	MED	822
MEDB_E2D	Antidépresseurs prescrits par autre professionnel	MED	823
MEDB_E3	Jours où oublié/pris moins de antidépresseurs	MED	823
MEDB_E4A	Raison pas/moins méd - A oublié	MED	824
MEDB_E4B	Raison pas/moins méd - Se sentait mieux	MED	824
MEDB_E4C	Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas	MED	825
MEDB_E4D	Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer	MED	825
MEDB_E4E	Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament	MED	826
MEDB_E4F	Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament	MED	826
MEDB_E4G	Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd.	MED	827

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 20

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
MEDB_E4H	Raison pas/moins méd - Effets secondaires	MED	827
MEDB_E4I	Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant	MED	828
MEDB_E4J	Raison pas/moins méd - Autre raison	MED	828
MEDB_F1	Méd. antipsychotique sous supervision professionnelle	MED	829
MEDB_F2A	Méd. antipsychotiques prescrits par un psychiatre	MED	829
MEDB_F2B	Méd. antipsychotiques prescrits par méd. de famille/omni	MED	830
MEDB_F2C	Méd. antipsychotiques prescrits par un autre médecin	MED	830
MEDB_F2D	Méd. antipsychotiques prescrits par autre professionnel	MED	831
MEDB_F3	Jours où oublié/pris moins de méd. antipsychotiques	MED	831
MEDB_F4A	Raison pas/moins méd - A oublié	MED	832
MEDB_F4B	Raison pas/moins méd - Se sentait mieux	MED	832
MEDB_F4C	Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas	MED	833
MEDB_F4D	Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer	MED	833
MEDB_F4E	Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament	MED	834
MEDB_F4F	Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament	MED	834
MEDB_F4G	Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd.	MED	835
MEDB_F4H	Raison pas/moins méd - Effets secondaires	MED	835
MEDB_F4I	Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant	MED	836
MEDB_F4J	Raison pas/moins méd - Autre raison	MED	836
MEDB_G1	Stimulants sous supervision professionnelle	MED	837
MEDB_G2A	Stimulants prescrits par un psychiatre	MED	837
MEDB_G2B	Stimulants prescrits par méd. de famille/omni	MED	838
MEDB_G2C	Stimulants prescrits par un autre médecin	MED	838
MEDB_G2D	Stimulants prescrits par autre professionnel	MED	839
MEDB_G3	Jours où oublié/pris moins de stimulants	MED	839
MEDB_G4A	Raison pas/moins méd - A oublié	MED	840
MEDB_G4B	Raison pas/moins méd - Se sentait mieux	MED	840
MEDB_G4C	Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas	MED	841
MEDB_G4D	Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer	MED	841
MEDB_G4E	Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament	MED	842
MEDB_G4F	Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament	MED	842
MEDB_G4G	Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd.	MED	842
MEDB_G4H	Raison pas/moins méd - Effets secondaires	MED	843
MEDB_G4I	Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant	MED	843
MEDB_G4J	Raison pas/moins méd - Autre raison	MED	844
MEDBG03A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	MED	845

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 21

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
MEDBG03B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	MED	847
MEDBG03C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	MED	849
MEDBG03D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	MED	851
MEDBG03E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	MED	853
MEDBG03F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	MED	855
MEDBG03G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	MED	857
MEDBG03H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	MED	859
MEDBG03I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	MED	861
MEDBG03J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	MED	862
MEDBG03K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	MED	864
MEDBG03L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	MED	865
MHPBFINT	Indicateur : trouble déclaré	DSM	457
MHPBFL	Troubles dépendance sélectionnés - vie	DSM	454
MHPBFLA	Troubles sélectionnés d'anxiété - vie	DSM	455
MHPBFLM	Troubles sélectionnés de l'humeur - vie	DSM	455
MHPBFY	Troubles/toxico-dépendance sélectionnés - 12 m.	DSM	455
MHPBFYA	Troubles sélectionnés d'anxiété - 12 m.	DSM	456
MHPBFYM	Troubles sélectionnés de l'humeur - 12 m.	DSM	456
MHPBFYSA	Toxico-dépendances sélectionnées - 12 m.	DSM	456
MHPBGAON	Âge à l'apparition - Troubles sélectionnés - (D,G)	DSM	458
MIAB_01	Changements cognitifs/comportements périodes excitées	MIA	210
MIAB_03	Épisode excité avec plus grand nombre de changements	MIA	211
MIAB_04	Symptôme - irritable/grincheux durant épisode où excité	MIA	216
MIAB_05	Changements cognitifs/comportements durant période irritable	MIA	216
MIAB_06	Épisode irritable avec plus grand nombre de changements	MIA	217
MIAB_07A	Symptôme - devenu nerveux ou agité	MIA	222
MIAB_07B	Symptôme - devenu trop amical / trop familier avec les gens	MIA	222
MIAB_07C	Symptôme - agissait de manière inappropriée	MIA	223
MIAB_07D	Symptôme - avait plus d'intérêt pour le sexe que d'habitude	MIA	223
MIAB_07E	Symptôme - essayait des choses impossibles à réaliser	MIA	224
MIAB_07F	Symptôme - parlait beaucoup plus que d'habitude	MIA	224
MIAB_07G	Symptôme - changeait constamment projets / activités	MIA	225
MIAB_07H	Symptôme - était facilement distrait	MIA	225
MIAB_07I	Symptôme - pensées passaient d'une chose à l'autre	MIA	226
MIAB_07J	Symptôme - dormait beaucoup moins qu'à l'hab. sans fatigue	MIA	226
MIAB_07K	Symptôme - impliqué dans projets insensés pour gagner \$	MIA	227

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 22

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
MIAB_07L	Symptôme - dépensait plus d'argent que d'habitude	MIA	227
MIAB_07M	Symptôme - faisait des choses risquées pour le plaisir	MIA	228
MIAB_07N	Symptôme - avait une confiance en soi grandement exagérée	MIA	228
MIAB_07O	Symptôme - pensait être quelqu'un d'autre	MIA	229
MIAB_09	Épisode de manie troublé travail/social/relations	MIA	231
MIAB_09A	Fréquence - sentiments = incapable accomplir activités quot.	MIA	231
MIAB_09B	Gens se sont inquiétés des agissements du répondant	MIA	232
MIAB_10A	Épisode de manie dû à des causes physiques	MIA	232
MIAB_10B	Causes physiques ont toujours induit épisodes de manie	MIA	233
MIAB_18	A remémoré l'âge exact du tout premier épisode de manie	MIA	233
MIAB_181	Étape de vie quand tout premier épisode de manie a eu lieu	MIA	235
MIAB_18C	Épisode survenu suite à expérience stressante/à l'improviste	MIA	236
MIAB_19	A eu un épisode de manie - 12 m.	MIA	238
MIAB_191	A eu un seul épisode de manie - 12 m.	MIA	238
MIAB_19A	Période de référence de l'épisode de manie - 12 m.	MIA	239
MIAB_202	Épisode d'une semaine + dû à expérience stress./improviste	MIA	245
MIAB_212	Épisode de moins une semaine dû à exp. stress./improviste	MIA	248
MIAB_24	Épisode unique de vie suite à expérience stress./improviste	MIA	251
MIAB_271	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.	MIA	253
MIAB_272	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.	MIA	254
MIAB_27A	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.	MIA	252
MIAB_27C	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.	MIA	255
MIAB_27D	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.	MIA	256
MIAB_29	Nbre de jrs/365 incapable totalement dû à manie - 12 m.	MIA	257
MIAB_33	A consulté médecin/autre prof. pour épisode manie	MIA	257
MIAB_45	A reçu traitement qui a aidé pour épisode de manie	MIA	259
MIAB_47	Reçu traitement professionnel pour épisode de manie - 12 m.	MIA	262
MIAB_48	Hospitalisé pour une nuit ou plus épisode de manie - vie	MIA	263
MIABD277	Critère D, partie 1A - Trouble occasionné - (D)	MIA	268
MIABDA	Critère A, partie 1 et 2 - (D)	MIA	265
MIABDA1	Critère A, partie 1 - (D)	MIA	264
MIABDA2	Critère A, partie 2 - (D)	MIA	265
MIABDB	Critère B - (Symptômes combinés1 à 7) - (D)	MIA	268
MIABDB1	Critère B - symptôme 1 - (D)	MIA	265
MIABDB2	Critère B - symptôme 2 - (D)	MIA	266
MIABDB3	Critère B - symptôme 3 - (D)	MIA	266

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 23

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
MIABDB4	Critère B - symptôme 4 - (D)	MIA	266
MIABDB5	Critère B - symptôme 5 - (D)	MIA	267
MIABDB6	Critère B - symptôme 6 - (D)	MIA	267
MIABDB7	Critère B - symptôme 7 - (D)	MIA	267
MIABDBI	Critère B - irritable - (D)	MIA	268
MIABDD	Critère D - (D)	MIA	270
MIABDD1	Critère D, partie 1 - (D)	MIA	269
MIABDD2	Critère D, partie 2 - (D)	MIA	269
MIABDD3	Critère D, partie 3 - (D)	MIA	269
MIABDEPS	Algorithme de manie - vie - (D)	MIA	270
MIABDEY	Algorithme de manie - 12 mois -(D)	MIA	275
MIABDINT	Trouble occasionné par manie - moyenne - (D)	MIA	275
MIABDYA	Critère A - 12 mois - (D)	MIA	274
MIABDYB	Critère B - 12 mois - (D)	MIA	274
MIABDYC	Critère C - Trouble occasionné - (D)	MIA	274
MIABFINT	Indicateur : trouble occasionné par manie	MIA	276
MIABG03A	Âge lors épisode excité avec + de changements - (G)	MIA	212
MIABG03C	Âge - quand plus récent épisode excité est survenu	MIA	214
MIABG06A	Âge - lors épi. irritable/grincheux avec + changements - (G)	MIA	218
MIABG06C	Âge - quand plus récent épisode irritable est survenu - (G)	MIA	220
MIABG08	Nombre d'épisodes où était excité / irritable - vie - (G)	MIA	230
MIABG18A	Âge - exact tout premier épisode de manie - (G)	MIA	234
MIABG18B	Âge - approximatif premier épisode de manie - (G)	MIA	235
MIABG18D	Durée du tout premier épisode de manie - (G)	MIA	237
MIABG19B	Nombre d'épisodes de manie - 12 m. - (G)	MIA	240
MIABG19C	Nombre de semaines eu épisode de manie - 12 m. - (G)	MIA	241
MIABG19D	Âge - dernière fois eu épisode de manie - (G)	MIA	242
MIABG20	Nombre d'épisodes de manie d'une semaine ou plus - vie - (G)	MIA	243
MIABG201	Nbre d'épisodes d'une semaine + dûs à exp. stressante - (G)	MIA	244
MIABG21	Nombre d'épis. de manie de moins d'une semaine - vie - (G)	MIA	246
MIABG211	Nbre d'épis. moins d'une semaine dûs à exp. stressante - (G)	MIA	247
MIABG22	Durée du plus long épisode de manie - vie - (G)	MIA	249
MIABG23	Nombre d'années distinctes où eu au moins un épisode - (G)	MIA	250
MIABG33A	Âge - première fois consulté prof. au sujet épis manie - (G)	MIA	258
MIABG3B	Durée épisode le plus excité - (G)	MIA	213
MIABG3D	Durée du plus récent épisode où excité - (G)	MIA	215

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 24

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
MIABG45A	Âge - 1ère fois traitement qui a aidé pour épis. manie - (G)	MIA	260
MIABG45B	Nbre de prof. consulté avant traitement qui a aidé - (G)	MIA	261
MIABG45C	Nbre total prof. consulté au sujet épisode manie - vie - (G)	MIA	262
MIABG481	Nombre de proches parents - déjà eu épisodes de manie - (G)	MIA	264
MIABG48A	Âge - première fois été hospitalisé pour épisode manie - (G)	MIA	263
MIABG6B	Durée épisode irritable avec + de changements - (G)	MIA	219
MIABG6D	Durée du plus récent épisode où irritable - (G)	MIA	221
MIABGON	Âge à l'apparition de l'épisode de la manie - (D,G)	MIA	271
MIABGPER	La plus longue période relative à la manie - (G, D)	MIA	273
MIABGREC	Âge au plus récent épisode de manie - (D,G)	MIA	272
PACB_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PAC	43
PACB_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur	PAC	43
PACB_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PAC	44
PACB_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PAC	44
PACB_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale	PAC	45
PACB_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PAC	45
PACB_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PAC	46
PACB_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PAC	46
PACB_1I	Activité / 3 derniers mois - patin roues alignées	PAC	47
PACB_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PAC	47
PACB_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PAC	48
PACB_1L	Activité / 3 derniers mois - classe d'exercices ou aérobic	PAC	48
PACB_1M	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	PAC	49
PACB_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PAC	49
PACB_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PAC	50
PACB_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PAC	50
PACB_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PAC	51
PACB_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PAC	51
PACB_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	PAC	52
PACB_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball	PAC	52
PACB_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	PAC	53
PACB_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité	PAC	53
PACB_1W	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)	PAC	54
PACB_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	PAC	54
PACB_2A	Nombre de fois participé - marche pour l'exercice	PAC	55
PACB_2B	Nombre de fois participé - jardinage	PAC	56

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 25

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
PACB_2C	Nombre de fois participé - natation	PAC	57
PACB_2D	Nombre de fois participé - bicyclette	PAC	58
PACB_2E	Nombre de fois participé - danse moderne / sociale	PAC	59
PACB_2F	Nombre de fois participé - exercices à la maison	PAC	60
PACB_2G	Nombre de fois participé - hockey sur glace	PAC	61
PACB_2H	Nombre de fois participé - patinage sur glace	PAC	62
PACB_2I	Nombre de fois participé - patin à roues alignées	PAC	63
PACB_2J	Nombre de fois participé - jogging / course	PAC	64
PACB_2K	Nombre de fois participé - golf	PAC	65
PACB_2L	Nombre de fois participé - classe d'exercices / aérobic	PAC	66
PACB_2M	Nombre de fois participé - ski alpin ou planche à neige	PAC	67
PACB_2N	Nombre de fois participé - quilles	PAC	68
PACB_2O	Nombre de fois participé - baseball / balle molle	PAC	69
PACB_2P	Nombre de fois participé - tennis	PAC	70
PACB_2Q	Nombre de fois participé - poids et haltères	PAC	71
PACB_2R	Nombre de fois participé - pêche	PAC	72
PACB_2S	Nombre de fois participé - volleyball	PAC	73
PACB_2T	Nombre de fois participé - basketball	PAC	74
PACB_2U	Nombre de fois participé - autre activité (#1)	PAC	75
PACB_2W	Nombre de fois participé - autre activité (#2)	PAC	76
PACB_2X	Nombre de fois participé - autre activité (#3)	PAC	77
PACB_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PAC	55
PACB_3B	Temps consacré - jardinage	PAC	56
PACB_3C	Temps consacré - natation	PAC	57
PACB_3D	Temps consacré - bicyclette	PAC	58
PACB_3E	Temps consacré - danse moderne / sociale	PAC	59
PACB_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PAC	60
PACB_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PAC	61
PACB_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PAC	62
PACB_3I	Temps consacré - patins à roues alignées	PAC	63
PACB_3J	Temps consacré - jogging / course	PAC	64
PACB_3K	Temps consacré - golf	PAC	65
PACB_3L	Temps consacré - classe d'exercices / aérobic	PAC	66
PACB_3M	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	PAC	67
PACB_3N	Temps consacré - quilles	PAC	68
PACB_3O	Temps consacré - baseball / balle molle	PAC	69

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 26

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
PACB_3P	Temps consacré - tennis	PAC	70
PACB_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PAC	71
PACB_3R	Temps consacré - pêche	PAC	72
PACB_3S	Temps consacré - volleyball	PAC	73
PACB_3T	Temps consacré - basketball	PAC	74
PACB_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PAC	75
PACB_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PAC	76
PACB_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PAC	77
PACB_4A	Nbre d'heures de marche - se rendre au travail / à l'école	PAC	78
PACB_4B	Nbre d'heures à bicyclette - se rendre au travail/à l'école	PAC	78
PACB_6	Niveau d'activité physique quotidien	PAC	79
PACBDEE	Dépense d'énergie - (D)	PAC	79
PACBDFM	Fréquence mensuelle - activité phys. durant > 15 min.- (D)	PAC	80
PACBDFR	Fréquence de toutes activités physiques - (D)	PAC	81
PACBDPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PAC	82
PACBFD	Participation à des activités physiques - > 15 minutes	PAC	81
PACBFLEI	Participation à des activités de loisirs	PAC	80
PADB_01A	Symptôme - coeur battait fort / trop vite	PAD	276
PADB_01B	Symptôme - avait le souffle court	PAD	277
PADB_01C	Symptôme - avait des nausées / mal à l'estomac	PAD	277
PADB_01D	Symptôme - avait des vertiges / étourdissements	PAD	278
PADB_01E	Symptôme - avait des sueurs	PAD	278
PADB_01F	Symptôme - avait des frémissements / tremblements	PAD	279
PADB_01G	Symptôme - avait la bouche sèche	PAD	279
PADB_01H	Symptôme - avait l'impression d'étouffer	PAD	280
PADB_01I	Symptôme - avait la douleur / malaise à la poitrine	PAD	280
PADB_01J	Symptôme - avait peur de perdre le contrôle / devenir fou	PAD	281
PADB_01K	Symptôme - avait l'impression de ne pas vraiment être là	PAD	281
PADB_01L	Symptôme - avait impression que choses n'étaient pas réelles	PAD	282
PADB_01M	Symptôme - avait peur de s'évanouir	PAD	282
PADB_01N	Symptôme - avait peur de mourir	PAD	283
PADB_01O	Symptôme - avait des bouffées de chaleur / frissons	PAD	283
PADB_01P	Symptôme - avait été engourdi / a eu des picotements	PAD	284
PADB_03	Problèmes débutés subitement/atteint + fort niveau <= 10 min	PAD	284
PADB_06	Unique attaque de panique au cours des 12 derniers mois	PAD	285
PADB_07	A remémoré l'âge exact de l'unique attaque de panique	PAD	286

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 27

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
PADB_071	Étape de vie quand unique attaque de panique a eu lieu	PAD	289
PADB_08	Type de situations décrivant comment attaque est survenue	PAD	289
PADB_09	A remémoré l'âge exact de la première attaque de panique	PAD	290
PADB_091	Étape de vie quand toute première attaque a eu lieu	PAD	293
PADB_10	A eu attaque de panique - 12 m.	PAD	293
PADB_10A	Période de référence de l'attaque de panique - 12 m.	PAD	294
PADB_10B	Nombre de semaines eu au moins une attaque - 12 m.	PAD	294
PADB_13A	Un mois ou plus - craint d'avoir une autre attaque	PAD	298
PADB_13B	Un mois ou plus - craint que qqc de terrible puisse arriver	PAD	299
PADB_13C	Un mois ou plus - changé activités quotidiennes	PAD	299
PADB_13D	Un mois ou plus - évité situations par peur d'avoir attaque	PAD	300
PADB_16	Eu 1 mois de crainte / changement dans les activités - 12 m.	PAD	302
PADB_16A	Période de référence du mois de perturbation - 12 m.	PAD	302
PADB_16B	Nombre de mois de crainte/changement d'activité - 12 m.	PAD	303
PADB_16C	Fréquence - préoccupation d'avoir une autre attaque - 12 m.	PAD	303
PADB_16D	Sévérité de la crainte d'avoir une autre attaque - 12 m.	PAD	304
PADB_17	Eu attaque inattendue - vie	PAD	306
PADB_21A	Étape de vie quand attaque inattendue est survenue	PAD	310
PADB_22	Attaque inattendue troublé travail/social/relations	PAD	310
PADB_24	Attaque inattendue a eu lieu durant sommeil - vie	PAD	311
PADB_25A	Attaques de panique dues à des causes physiques	PAD	312
PADB_25B	Causes physiques ont toujours induit attaques de panique	PAD	312
PADB_37B	Nombre de semaines eu au moins une attaque - 12 m.	PAD	314
PADB_38	Période de référence de la plus récente attaque - 12 m.	PAD	315
PADB_40	Intensité de détresse émotionnelle durant attaque - 12 m.	PAD	315
PADB_41	Bouleversé par sensation physique rappelant attaque - 12 m.	PAD	316
PADB_41A	Niveau de dérangement dû aux sensations physiques - 12 m.	PAD	316
PADB_42	Fréquence - évité situations causant sensations - 12 m.	PAD	317
PADB_43	Évitement troublé travail/sociale/relations	PAD	317
PADB_441	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.	PAD	319
PADB_442	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.	PAD	320
PADB_44A	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.	PAD	318
PADB_44C	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.	PAD	321
PADB_44D	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.	PAD	322
PADB_46	Nbre de jours/365 incapable totalement dû aux attaques	PAD	323
PADB_50	A consulté médecin/autre prof. pour attaques	PAD	323

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 28

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
PADB_62	A reçu traitement qui a aidé pour attaques	PAD	325
PADB_64	Reçu traitements professionnel pour attaques - 12 m.	PAD	328
PADB_65	Hospitalisé pour une nuit ou plus pour attaques - vie	PAD	329
PADBDA	Attaque de panique - Critère A - (D)	PAD	331
PADBDAIT	Algorithme attaque de panique - vie (D)	PAD	337
PADBDAIT	Algorithme attaque de panique - 12 mois - (D)	PAD	343
PADBDB	Attaque de panique - Critère B - (D)	PAD	336
PADBDB01	Critère B - symptôme 1 - (D)	PAD	332
PADBDB02	Critère B - symptôme 2 - (D)	PAD	332
PADBDB03	Critère B - symptôme 3 - (D)	PAD	332
PADBDB04	Critère B - symptôme 4 - (D)	PAD	333
PADBDB05	Critère B - symptôme 5 - (D)	PAD	333
PADBDB06	Critère B - symptôme 6 - (D)	PAD	333
PADBDB07	Critère B - symptôme 7 - (D)	PAD	334
PADBDB08	Critère B - symptôme 8 - (D)	PAD	334
PADBDB09	Critère B - symptôme 9 - (D)	PAD	334
PADBDB10	Critère B - symptôme 10 - (D)	PAD	335
PADBDB11	Critère B - symptôme 11 - (D)	PAD	335
PADBDB12	Critère B - symptôme 12 - (D)	PAD	335
PADBDB13	Critère B - symptôme 13 - (D)	PAD	336
PADBDB14	Critère B - symptôme 14 - (D)	PAD	336
PADBDC	Attaque de panique - Critère C - (D)	PAD	337
PADBDDA	Trouble panique - Critère A, partie 1 et 2 - (D)	PAD	339
PADBDDA1	Trouble panique - Critère A, partie 1 - (D)	PAD	337
PADBDDA2	Trouble panique - Critère A, partie 2 - (D)	PAD	339
PADBDDAA	Trouble panique - Critère A, partie 2, Symptôme 1 - (D)	PAD	338
PADBDDAB	Trouble panique - Critère A, partie 2, Symptôme 2 - (D)	PAD	338
PADBDDAC	Trouble panique - Critère A, partie 2, Symptôme 3 - (D)	PAD	338
PADBDDY	Algorithme trouble panique - 12 m. - (D)	PAD	345
PADBDDINT	Trouble occasionné par trouble de panique - moyenne - (D)	PAD	345
PADBDDPS	Algorithme trouble panique - vie - (D)	PAD	339
PADBDDYA	Trouble panique - Critère A - 12 m. - (D)	PAD	344
PADBDDYB	Trouble panique - Critère B - 12 m. - (D)	PAD	344
PADBDDYC	Trouble panique - Critère C - 12 m. - (D)	PAD	344
PADBFINI	Indicateur : trouble occasionné par trouble de panique	PAD	346
PADBG04	Nombre d'attaques soudaines - vie - (G)	PAD	285

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 29

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
PADBG07A	Âge - exact quand unique attaque panique est survenue - (G)	PAD	287
PADBG07B	Âge - approx. quand unique attaque panique est survenu - (G)	PAD	288
PADBG09A	Âge - exact toute première attaque panique est survenue -(G)	PAD	291
PADBG09B	Âge - approx. quand toute première attaque est survenue -(G)	PAD	292
PADBG10C	Nombre total d'attaques - 12 m. - (G)	PAD	295
PADBG10D	Âge - dernière fois eu attaque de panique - (G)	PAD	296
PADBG11	Plus grand nbre d'attaques durant une même année - vie - (G)	PAD	297
PADBG12	Nbre d'années distinctes eu au moins une attaque - vie - (G)	PAD	298
PADBG15	Âge - 1ère fois eu 1 mois où avait crainte / a évité - (G)	PAD	301
PADBG16E	Âge - approx. dern. fois 1 m. de crainte avoir attaque - (G)	PAD	305
PADBG17A	Nombre d'attaques inattendues - vie - (G)	PAD	306
PADBG18	Nombre d'attaques « pas réellement en danger » - vie - (G)	PAD	307
PADBG19	Nombre d'attaques « danger réel » - vie - (G)	PAD	308
PADBG21	Âge - 1ère fois eu attaque inattendue - (G)	PAD	309
PADBG24A	Nombre d'attaques inattendues survenus durant sommeil - vie	PAD	311
PADBG36	Nombre d'attaques inattendues - 12 m. - (G)	PAD	313
PADBG37A	Âge - dernière fois eu attaque inattendue - (G)	PAD	314
PADBG50A	Âge - 1ère fois consulté prof. au sujet d'attaques - (G)	PAD	324
PADBG62A	Âge - 1ère fois reçu trait. qui a aidé pour attaques - (G)	PAD	326
PADBG62B	Nbre de prof. consulté avant traitement qui a aidé - (G)	PAD	327
PADBG62C	Nbre total prof consulté au sujet des attaques - vie - (G)	PAD	328
PADBG651	Nombre de proches parents avec attaques - (G)	PAD	331
PADBG65A	Âge - première fois hospitalisé une nuit pour attaques - (G)	PAD	330
PADBGON	Âge à l'apparition du trouble de la panique - (D,G)	PAD	341
PADBGONA	Âge du premier attaque de panique - (D,G)	PAD	340
PADBGPER	Nbre d'années de persévérance du trouble de panique - (D,G)	PAD	343
PADBGREC	Âge à la plus récente attaque de panique - (D,G)	PAD	342
PWBB_01	Fréquence - se sentait en confiance - mois passé	PWB	82
PWBB_02	Fréquence - satisfait de ses réalisations - mois passé	PWB	83
PWBB_03	Fréquence - entrepris plein de choses - mois passé	PWB	83
PWBB_04	Fréquence - se sentait équilibré émotionnellement - mois passé	PWB	84
PWBB_05	Fréquence - se sentait aimé et apprécié - mois passé	PWB	84
PWBB_06	Fréquence - avait des buts et des ambitions - mois passé	PWB	85
PWBB_07	Fréquence - avait le goût de s'amuser - mois passé	PWB	85
PWBB_08	Fréquence - se sentait utile - mois passé	PWB	86
PWBB_09	Fréquence - souriait facilement - mois passé	PWB	86

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 30

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
PWBB_10	Fréquence - était égal à soi-même - mois passé	PWB	87
PWBB_11	Fréquence - avait bonne écoute pour ses amis - mois passé	PWB	87
PWBB_12	Fréquence - était intéressé et curieux - mois passé	PWB	88
PWBB_13	Fréquence - faisait la part des choses - mois passé	PWB	88
PWBB_14	Fréquence - trouvait la vie excitante - mois passé	PWB	89
PWBB_15	Fréquence - vie bien équilibrée - mois passé	PWB	89
PWBB_16	Fréquence - était plutôt calme et posé - mois passé	PWB	90
PWBB_17	Fréquence - trouvait facilement des solutions - mois passé	PWB	90
PWBB_18	Fréquence - était en bon terme avec entourage - mois passé	PWB	91
PWBB_19	Fréquence - vivait avec modération - mois passé	PWB	91
PWBB_20	Fréquence - impression de jouir de la vie - mois passé	PWB	92
PWBB_21	Fréquence - avait beaucoup d'humour - mois passé	PWB	92
PWBB_22	Fréquence - était en paix avec soi-même - mois passé	PWB	93
PWBB_23	Fréquence - se sentait en santé/pleine forme - mois passé	PWB	93
PWBB_24	Fréquence - affronter situations positivement - mois passé	PWB	94
PWBB_25	Fréquence - avait bon moral - mois passé	PWB	94
PWBBDPWB	Échelle de bien-être psychologique - mois passé - (D)	PWB	95
RACB_1	A de la difficulté à faire des activités	RAC	585
RACB_2A	Réduit genre/quantité d'activités - maison	RAC	586
RACB_2B1	Réduit genre/quantité d'activités - à l'école	RAC	586
RACB_2B2	Réduit genre/quantité d'activités - au travail	RAC	587
RACB_2C	Réduit genre/quantité d'activités - autres activités	RAC	587
RACB_5A1	Gêne à cause de l'état ou problème de santé - vie	RAC	588
RACB_5A2	Gêne à cause de l'état ou problème de santé - 12 m.	RAC	589
RACB_5B1	Discrimination à cause de l'état / problème de santé - vie	RAC	589
RACB_5B2	Discrimination à cause de l'état / problème de santé - 12 m.	RAC	590
RACB_6A	A besoin de l'aide - pour préparer les repas	RAC	590
RACB_6B1	A besoin de l'aide - rendre à des rendez-vous/commissions	RAC	591
RACB_6C	A besoin de l'aide - pour accomplir les tâches ménagères	RAC	591
RACB_6D	A besoin de l'aide - pour faire des gros travaux d'entretien	RAC	592
RACB_6E	A besoin de l'aide - pour les soins personnels	RAC	592
RACB_6F	A besoin de l'aide - pour se déplacer dans la maison	RAC	593
RACB_6G	A besoin de l'aide - s'occuper de ses finances personnelles	RAC	593
RACB_7A	Difficulté - à faire des nouveaux amis	RAC	594
RACB_7B	Difficulté - à échanger avec gens inconnus	RAC	594
RACB_7C	Difficulté - à commencer/entretenir une conversation	RAC	595

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 31

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
RACB_8A	Cause des difficultés - santé physique	RAC	595
RACB_8B	Cause des difficultés - santé émotionnelle ou mentale	RAC	596
RACB_8C	Cause des difficultés - consommation d'alcool ou de drogues	RAC	596
RACB_8D	Cause des difficultés - autre raison	RAC	597
RACBDIMP	Répercussion des problèmes de santé - (D)	RAC	597
RACBDPAL	Participation et activité limitée - (D)	RAC	598
RACBF6R	Indicateur : besoin d'aide pour de multiples tâches	RAC	598
RACBF7	Indicateur : difficulté avec les situations sociales	RAC	599
RACBG5	Cause du problème de santé - (G)	RAC	588
SCRB_01	Satisfaction face à la vie en général	SCR	11
SCRB_081	Évaluation personnelle de la santé physique	SCR	11
SCRB_082	Évaluation personnelle de la santé mentale	SCR	12
SCRB_20	Filtre : a eu peur ou eu attaque de panique - vie	SCR	12
SCRB_20A	Filtre : a eu attaque lorsque subitement mal à l'aise - vie	SCR	13
SCRB_21	Filtre : senti triste/vidé/déprimé plusieurs jours - vie	SCR	13
SCRB_22	Filtre : a été très découragé plusieurs jours ou plus - vie	SCR	14
SCRB_23	Filtre : perdu intérêt dans les choses plusieurs jours - vie	SCR	14
SCRB_24	Filtre : a eu période semblable à manie plusieurs jours -vie	SCR	15
SCRB_25	Filtre : très irritable/humeur grincheuse/ plus. jours - vie	SCR	15
SCRB_25A	Filtre : si irritable à l'origine de disputes/crié/... - vie	SCR	16
SCRB_26	Filtre : s'est inquiété plus que les autres personnes - vie	SCR	16
SCRB_26A	Filtre : plus nerveux/anxieux que les autres personnes - vie	SCR	17
SCRB_26B	Filtre : 6 mois anxieux/inquiet presque tous les jours - vie	SCR	17
SCRB_29	Filtre : eu peur intense ou été vraiment gêné avec gens -vie	SCR	18
SCRB_291	Filtre : très bouleversé/nerveux dans situation sociale -vie	SCR	19
SCRB_292	Filtre : tenu loin de situations sociales - vie	SCR	19
SCRB_293	Filtre : peur sociale plus grande qu'aurait dû l'être - vie	SCR	20
SCRB_29A	Filtre : eu peur intense/mal à l'aise devant un groupe - vie	SCR	18
SCRB_30	Filtre : très mal à l'aise/peur d'être dans foule, etc - vie	SCR	20
SCRB_301	Filtre : devenu très bouleversé/nerveux ds foules/etc. - vie	SCR	21
SCRB_302	Filtre : tenu loin des situations quand pouvait faire - vie	SCR	21
SCRB_303	Filtre : peur plus grande qu'elle n'aurait dû l'être - vie	SCR	22
SCRBDMEN	Auto-évaluation la santé mentale - (D)	SCR	23
SCRBDPHY	Auto-évaluation de la santé physique - (D)	SCR	23
SCRBDSAT	Satisfaction face à la vie - (D)	SCR	22
SCRBFAGP	Indicateur : répondant filtré dans module d'agoraphobie	SCR	25

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 32

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SCRBFDEP	Indicateur : répondant filtré dans le module de dépression	SCR	24
SCRBFGAD	Indicateur : répondant filtré dans le module de TAG	SCR	25
SCRBFMIA	Indicateur : répondant filtré dans le module de manie	SCR	24
SCRBFPAD	Indicateur : répondant filtré dans le module trouble panique	SCR	24
SCRBFSOP	Indicateur : répondant filtré dans le module phobie sociale	SCR	25
SDCB_8	Fréquente actuellement une école, collège ou université	SDC	895
SDCB_9	Étudiant à plein temps ou étudiant à temps partiel	SDC	896
SDCBFIMM	Statut d'immigrant	SDC	897
SDCBGCBG	Pays de naissance - (G)	SDC	896
SDCBGLNG	Langues en lesquelles le répondant peut converser - (D,G)	SDC	898
SDCBGRES	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D,G)	SDC	897
SERB_02	Hospitalisé pour santé mentale/alcool/drogues - vie	SER	615
SERB_05A	Période de référence pour l'unique hospitalisation de la vie	SER	616
SERB_08	Hospitalisé pour santé mentale/alcool/drogues - 12 m.	SER	619
SERB_10A	Consulté prof. - psychiatre	SER	621
SERB_10B	Consulté prof. - médecin de famille ou omnipraticien	SER	622
SERB_10C	Consulté prof. - autre médecin	SER	622
SERB_10D	Consulté prof. - psychologue	SER	623
SERB_10E	Consulté prof. - infirmière (infirmier)	SER	623
SERB_10F	Consulté prof. - travailleur social/conseiller/etc	SER	624
SERB_10G	Consulté prof. - conseiller religieux/spirituel	SER	624
SERB_10H	Consulté prof. - autre professionnel	SER	625
SERB_10I	Consulté prof. - aucun	SER	625
SERB_12	A eu session de 15 minutes ou plus de thérapie/counselling	SER	626
SERB_21	Dernière fois consulté psychiatre	SER	629
SERB_24A	Consulté psychiatre - hospitalisé pendant nuit ou plus	SER	631
SERB_24B	Consulté psychiatre - bureau du professionnel de la santé	SER	632
SERB_24C	Consulté psychiatre - salle d'urgence d'un hôpital	SER	632
SERB_24L	Consulté psychiatre - à la maison	SER	634
SERB_24M	Consulté psychiatre - consultation téléphonique uniquement	SER	634
SERB_24N	Consulté psychiatre - église ou autre lieu religieux	SER	635
SERB_25	Psychiatre - satisfaction avec traitements/services	SER	636
SERB_26	Psychiatre - perception du niveau d'aide reçu du prof.	SER	636
SERB_27	Psychiatre - arrêté de consulter ce professionnel	SER	637
SERB_28A	Raison d'arrêt - se sentait mieux	SER	637
SERB_28B	Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé	SER	638

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 33

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SERB_28C	Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas	SER	638
SERB_28D	Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide	SER	639
SERB_28E	Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer	SER	639
SERB_28F	Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.	SER	640
SERB_28G	Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.	SER	640
SERB_28H	Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant	SER	641
SERB_28I	Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible	SER	641
SERB_28J	Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof.	SER	642
SERB_28K	Raison d'arrêt - autre raison	SER	642
SERB_29	Psychiatre - recommandé autre professionnel	SER	643
SERB_31	Dernière fois consulté médecin de famille	SER	645
SERB_34A	Consulté méd. famille - hospitalisé pendant nuit ou plus	SER	647
SERB_34B	Consulté méd. famille - bureau du professionnel de la santé	SER	648
SERB_34C	Consulté méd. famille - salle d'urgence d'un hôpital	SER	648
SERB_34L	Consulté méd. famille - à la maison	SER	650
SERB_34M	Consulté méd. famille - consultation téléphonique uniquement	SER	650
SERB_34N	Consulté méd. famille - église ou autre lieu religieux	SER	651
SERB_35	Méd. de famille - satisfaction avec traitements/services	SER	652
SERB_36	Méd. de famille - perception du niveau d'aide reçu du prof.	SER	652
SERB_37	Médecin de famille - arrêté de consulter ce professionnel	SER	653
SERB_38A	Raison d'arrêt - se sentait mieux	SER	653
SERB_38B	Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé	SER	654
SERB_38C	Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas	SER	654
SERB_38D	Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide	SER	655
SERB_38E	Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer	SER	655
SERB_38F	Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.	SER	656
SERB_38G	Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.	SER	656
SERB_38H	Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant	SER	657
SERB_38I	Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible	SER	657
SERB_38J	Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof.	SER	658
SERB_38K	Raison d'arrêt - autre raison	SER	658
SERB_39	Médecin de famille - recommandé autre professionnel	SER	659
SERB_40A	Autre médecin - cardiologue	SER	659
SERB_40B	Autre médecin - gynécologue	SER	660
SERB_40C	Autre médecin - urologue	SER	660
SERB_40D	Autre médecin - allergologue	SER	661

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 34

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SERB_40E	Autre médecin - autre	SER	661
SERB_41	Autre médecin consulté le plus souvent - 12 m.	SER	662
SERB_44A	Consulté autre médecin - hospitalisé pendant nuit ou plus	SER	664
SERB_44B	Consulté autre médecin - bureau du professionnel de la santé	SER	665
SERB_44C	Consulté autre médecin - salle d'urgence d'un hôpital	SER	665
SERB_44L	Consulté autre médecin - à la maison	SER	667
SERB_44M	Consulté autre méd. - consultation téléphonique uniquement	SER	667
SERB_44N	Consulté autre médecin - église ou autre lieu religieux	SER	668
SERB_45	Autre médecin - satisfaction avec traitements/services	SER	669
SERB_46	Autre médecin - perception du niveau d'aide reçu du prof.	SER	669
SERB_47	Autre médecin - arrêté de consulter ce professionnel	SER	670
SERB_48A	Raison d'arrêt - se sentait mieux	SER	670
SERB_48B	Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé	SER	671
SERB_48C	Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas	SER	671
SERB_48D	Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide	SER	672
SERB_48E	Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer	SER	672
SERB_48F	Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.	SER	673
SERB_48G	Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.	SER	673
SERB_48H	Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant	SER	674
SERB_48I	Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible	SER	674
SERB_48J	Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof.	SER	675
SERB_48K	Raison d'arrêt - autre raison	SER	675
SERB_49	Autre médecin - recommandé autre professionnel	SER	676
SERB_51	Dernière fois consulté psychologue	SER	678
SERB_54A	Consulté psychologue - hospitalisé pendant nuit ou plus	SER	680
SERB_54B	Consulté psychologue - bureau du professionnel de la santé	SER	681
SERB_54C	Consulté psychologue - salle d'urgence d'un hôpital	SER	681
SERB_54L	Consulté psychologue - à la maison	SER	683
SERB_54M	Consulté psychologue - consultation téléphonique uniquement	SER	683
SERB_54N	Consulté psychologue - église ou autre lieu religieux	SER	684
SERB_55	Psychologue - satisfaction avec traitements/services - 12 m.	SER	685
SERB_56	Psychologue - perception du niveau d'aide reçu du prof.	SER	685
SERB_57	Psychologue - arrêté de consulter ce professionnel	SER	686
SERB_58A	Raison d'arrêt - se sentait mieux	SER	686
SERB_58B	Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé	SER	687
SERB_58C	Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas	SER	687

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 35

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SERB_58D	Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide	SER	688
SERB_58E	Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer	SER	688
SERB_58F	Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.	SER	689
SERB_58G	Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.	SER	689
SERB_58H	Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant	SER	690
SERB_58I	Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible	SER	690
SERB_58J	Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof.	SER	691
SERB_58K	Raison d'arrêt - autre raison	SER	691
SERB_59	Assurance couvre tout/partiellement les coûts du psychologue	SER	692
SERB_59A	Psychologue - recommandé autre professionnel	SER	692
SERB_61	Dernière fois consulté infirmière	SER	694
SERB_64A	Consulté infirmière - hospitalisé pendant nuit ou plus	SER	696
SERB_64B	Consulté infirmière - bureau du professionnel de la santé	SER	697
SERB_64C	Consulté infirmière - salle d'urgence d'un hôpital	SER	697
SERB_64L	Consulté infirmière - à la maison	SER	699
SERB_64M	Consulté infirmière - consultation téléphonique uniquement	SER	699
SERB_64N	Consulté infirmière - église ou autre lieu religieux	SER	700
SERB_65	Infirmière - satisfaction avec traitements/services - 12 m.	SER	701
SERB_66	Infirmière - perception du niveau d'aide reçu du prof.	SER	701
SERB_67	Infirmière - arrêté de consulter ce professionnel	SER	702
SERB_68A	Raison d'arrêt - se sentait mieux	SER	702
SERB_68B	Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé	SER	703
SERB_68C	Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas	SER	703
SERB_68D	Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide	SER	704
SERB_68E	Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer	SER	704
SERB_68F	Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.	SER	705
SERB_68G	Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.	SER	705
SERB_68H	Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant	SER	706
SERB_68I	Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible	SER	706
SERB_68J	Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof.	SER	707
SERB_68K	Raison d'arrêt - autre raison	SER	707
SERB_69	Assurance couvre tout/partiellement les coûts infirmière	SER	708
SERB_69A	Infirmière - recommandé autre professionnel	SER	708
SERB_71	Dernière fois consulté travailleur social	SER	710
SERB_74A	Consulté trav. social - hospitalisé pendant nuit ou plus	SER	712
SERB_74B	Consulté trav. social - bureau du professionnel de la santé	SER	713

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 36

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SERB_74C	Consulté trav. social - salle d'urgence d'un hôpital	SER	713
SERB_74L	Consulté trav. social - à la maison	SER	715
SERB_74M	Consulté trav. social - consultation téléphonique uniquement	SER	715
SERB_74N	Consulté trav. social - église ou autre lieu religieux	SER	716
SERB_75	Travailleur social - satisfaction avec traitements/services	SER	717
SERB_76	Trav. social - perception du niveau d'aide reçu du prof.	SER	717
SERB_77	Travailleur social - arrêté de consulter ce professionnel	SER	718
SERB_78A	Raison d'arrêt - se sentait mieux	SER	718
SERB_78B	Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé	SER	719
SERB_78C	Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas	SER	719
SERB_78D	Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide	SER	720
SERB_78E	Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer	SER	720
SERB_78F	Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.	SER	721
SERB_78G	Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.	SER	721
SERB_78H	Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant	SER	722
SERB_78I	Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible	SER	722
SERB_78J	Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof.	SER	723
SERB_78K	Raison d'arrêt - autre raison	SER	723
SERB_79	Assurance couvre tout/partiellement les coûts trav. social	SER	724
SERB_79A	Travailleur social - recommandé autre professionnel	SER	724
SERB_81	Dernière fois consulté conseiller religieux	SER	726
SERB_84A	Consulté conseiller relig - hospitalisé pendant nuit ou plus	SER	728
SERB_84B	Consulté conseiller religieux - bureau du prof. de la santé	SER	729
SERB_84C	Consulté conseiller religieux - salle d'urgence d'un hôpital	SER	729
SERB_84L	Consulté conseiller religieux - à la maison	SER	731
SERB_84M	Consulté cons relig - consultation téléphonique uniquement	SER	731
SERB_84N	Consulté cons relig - église ou autre lieu religieux	SER	732
SERB_85	Conseiller relig - satisfaction avec traitements/services	SER	733
SERB_86	Cons religieux - perception du niveau d'aide reçu du prof.	SER	733
SERB_87	Conseiller religieux - arrêté de consulter ce professionnel	SER	734
SERB_88A	Raison d'arrêt - se sentait mieux	SER	734
SERB_88B	Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé	SER	735
SERB_88C	Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas	SER	735
SERB_88D	Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide	SER	736
SERB_88E	Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer	SER	736
SERB_88F	Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.	SER	737

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 37

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SERB_88G	Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.	SER	737
SERB_88H	Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant	SER	738
SERB_88I	Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible	SER	738
SERB_88J	Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof.	SER	739
SERB_88K	Raison d'arrêt - autre raison	SER	739
SERB_89	Conseiller religieux - recommandé autre professionnel	SER	740
SERB_90A	Autre professionnel - acuponcteur	SER	740
SERB_90B	Autre professionnel - instructeur de biofeedback	SER	741
SERB_90C	Autre professionnel - chiropraticien	SER	741
SERB_90D	Autre professionnel - spécialiste de l'équilibre énergétique	SER	742
SERB_90E	Autre professionnel - thérapeute du mouvement/l'exercice	SER	742
SERB_90F	Autre professionnel - herboriste	SER	743
SERB_90G	Autre professionnel - homéopathe ou naturopathe	SER	743
SERB_90H	Autre professionnel - hypnotiseur	SER	744
SERB_90I	Autre professionnel - spécialiste en imagerie	SER	744
SERB_90J	Autre professionnel - masso-thérapeute	SER	745
SERB_90K	Autre professionnel - relaxation, yoga ou méditation	SER	745
SERB_90L	Autre professionnel - diététicien	SER	746
SERB_90M	Autre professionnel - autre	SER	746
SERB_91	Autre professionnel consulté le plus souvent - 12 m.	SER	747
SERB_94A	Consulté autre prof. - hospitalisé pendant nuit ou plus	SER	749
SERB_94B	Consulté autre prof. - bureau du professionnel de la santé	SER	750
SERB_94C	Consulté autre prof. - salle d'urgence d'un hôpital	SER	750
SERB_94L	Consulté autre prof. - à la maison	SER	752
SERB_94M	Consulté autre prof. - consultation téléphonique uniquement	SER	752
SERB_94N	Consulté autre prof. - église ou autre lieu religieux	SER	753
SERB_95	Autre prof. - satisfaction avec traitements/services - 12 m.	SER	754
SERB_96	Autre prof. - perception du niveau d'aide reçu du prof.	SER	754
SERB_97	Autre prof. - arrêté de consulter ce professionnel	SER	755
SERB_98A	Raison d'arrêt - se sentait mieux	SER	755
SERB_98B	Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé	SER	756
SERB_98C	Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas	SER	756
SERB_98D	Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide	SER	757
SERB_98E	Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer	SER	757
SERB_98F	Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.	SER	758
SERB_98G	Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.	SER	758

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 38

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SERB_98H	Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant	SER	759
SERB_98I	Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible	SER	759
SERB_98J	Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof.	SER	760
SERB_98K	Raison d'arrêt - autre raison	SER	760
SERB_98L	Raison d'arrêt - aucune	SER	761
SERB_99	Assurance couvre tout/partiellement les coûts de autre prof.	SER	761
SERB_99A	Autre professionnel - recommandé autre professionnel	SER	762
SERB_A0A	Utilisé groupe de soutien/discussion sur internet - vie	SER	762
SERB_A0B	Dernière fois utilisé groupe de soutien/discussion internet	SER	763
SERB_A1A	Groupe d'entraide pour recevoir aide pour émotions - vie	SER	764
SERB_A1C	Dernière fois allé à groupe d'entraide	SER	766
SERB_A2A	Utilisé ligne d'aide téléphonique pour santé mentale - vie	SER	767
SERB_A2C	Dernière fois utilisé ligne d'aide téléphonique	SER	768
SERB_A3	Eu besoin d'aide pour émotions mais ne l'a pas obtenue	SER	769
SERB_A4A	Aide requise - info sur troubles émotionnels/traitements	SER	769
SERB_A4B	Aide requise - info sur les services disponibles	SER	770
SERB_A4C	Aide requise - médicaments	SER	770
SERB_A4D	Aide requise - thérapie ou counselling	SER	771
SERB_A4E	Aide requise - pour des problèmes financiers	SER	771
SERB_A4F	Aide requise - pour problèmes relatifs aux logements	SER	772
SERB_A4G	Aide requise - au niveau des relations interpersonnelles	SER	772
SERB_A4H	Aide requise - pour statut d'emploi / situation au travail	SER	773
SERB_A4I	Aide requise - autre	SER	773
SERB_A5A	Raison sans aide - préférerait s'en occuper soi-même	SER	774
SERB_A5B	Raison sans aide - pensait que rien ne pouvait aider	SER	774
SERB_A5C	Raison sans aide - ne savait pas où aller chercher de l'aide	SER	775
SERB_A5D	Raison sans aide - peur demander aide/ce que autres pensent	SER	775
SERB_A5E	Raison sans aide - ne pouvait pas payer	SER	776
SERB_A5F	Raison sans aide - prob comme transport/garde enfant/horaire	SER	776
SERB_A5G	Raison sans aide - aide prof. non disponible dans la région	SER	777
SERB_A5H	Raison sans aide - aide prof. non disponible à ce moment-là	SER	777
SERB_A5I	Raison sans aide - temps d'attente trop long	SER	778
SERB_A5J	Raison sans aide - ne s'en est pas occupé / indifférent	SER	778
SERB_A5K	Raison sans aide - problème de langue	SER	779
SERB_A5L	Raison sans aide - responsabilités personnelles/familiales	SER	779
SERB_A5M	Raison sans aide - autre	SER	780

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 39

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SERBDRCT	Nombre de ressources utilisées pour santé mentale -vie - (D)	SER	783
SERBDYCT	Nombre de ressources utilisées pour santé mentale - 12 mo	SER	783
SERBFACP	Indicateur : barrières d'acceptation - santé mentale	SER	784
SERBFACS	Indicateur : barrières d'accessibilité - santé mentale	SER	784
SERBFAVA	Indicateur : barrières de disponibilité - santé mentale	SER	785
SERBFHYR	Indicateur : hospitalisation pour santé mentale - 12 m.	SER	782
SERBFLAP	Indicateur : consultations prof. pour santé mentale - vie	SER	782
SERBFLHO	Indicateur : hospitalisation pour santé mentale - vie	SER	781
SERBFLRU	Indicateur : Ressources utilisées pour santé mentale - vie	SER	782
SERBFYRU	Nombre de ressources utilisées pour santé mentale - 12 mo	SER	783
SERBG03	Nbre de fois hosp. pour santé mentale/alcool/drogues - vie	SER	615
SERBG05B	Âge - de l'unique hospitalisation datant plus d'un an - (G)	SER	617
SERBG06	Âge - lors de première admission pour santé mentale - (G)	SER	618
SERBG08A	Âge - dernière fois hospitalisé - (G)	SER	620
SERBG09	Durée totale hôpital à cause de la santé ment. - 12 m.- (G)	SER	621
SERBG13	Âge - 1ère fois eu session de thérapie/counselling - (G)	SER	627
SERBG20	Âge - première fois consulté psychiatre - (G)	SER	628
SERBG22	Âge - dernière fois consulté psychiatre - (G)	SER	630
SERBG23	Nombre de fois consulté psychiatre - 12 m. - (G)	SER	631
SERBG24F	Consulté psychiatre - clinique externe - (G)	SER	633
SERBG24I	Consulté psychiatre - autre clinique - (G)	SER	633
SERBG24O	Consulté psychiatre - travail, école, autre - (G)	SER	635
SERBG30	Âge - première fois consulté médecin de famille - (G)	SER	644
SERBG32	Âge - dernière fois consulté médecin de famille - (G)	SER	646
SERBG33	Nbre de fois consulté méd. de famille - 12 m. - (G)	SER	647
SERBG34F	Consulté médecin de famille - clinique externe - (G)	SER	649
SERBG34I	Consulté médecin de famille - autre clinique - (G)	SER	649
SERBG34O	Consulté méd. famille - travail, école, autre - (G)	SER	651
SERBG42	Âge - dernière fois consulté autre médecin - (G)	SER	663
SERBG43	Nombre de fois consulté autre médecin - 12 m. - (G)	SER	664
SERBG44F	Consulté autre médecin - clinique externe - (G)	SER	666
SERBG44I	Consulté autre médecin - autre clinique - (G)	SER	666
SERBG44O	Consulté autre médecin - travail, école, autre - (G)	SER	668
SERBG50	Âge - première fois consulté psychologue - (G)	SER	677
SERBG52	Âge - dernière fois consulté psychologue - (G)	SER	679
SERBG53	Nombre de fois consulté psychologue - 12 m. - (G)	SER	680

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 40

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SERBG54F	Consulté psychologue - clinique externe - (G)	SER	682
SERBG54I	Consulté psychologue - autre clinique - (G)	SER	682
SERBG54O	Consulté psychologue - travail, école, autre - (G)	SER	684
SERBG60	Âge - première fois consulté infirmière - (G)	SER	693
SERBG62	Âge - dernière fois consulté infirmière - (G)	SER	695
SERBG63	Nombre de fois consulté cette infirmière - 12 m. - (G)	SER	696
SERBG64F	Consulté infirmière - clinique externe - (G)	SER	698
SERBG64I	Consulté infirmière - autre clinique - (G)	SER	698
SERBG64O	Consulté infirmière - travail, école, autre - (G)	SER	700
SERBG70	Âge - première fois consulté travailleur social - (G)	SER	709
SERBG72	Âge - dernière fois consulté travailleur social - (G)	SER	711
SERBG73	Nombre de fois consulté travailleur social - 12 m. - (G)	SER	712
SERBG74F	Consulté trav. social - clinique externe - (G)	SER	714
SERBG74I	Consulté trav. social - autre clinique - (G)	SER	714
SERBG74O	Consulté trav. social - travail, école, autre - (G)	SER	716
SERBG80	Âge - première fois consulté conseiller religieux - (G)	SER	725
SERBG82	Âge - dernière fois consulté conseiller religieux - (G)	SER	727
SERBG83	Nombre de fois consulté conseiller religieux - 12 m. - (G)	SER	728
SERBG84F	Consulté conseiller relig - clinique externe - (G)	SER	730
SERBG84I	Consulté conseiller religieux - autre clinique - (G)	SER	730
SERBG84O	Consulté conseiller religieux - travail, école, autre - (G)	SER	732
SERBG92	Âge - dernière fois consulté autre professionnel - (G)	SER	748
SERBG93	Nombre de fois consulté autre professionnel - 12 m. - (G)	SER	749
SERBG94F	Consulté autre prof. - clinique externe - (G)	SER	751
SERBG94I	Consulté autre prof. - autre clinique - (G)	SER	751
SERBG94O	Consulté autre prof. - travail, école, autre - (G)	SER	753
SERBGA0C	Nbre fois groupe soutien/discussion internet - 12 m. - (G)	SER	763
SERBGA1B	Âge - première fois allé à groupe d'entraide - (G)	SER	765
SERBGA1D	Nbre fois allé à réunion groupe d'entraide - 12 m. - (G)	SER	766
SERBGA2B	Âge - première fois utilisé ligne d'aide téléphonique - (G)	SER	767
SERBGA2D	Nbre de fois utilisé ligne d'aide téléphonique - 12 m. - (G)	SER	768
SERBGA7	Montant dépensé services/produits santé ment. - 12 m. - (G)	SER	780
SERBGHDY	Durée de temps hospitalisé pour santé ment. - vie - (D,G)	SER	781
SOPB_01A	Troublé - rencontrer nouvelles personnes	SOP	346
SOPB_01B	Troublé - parler à des personnes qui détiennent autorité	SOP	347
SOPB_01C	Troublé - prendre la parole à une réunion / en classe	SOP	347

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 41

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SOPB_01D	Troublé - se rendre à des fêtes / rencontres sociales	SOP	348
SOPB_01E	Troublé - faire présentation / exposé	SOP	348
SOPB_01F	Troublé - passer un examen / entrevue pour un emploi	SOP	349
SOPB_01G	Troublé - travailler lorsque quelqu'un regarde	SOP	349
SOPB_01H	Troublé - entrer dans une pièce quand autres déjà présents	SOP	350
SOPB_01I	Troublé - parler à des personnes moins bien connues	SOP	350
SOPB_01J	Troublé - exprimer désaccord à personnes moins bien connues	SOP	351
SOPB_01K	Troublé - écrire, manger, boire lorsque quelqu'un regarde	SOP	351
SOPB_01L	Troublé - utiliser toilette publique	SOP	352
SOPB_01M	Troublé - sorties amoureuses	SOP	352
SOPB_01N	Troublé - autre situation sociale où objet de l'attention	SOP	353
SOPB_031	A remémoré l'âge exact de la toute première peur sociale	SOP	353
SOPB_032	A remémoré l'âge exact de la toute première peur sociale	SOP	354
SOPB_08A	Symptôme - a rougi ou tremblé	SOP	359
SOPB_08B	Symptôme - eu peur de perdre contrôle des intestins/vessie	SOP	360
SOPB_08C	Symptôme - eu peur de vomir	SOP	360
SOPB_09A	Symptôme - coeur battait fort / trop vite	SOP	361
SOPB_09B	Symptôme - eu des sueurs	SOP	361
SOPB_09C	Symptôme - eu des tremblements	SOP	362
SOPB_09D	Symptôme - eu mal à l'estomac	SOP	362
SOPB_09E	Symptôme - eu une bouche sèche	SOP	363
SOPB_09F	Symptôme - eu des bouffées de chaleur / frissons	SOP	363
SOPB_09G	Symptôme - se senti engourdi / eu des picotements	SOP	364
SOPB_09H	Symptôme - eu du mal à respirer normalement	SOP	364
SOPB_09I	Symptôme - eu l'impression d'étouffer	SOP	365
SOPB_09J	Symptôme - eu de la douleur / malaise à la poitrine	SOP	365
SOPB_09K	Symptôme - eu des vertiges / étourdissements	SOP	366
SOPB_09L	Symptôme - eu peur de mourir	SOP	366
SOPB_09M	Symptôme - eu peur de perdre contrôle/devenir fou/s'évanouir	SOP	367
SOPB_09N	Symptôme - eu impression ne pas « vraiment être là »	SOP	367
SOPB_09O	Symptôme - eu impression que choses n'étaient pas réelles	SOP	368
SOPB_10	Symptôme - eu peur d'avoir attaque de panique	SOP	368
SOPB_10A	Symptôme - eu attaque de panique durant cette situation	SOP	369
SOPB_11	Symptôme - eu peur d'être piégé / incapable d'échapper	SOP	369
SOPB_12	Symptôme - eu peur de faire quelque chose d'embarrassant	SOP	370
SOPB_12A	Symptôme - eu peur d'embarrasser d'autres personnes	SOP	370

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 42

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SOPB_13	Symptôme - eu peur que gens pensent choses négatives	SOP	371
SOPB_14	Symptôme - eu peur d'être centre d'attention	SOP	371
SOPB_14A	Type de raison associée à la peur sociale	SOP	372
SOPB_15	Peur liée à la gêne à propos d'un problème physique/mental	SOP	372
SOPB_16	Peur sociale troublé travail/social/relations	SOP	373
SOPB_17	Senti bouleversé / inquiet / déçu à cause de peur sociale	SOP	373
SOPB_18	Dernière fois eu peur / évité situation sociale	SOP	374
SOPB_19	Intensité de peur si devait faire face situation aujourd'hui	SOP	376
SOPB_211	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.	SOP	378
SOPB_212	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.	SOP	379
SOPB_21A	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.	SOP	377
SOPB_21C	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.	SOP	380
SOPB_21D	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.	SOP	381
SOPB_23	Nbre de jours/365 incapable totalement dû à la peur - 12 m.	SOP	382
SOPB_25	Consulté médecin/autre prof. pour peur sociale	SOP	382
SOPB_36	A reçu traitement qui a aidé pour peur sociale	SOP	384
SOPB_38	Reçu traitement professionnel pour peur sociale - 12 m.	SOP	387
SOPB_39	Hospitalisé pour nuit ou plus pour peur sociale - vie	SOP	388
SOPB_3B1	Étape de vie quand toute première peur sociale	SOP	357
SOPB_6A1	Étape de vie quand commencé à éviter situation sociale	SOP	359
SOPBD09	Critère D, partie 2B - (D)	SOP	391
SOPBD215	Critère E, partie 1A - (D)	SOP	392
SOPBDA	Critère A, partie 1 et 2 - (D)	SOP	390
SOPBDA1	Critère A, partie 1 - (D)	SOP	389
SOPBDA2	Critère A, partie 2 - (D)	SOP	390
SOPBDB	Critère B - (D)	SOP	390
SOPBDC	Critère C - (D)	SOP	391
SOPBDD	Critère D, partie 1 et 2 - (D)	SOP	392
SOPBDD1	Critère D, partie 1 - (D)	SOP	391
SOPBDD2	Critère D, partie 2 - (D)	SOP	392
SOPBDE	Critère E, partie 1 et 2 - (D)	SOP	393
SOPBDF	Critère F, partie 1 et 2 - (D)	SOP	394
SOPBDF1	Critère F, partie 1 - (D)	SOP	393
SOPBDF2	Critère F, partie 2 - (D)	SOP	393
SOPBDINT	Trouble occasionné par phobie sociale - moyenne - (D)	SOP	398
SOPBDPY	Algorithme phobie sociale - 12 mois - (D)	SOP	398

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 43

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SOPBDSP	Algorithme phobie sociale - vie (D)	SOP	394
SOPBDYA	Critère A - 12 mois - (D)	SOP	397
SOPBDYB	Critère B - 12 mois - (D)	SOP	397
SOPBDYC	Critère C - trouble - (D)	SOP	397
SOPBFINT	Indicateur : Trouble occasionné par phobie sociale	SOP	399
SOPBG03A	Âge - exactement première fois avait peur sociale - (G)	SOP	355
SOPBG03B	Âge - approximatif première fois avait peur sociale - (G)	SOP	356
SOPBG06A	Âge - première fois commencé à éviter situation soc - (G)	SOP	358
SOPBG18A	Âge - dernière fois eu peur / évité situation sociale - (G)	SOP	375
SOPBG25A	Âge - première fois consulté prof au sujet de peur soc - (G)	SOP	383
SOPBG36A	Âge - 1ère fois reçu traitem. qui a aidé pour peur soc - (G)	SOP	385
SOPBG36B	Nbre prof.consulté avant traitement qui a aidé pr peur - (G)	SOP	386
SOPBG36C	Nbre total de prof consulté au sujet de peur soc - vie - (G)	SOP	387
SOPBG391	Nombre de proches parents avec peurs sociales intenses - (G)	SOP	389
SOPBG39A	Âge - 1ère fois hospitalisé nuit pour peur sociale - (G)	SOP	388
SOPBGON	Âge à l'apparation de la phobie sociale - (D,G)	SOP	395
SOPBGREC	Âge au plus récent épisode de phobie sociale - (D,G)	SOP	396
SPVB_1	Valeurs spirituelles - jouent rôle important dans la vie	SPV	904
SPVB_2	Valeurs spirituelles - aident à trouver un sens à la vie	SPV	904
SPVB_3	Valeurs spirituelles - force pour difficultés quotidiennes	SPV	905
SPVB_4	Valeurs spirituelles - aident comprendre difficultés de vie	SPV	905
SPVB_6	Fréquence - Assiste services religieux ou rencontres	SPV	906
SSMB_01	Nombre de parents et d'amis proches	SSM	880
SSMB_02	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	SSM	880
SSMB_03	A quelqu'un pour l'écouter	SSM	881
SSMB_04	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	SSM	881
SSMB_05	A quelqu'un pour aller chez le médecin	SSM	882
SSMB_06	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	SSM	882
SSMB_07	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	SSM	883
SSMB_08	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	SSM	883
SSMB_09	A un confident	SSM	884
SSMB_10	A quelqu'un pour serrer dans ses bras	SSM	884
SSMB_11	A quelqu'un avec qui se détendre	SSM	885
SSMB_12	A quelqu'un pour préparer les repas	SSM	885
SSMB_13	A quelqu'un qui donne des conseils	SSM	886
SSMB_14	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	SSM	886

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 44

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
SSMB_15	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	SSM	887
SSMB_16	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	SSM	887
SSMB_17	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	SSM	888
SSMB_18	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	SSM	888
SSMB_19	A quelqu'un qui comprend les problèmes	SSM	889
SSMB_20	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	SSM	889
SSMB_21A	A reçu soutien social tangible - 12 m.	SSM	890
SSMB_21B	Fréquence du soutien social tangible - 12 m.	SSM	890
SSMB_22A	A reçu soutien affectif - 12 m.	SSM	891
SSMB_22B	Fréquence du soutien affectif - 12 m.	SSM	891
SSMB_23A	A reçu soutien interactif social positif - 12 m.	SSM	892
SSMB_23B	Fréquence du soutien interactif social positif - 12 m.	SSM	892
SSMB_24A	A reçu soutien émotionnel ou d'information - 12 m.	SSM	893
SSMB_24B	Fréquence du soutien émotionnel ou d'information - 12 m.	SSM	893
SSMBDAFF	Affection - sous-échelle EIM - (D)	SSM	894
SSMBDEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)	SSM	895
SSMBDSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)	SSM	894
SSMBDTNG	Support social tangible - sous-échelle EIM - (D)	SSM	894
STRB_1	Auto-évaluation capacité faire face à situation imprévue	STR	104
STRB_2	Auto-évaluation capacité faire face demandes quotidiennes	STR	104
STRB_3	Plus importante source des sentiments de stress	STR	105
STRB_61	Fréquence - coping - résolution de problème	STR	106
STRB_610	Fréquence - coping - se blâmer	STR	112
STRB_611	Fréquence - coping - espérer que la situation disparaisse	STR	112
STRB_62	Fréquence - coping - parler aux autres	STR	106
STRB_63	Fréquence - coping - éviter d'être avec des gens	STR	107
STRB_64	Fréquence - coping - dormir plus qu'à l'habitude	STR	107
STRB_65A	Fréquence - coping - manger plus ou moins qu'à l'habitude	STR	108
STRB_65B	Fréquence - coping - fumer plus cigarettes qu'à l'habitude	STR	108
STRB_65C	Fréquence - coping - consommer de l'alcool	STR	109
STRB_65D	Fréquence - coping - consommer des drogues ou médicaments	STR	109
STRB_66	Fréquence - coping - jogging ou autres exercices	STR	110
STRB_67	Fréquence - coping - prier ou chercher de l'aide spirituelle	STR	110
STRB_68	Fréquence - coping - faire quelque chose d'agréable	STR	111
STRB_69	Fréquence - coping - regarder le bon côté des choses	STR	111
TWDB_1	Gardé le lit - à cause de maladie ou de blessure	TWD	599

Cycle 1.2 ESCC : Table alphabétique

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 45

SEPTEMBRE 2004

Nom de la variable	Description	Section	Page
TWDB_2	Gardé le lit - nombre de jours	TWD	600
TWDB_2A	Journée unique au lit à cause de la santé mentale	TWD	601
TWDB_2B	Nombre de jours au lit à cause de la santé mentale	TWD	601
TWDB_3	Activités limitées - à cause de maladie ou de blessure	TWD	602
TWDB_4	Activités limitées - nombre de jours	TWD	603
TWDB_4A	Journée unique où activité limitée est due à santé mentale	TWD	604
TWDB_4B	Nombre de jours où activité limitée est due à santé mentale	TWD	605
TWDB_5A	Fait plus d'effort - à cause de maladie ou de blessure	TWD	606
TWDB_6	Nombre de jours où il a fallu plus d'effort	TWD	607
TWDB_6A	Journée unique où extra effort est dû à santé mentale	TWD	608
TWDB_6B	Nombre de jours où extra effort est dû à santé mentale	TWD	609
TWDBDDDY	Nbre de jours d'incapacité au cours de 14 dern. jours - (D)	TWD	610
TWDBDMH	Nbre de jours d'incapacité à cause de la santé mentale - (D)	TWD	614
TWDBDMQ2	Nombre de jours resté au lit dû à la santé mentale - (D)	TWD	611
TWDBDMQ4	Nbre de jours d'activité limitée due à la santé mentale -(D)	TWD	612
TWDBDMQ6	Nbre de jours d'extra effort dû à la santé mentale - (D)	TWD	613
WSTB_401	Stress au trav. - devait acquérir de nouvelles connaissances	WST	911
WSTB_402	Stress au travail - niveau élevé de compétences	WST	911
WSTB_403	Stress au travail - liberté de décider	WST	912
WSTB_404	Stress au travail - tâches répétitives	WST	912
WSTB_405	Stress au travail - travail frénétique	WST	913
WSTB_406	Stress au travail - exempt des demandes conflictuelles.	WST	913
WSTB_407	Stress au travail - bonne sécurité d'emploi	WST	914
WSTB_408	Stress au travail - exigeait beaucoup d'efforts physiques	WST	914
WSTB_409	Stress au travail - avait mot à dire concernant son travail	WST	915
WSTB_410	Stress au travail - hostilité ou conflits avec les collègues	WST	915
WSTB_411	Stress au travail - surveillant facilitait le travail	WST	916
WSTB_412	Stress au travail - collègues facilitaient le travail	WST	916
WSTB_413	Stress au travail - satisfait de son travail	WST	917
WSTBDAUT	Stress au travail - latitude de décision - autorité - (D)	WST	919
WSTBDJIN	Stress au travail - insécurité d'emploi - (D)	WST	920
WSTBDPHY	Stress au travail - effort physique - (D)	WST	921
WSTBDPSY	Stress au travail - demandes psychologiques - (D)	WST	920
WSTBDSKI	Stress au travail - latitude de décision - compétence - (D)	WST	918
WSTBDSOC	Stress au travail - soutien social - (D)	WST	922
WTSB_M	Poids échan. - poids maître	WTS	926