

Enquête nationale sur la santé de la population

Volet ménages

Cycle 5 (2002-2003)

**Documentation des variables dérivées
(Spécifications)**

(Incluant la description des variables longitudinales)

Cycles 1 à 5

Statistique Canada

Novembre 2004

TABLE DES MATIÈRES

	Page
1. VARIABLES LONGITUDINALES CONSTANTES	1
2. DÉPENDANCE À L'ÉGARD DE L'ALCOOL (AD)	5
3. CONSOMMATION D'ALCOOL (AL)	7
4. ADMINISTRATION (AM).....	9
5. PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES (CC).....	11
6. CONSOMMATION DE MÉDICAMENTS (DG).....	13
7. VARIABLES CONCERNANT LE MÉNAGE (DH)	17
8. NIVEAU DE SCOLARITÉ (ED).....	23
9. VARIABLES GÉOGRAPHIQUES (GE).....	27
10. ÉTAT DE SANTÉ GÉNÉRAL (GH).....	35
11. UTILISATION DES SOINS DE SANTÉ (HC).....	36
12. ÉTAT DE SANTÉ (HS).....	40
13. TAILLE ET POIDS (HW)	47
14. BLESSURES (IJ)	50
15. REVENU (IN)	58
16. ASSURANCE (IS).....	63
17. POPULATION ACTIVE (LF)	64
18. PARTICIPATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL (LS).....	78
19. SANTÉ MENTALE (MH)	84
20. NUTRITION (NU)	88
21. ACTIVITÉS PHYSIQUES (PA)	93
22. LIMITATION DES ACTIVITÉS (RA).....	98
23. SOINS PERSONNELS (SC).....	102
24. RENSEIGNEMENTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES (SD).....	103
25. SANTÉ SEXUELLE (SH)	106
26. USAGE DU TABAC (SM).....	107
27. SOUTIEN SOCIAL (SS).....	111
28. STRESS (ST).....	116
29. INCAPACITÉ AU COURS DES DEUX DERNIÈRES SEMAINES (TW)	135
30. SANTÉ PRÉVENTIVE (WH).....	136
ANNEXE A : CODES DE LIMITATION DES ACTIVITÉS	137
ANNEXE B : CODAGE DES MÉDICAMENTS	143
ANNEXE C : CODAGE DES PAYS DE NAISSANCE	148

SPÉCIFICATIONS DES VARIABLES DÉRIVÉES

Les présentes spécifications décrivent les variables dérivées telles qu'elles figurent dans tous les fichiers maîtres de l'enquête nationale sur la santé de la population. Les variables dérivées ne s'appliquent pas à tous les fichiers. Les enfants de moins de 12 ans de même que les personnes qui ont quitté leur domicile pour être en établissement n'ont pas répondu à plusieurs sections de la composante santé. Par conséquent, plusieurs variables dérivées sont codées « Sans objet ». Toutes les variables dérivées du cycle 5 sont codées « Non déclaré » (codé 9) pour les répondants des premier, deuxième, troisième et quatrième cycles qui sont décédés avant l'entrevue du cinquième cycle. Ces différences signifient qu'il faut comparer avec prudence les variables des premier, deuxième, troisième quatrième et cinquième cycles.

1. VARIABLES LONGITUDINALES CONSTANTES

Certaines variables sont considérées comme étant « constantes ». Dans le tableau qui suit figurent les variables qui n'apparaissent qu'une seule fois dans le fichier de données. Ces noms ne sont pas soumis aux normes de la convention habituellement utilisée pour nommer les variables.

Nom longitudinal	Concept
DESIGPRV	Province de l'échantillon
DOB	Jour de naissance
MOB	Mois de naissance
YOB	Année de naissance
SEX	Sexe
HWB	Poids à la naissance
HWBG1	Poids à la naissance - groupé
COB	Pays de naissance
COBC	Code pour le pays de naissance
COBGC	Code pour le pays de naissance - groupé
IMM	Statut d'immigrant
YOI	Année de l'immigration au Canada
AOI	Âge au moment de l'immigration
DOD	Jour de décès
MOD	Mois de décès
YOD	Année de décès
COD	Code pour la cause de décès

1.1 **Poids à la naissance - Groupé**

Nom longitudinal : HWBG1

Basé sur HWB (Source : GHKn_6).

Code	Description	Condition
1	Poids normal à la naissance	HWB =5 à 14
2	Poids plutôt bas à la naissance	HWB =2, 3, 4
3	Poids très bas à la naissance	HWB =1
6	Sans objet	HWB =96
9	Non déclaré	Autrement

1.2 **Code pour le pays de naissance**

Nom longitudinal : COBC

Basé sur COB (Source : SDCn_1). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que SDCnCB au cycle 2 (1996), et cycle 3 (1998).

Cette variable dérivée est codée automatiquement d'après COB et les réponses en toutes lettres provenant de la catégorie « Autre, précisez ». Ces dernières sont inscrites au moyen du fichier de référence de 1996 (provenant du Recensement) pour le lieu de naissance par ordre alphabétique et numérique. Dans le fichier longitudinal, le code pour le pays de naissance ne figure qu'une seule fois sous le nom de variable COBC, plutôt que de figurer une fois dans chaque cycle. Voir Annexe C pour la liste des codes.

1.3 **Code pour le pays de naissance - Groupé**

Nom longitudinal : COBGC

Basé sur COBC (Source : SDCn_1). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que SDCnGCB au cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998).

Dans le fichier longitudinal, la variable groupée du code pour le pays de naissance ne figure qu'une seule fois, sous le nom COBGC plutôt que de figurer une fois pour chaque cycle. Voir Annexe C pour la liste des codes.

Code	Description	Condition
1	Canada	COBC>0 et <14
2	Autre pays d'Amérique du Nord	(COBC>=100 et <200) ou (COBC=206)
3	Amérique du Sud, Amérique centrale et Antilles	(COBC>200 et <206) ou (COBC>206 et <500)
4	Europe	COBC>=500 et <600
5	Afrique	COBC>=600 et <700
6	Asie	COBC>=700 et <800
7	Océanie	COBC>=800 et <900
96	Sans objet	COBC=9996
99	Non déclaré	Autrement

1.4 Statut d'immigrant

Nom longitudinal : IMM

Basé sur SDC_n_3. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que SDC_nFIMM au cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998).

Cette variable dérivée indique si le répondant est un immigrant. Dans le fichier longitudinal, l'indicateur d'immigration n'apparaît qu'une seule fois, sous le nom de variable IMM, plutôt qu'une fois pour chaque cycle.

Code	Description	Condition
1	Oui	SDC _n _3<9995
2	Non	SDC _n _3=9995 ou SDC _n _3=9996
9	Non déclaré	Autrement

1.5 Âge au moment de l'immigration

Nom longitudinal : AOI

Source : *Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991)*

Site Web de Statistique Canada : www.statcan.ca/francais/sdds/3894_f.htm

Basé sur DHC4_AGE, YOB (Année de naissance) et YOI (Année de l'immigration au Canada). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que SDC_nDAIM au cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998).

Cette variable dérivée indique l'âge du répondant au moment de son immigration au Canada. Dans le fichier longitudinal, la variable d'âge au moment de l'immigration ne figure qu'une seule fois, sous le nom AOI, plutôt que de figurer une fois pour chaque cycle.

Code	Description	Condition
0-135	Âge au moment de l'immigration	Si YOI<9995 alors AOI=YOI-YOB
996	Sans objet	YOI=9995 ou YOI=9996
999	Non déclaré	YOI=9997, 9998 ou 9999

1.6 Jour de décès

Nom longitudinal : DOD

Basé sur les données recueillies, confirmées par appariement avec la Base canadienne de données sur la mortalité si la cause du décès du répondant est indiquée.

Dans le fichier longitudinal, le jour de décès n'apparaît qu'une seule fois sous le nom de variable DOD, au lieu d'une fois pour chaque cycle. Pour chacun des cycles, le jour de décès peut refléter l'information mise à jour (p. ex. un jour de décès différent confirmé par un appariement avec la base de données sur la mortalité).

1.7 Mois de décès

Nom longitudinal : MOD

Basé sur les données recueillies, confirmées par appariement avec la Base canadienne de données sur la mortalité si la cause du décès du répondant est indiquée.

Dans le fichier longitudinal, le mois de décès n'apparaît qu'une seule fois sous le nom de variable MOD, au lieu d'une fois pour chaque cycle. Pour chacun des cycles, le mois de décès peut refléter l'information mise à jour (p. ex. un mois de décès différent confirmé par un appariement avec la base de données sur la mortalité).

1.8 Année de décès

Nom longitudinal : YOD

Basé sur les données recueillies, confirmées par appariement avec la Base canadienne de données sur la mortalité si la cause du décès du répondant est indiquée.

Dans le fichier longitudinal, l'année de décès n'apparaît qu'une seule fois sous le nom de variable YOD, au lieu d'une fois pour chaque cycle. Pour chacun des cycles, l'année de décès peut refléter l'information mise à jour (p. ex. une année de décès différente confirmée par un appariement avec la base de données sur la mortalité).

1.9 Code pour la cause de décès

Nom longitudinal : COD

Basé sur la Classification internationale des maladies, 9^{ième} révision.

Les enregistrements avec un état final = « décédé » sont appariés au Système national des statistiques d'état civil. Ce code, appelé « Cause sous-jacente de décès » est basé sur la Classification internationale des maladies, 9^{ième} révision. Le code représente la maladie ou la blessure à l'origine de la séquence d'événements menant directement au décès, ou les circonstances de l'accident ou de la violence menant à une blessure fatale. Pour plus d'information, consulter le *Manuel de Codage* (ENSP), le *Dictionnaire des données sur les décès* (Système de statistique de l'état civil) et *Le Fichier de référence des causes sous-jacentes de décès/de mortinaissance* (Système de statistique de l'état civil).

Dans le fichier longitudinal, le code pour la cause de décès n'apparaît qu'une seule fois sous le nom de variable COD, au lieu d'une fois pour chaque cycle.

2. DÉPENDANCE À L'ÉGARD DE L'ALCOOL (AD)

2.1 Échelle de dépendance à l'alcool – cote du questionnaire abrégé

Nom au cycle 5 : AD_2DSF

Nom au cycle 4 : S.O

Nom au cycle 3 : S.O

Nom au cycle 2 : AD_6DSF

Nom au cycle 1 : S.O

Source : Kessler R.C., G. Andrews et D. Mroczek et al. « *The World Health Organisation Composite Diagnostic Interview Short-Form* », *Psychological Medicine*

Site Internet : Institute for Social Research / Survey Research Center de l'Université du Michigan : www.isr.umich.edu/src/
Composite International Diagnostic Interview (CIDI) : www.who.int/msa/cidi/index.htm

Basé sur AD_n_1, AD_n_3 à AD_n_7 et AD_n_9.

MIN = 0, MAX = 7 (la dépendance est d'autant plus grande que la cote est élevée)

Cette variable dérivée a été recueillie pour mesurer la dépendance à l'alcool du répondant. Les questions posées pour évaluer la dépendance à l'alcool se fondent sur les travaux de Kessler et Mroczek (de l'Université du Michigan). Cet indice mesure la tolérance, l'état de manque, la perte de contrôle, ou les problèmes sociaux ou physiques reliés à l'alcool. L'indice est fondé sur un sous-ensemble de questions tirées de la *Composite International Diagnostic Interview (CIDI)*. La CIDI est un instrument diagnostique structuré conçu pour produire des diagnostics conformément aux définitions et critères des Critères A et B de diagnostic du trouble d'utilisation de substances psychoactives du DSM-III-R. Voir le tableau pour AD_nDPP plus bas.

Code	Description	Condition
0	Pas un buveur régulier	AL_n_3=1 ou AL_n_3=2
1 - 7	Valeur de l'indice (cote)	Somme de AD_n_1 + AD_n_3 + AD_n_4 + AD_n_5 + AD_n_6 + AD_n_7 + AD_n_9 quand toute valeur=1.
96	Sans objet	AD_n_1=6 (procuration ou âge < 12)
99	Non déclaré	Autrement

2.2 Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue

Nom au cycle 5 : AD_2DPP

Nom au cycle 4 : S.O.

Nom au cycle 3 : S.O.

Nom au cycle 2 : AD_6DPP

Nom au cycle 1 : S.O.

Site Internet : National Comorbidity Survey : www.hcp.med.harvard.edu/ncs/
Composite International Diagnostic Interview (CIDI) : www.who.int/msa/cidi/index.htm

Basé sur AD_nDSF (Source : AD_n_1, AD_n_3 à AD_n_7 et AD_n_9).

La probabilité prévue de la dépendance à l'alcool d'un cas a été attribuée d'après la cote calculée pour le questionnaire abrégé (AD_nDSF). La mise au point du questionnaire abrégé pour évaluer la

dépendance à l'alcool vise à produire une mesure fondée sur la mise en application du critère A et du critère B du diagnostic du trouble d'utilisation de substances psychoactives du DSM-III-R. On a attribué une probabilité nulle aux personnes qui ont répondu « Non » aux questions de base. Voir le tableau plus bas. La règle optimale de classification dichotomique consiste à définir toutes les personnes qui obtiennent une cote égale ou supérieure à 3 pour le questionnaire abrégé comme étant des cas probables et celles qui obtiennent une cote comprise entre 0 et 2 comme n'étant probablement pas des cas de dépendance à l'alcool.

D'après des renseignements tirés du *National Comorbidity Survey* (réalisé aux États-Unis), on a procédé à la classification croisée des cotes obtenues sur l'échelle de dépistage et des désignations de cas de dépendance à l'alcool fondées sur le programme diagnostique informatisé de la CIDI.

Code	Description	Condition
0.00	Probabilité de ne pas être un cas	AD_nDSF=0
0.05	Probabilité de ne pas être un cas	AD_nDSF=1
0.40	Probabilité de ne pas être un cas	AD_nDSF=2
0.85	Probabilité d'être un cas	AD_nDSF=3
1.00	Probabilité d'être un cas	AD_nDSF > 3 et < 96
9.96	Sans objet	AD_nDSF= 96
9.99	Non déclaré	Autrement

Dans le cadre de l'ENSP, on se sert de la gamme complète de questions mises au point par Kessler et Mroczek pour évaluer la dépendance à l'alcool. Toutefois, dans le cadre de leurs travaux, Kessler et Mroczek posent les questions à toute personne qui a bu au moins quatre verres d'alcool, en une occasion, au cours des 12 derniers mois. Par contre, dans le cadre de l'ENSP, les questions sur la dépendance à l'alcool ont été posées aux personnes qui ont déclaré avoir consommé cinq verres d'alcool ou plus, au moins une fois par mois au cours des 12 derniers mois.

Cote questionnaire abrégé (AD_nDSF)	Probabilité d'être un cas selon la CIDI - questionnaire abrégé (AD_nDPP)*	Probabilité d'être un cas selon la CIDI - questionnaire détaillé (AD_nDPP)
0	0,00	0,0003
1	0,05	0,0614
2	0,40	0,3874
3	0,85	0,8411
4	0,85	1,0000
5	1,00	1,0000
6	1,00	1,0000
7	1,00	1,0000
96 (S.O.)	1,00	6 (S.O.)
99 (Non déclaré)	1,00	9 (Non déclaré)
	9,96 (S.O.)	
	9,99 (Non déclaré)	

* Pour faciliter l'interprétation des données, on utilise la probabilité d'être un cas selon la CIDI fondée sur le questionnaire abrégé dans les ensembles de données de l'ENSP.

3. CONSOMMATION D'ALCOOL (AL)

3.1 Genre de buveur

Nom au cycle 5 : ALC2DTYP

Nom au cycle 4 : ALC0DTYP

Nom au cycle 3 : ALC8DTYP

Nom au cycle 2 : ALC6DTYP

Nom au cycle 1 : ALC4DTYP (anciennement DVALT94)

Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991)

Site Web de Statistique Canada : www.statcan.ca/francais/sdds/3894_f.htm

Basé sur ALCn_2 et ALCn_5B.

Cette variable dérivée indique le type de buveur en fonction des habitudes de consommation du répondant.

Nota : La présente VD a été calculée pour les personnes placées en établissement. La nouvelle spécification « sans objet » a été ajoutée pour les enfants.

*Les réponses à la question ALC_Q2 de 1994 et à la question ALCn_2 de 1996 sont en ordre inverse. Pour 1994, les catégories de réponse vont de « tous les jours » à « moins d'une fois par mois » et pour 1996, de « moins d'une fois par mois » à « tous les jours ». Les nouvelles spécifications reflètent cette inversion de l'ordre des réponses.

Code	Description	Condition
1	Buveur régulier	ALCn_2>1 et ALCn_2<96
2	Buveur occasionnel	ALCn_2=1
3	Non-buveur à l'heure actuelle	ALCn_5B=1
4	N'a jamais bu	ALCn_5B=2
6	Sans objet	ALCn_2=96 et ALCn_5B=6
9	Non déclaré	Autrement

3.2 Quantité totale d'alcool consommé par semaine

Nom au cycle 5 : ALC2DWKY

Nom au cycle 4 : ALC0DWKY

Nom au cycle 3 : ALC8DWKY

Nom au cycle 2 : ALC6DWKY

Nom au cycle 1 : ALC4DWKY (anciennement DVALWV94)

Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991)

Site Web de Statistique Canada : www.statcan.ca/francais/sdds/3894_f.htm

Basé sur ALCn_5A1 à ALCn_5A7.

Somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview.

Cette variable dérivée n'est calculée que pour les personnes qui ont bu au moins un verre d'alcool au cours des 12 derniers mois. Cette variable dérivée ne s'applique ni aux personnes en établissement, ni aux enfants, ni aux personnes qui n'ont pas bu d'alcool au cours des 12 derniers mois.

Code	Description	Condition
0 - 693	Nombre de verres	Somme de ALCn_5A1 à ALCn_5A7
996	Sans objet	ALCn_5=6
999	Non déclaré	Si une question parmi ALCn_5A1 à ALCn_5A7=997, 998 ou 999

3.3 Moyenne quotidienne d'alcool consommé

Nom au cycle 5 : ALC2DDLY

Nom au cycle 4 : ALC0DDLY

Nom au cycle 3 : ALC8DDLY

Nom au cycle 2 : ALC6DDLY

Nom au cycle 1 : ALC4DDLY (*anciennement DVALAV94*)

Basé sur ALCn_5, ALCn_5A1 à ALCn_5A7.

Total hebdomadaire d'alcool consommé divisé par 7.

Cette variable dérivée n'est calculée que pour les personnes qui ont bu au moins un verre d'alcool au cours des 12 derniers mois. Cette variable dérivée ne s'applique ni aux personnes en établissement, ni aux enfants, ni aux personnes qui n'ont pas bu d'alcool au cours des 12 derniers mois.

Code	Description	Condition
0 - 95	Moyenne quotidienne	ALCnDWKY / 7
96	Sans objet	ALCn_5=6
99	Non déclaré	Si une question parmi ALCn_5A1 à ALCn_5A7=997, 998 ou 999

VARIABLES RELATIVES À L'ALCOOL SUPPRIMÉES :

1. Unique raison pour avoir réduit ou arrêté de boire

Nom au cycle 3 : ALC8D7

Nom au cycle 2 : ALC6D7

Raison : La fréquence de la cellule est trop petite

2. Unique raison pour avoir réduit ou arrêté de boire - Groupé

Nom au cycle 3 : ALC8G7

Nom au cycle 2 : ALC6G7

Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)

4. ADMINISTRATION (AM)

4.1 Temps écoulé entre les entrevues H06

Nom au cycle 5 : AM62LDUR

Nom au cycle 4 : AM60LDUR

Nom au cycle 3 : AM68LDUR

Nom au cycle 2 : AM66LDUR

Nom au cycle 1 : S.O.

Basé sur AM6n_BDD, AM6n_BMM et AM6n_BYY.

La durée est calculée en jours.

Minimum: une entrevue du cinquième trimestre (QTR5) du cycle (N moins 1) effectuée au premier trimestre (QTR1) du cycle 1 (environ 336 jours).

Maximum : une entrevue du premier trimestre (QTR1) du cycle (N moins 1) effectuée au cinquième trimestre (QTR5) du cycle N (environ 1 125 jours).

Si toute partie de l'une ou l'autre date manque, on fixe la valeur de la variable à « Non déclaré ».

4.2 Province de l'échantillon

Nom longitudinal : DESIGPRV

Pour l'échantillon longitudinal de l'ENSP, il s'agit de la province de résidence en 1994. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que PRCn_DES au cycle 2 (1996) et au cycle 3 (1998).

Code	Description
10	Terre-Neuve et Labrador
11	Île-du-Prince-Édouard
12	Nouvelle-Écosse
13	Nouveau-Brunswick
24	Québec
35	Ontario
46	Manitoba
47	Saskatchewan
48	Alberta
59	Colombie-Britannique

4.3 Profil de réponse longitudinal

Nom longitudinal : LONGPAT

Basé sur APPSTAT n et SP3 n _STA.

Cette variable dérivée regroupe toutes les possibilités de réponse pour toutes les années (1ier chiffre représente le cycle 1 (1994), 2ième, cycle 2 (1996), etc.). Lors de chaque cycle, on procède à la concaténation du dernier code de réponse au profil de réponse longitudinal obtenu pour le cycle précédent. Pour chaque cycle, les codes sont les suivants :

Code	Description	Condition
1	Réponse complète	APPSTAT n <>450 et SP3 n _STA=700
2	Décédé(e)	SP3 n _STA=640, 642 ou 644
3	Répondant(e) en établissement (interviewé(e) par le volet des Établissements de soins de santé)	APPSTAT n =450 et SP3 n _STA=710 ou SP3 n _STA=700
4	Réponse partielle	APPSTAT n <>450 et SP3 n _STA=710
5	Non-réponse	Autrement

Par exemple, un enregistrement où LONGPAT = 15341 indique que la personne a répondu entièrement au questionnaire du cycle 1, n'a pas participé au cycle 2 (non-répondant), a répondu au questionnaire de la composante des établissements de santé au cycle 3, a répondu partiellement au questionnaire du cycle 4 et a répondu entièrement au questionnaire du cycle 5.

4.4 Accepte de partager les données

Nom longitudinal : SHARE

Basé sur AM6 n _SHA

Le répondant accepte de partager l'information recueillie pour tous les cycles.

Code	Description	Condition
1	Oui	AM62_SHA=1
1	Oui	AM60_SHA=1
1	Oui	AM68_SHA=1
1	Oui	AM66_SHA=1 et AM64_SHA=1
2	Non	AM62_SHA dans (2, 7, 8)
2	Non	AM60_SHA dans (2, 7, 8)
2	Non	AM68_SHA dans (2, 7, 8)
2	Non	Autrement

5. PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES (CC)

5.1 Nombre de problèmes de santé chronique

Nom au cycle 5 : CCC2DNUM
 Nom au cycle 4 : CCC0DNUM
 Nom au cycle 3 : CCC8DNUM
 Nom au cycle 2 : CCC6DNUM
 Nom au cycle 1 : CCC4DNUM

Basé sur CCC n _1A à CCC n _1X.

Si la personne interrogée a refusé de répondre ou ne savait pas si la personne visée par la question souffrait d'un problème de santé chronique, on attribue la valeur « Non déclaré » à la variable « nombre de problèmes de santé chroniques ».

Nota : La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. Le nombre de problèmes de santé chroniques n'a pas été modifié dans le cycle 5, mais la catégorie « sinusite » (CCC n _1I) a été remplacée par « fibromyalgie » (CCC n _1X) dans le cycle 4. Étant donné que CCC n DNUM et CCC n DANY sont uniquement basées sur la quantité de problèmes de santé chroniques, le changement n'affecte pas le calcul de ces deux variables dérivées.

Code	Description	Condition
0-22	Nombre de problèmes de santé chronique	Somme des réponses « Oui » entre CCC n _1A à CCC n _1X
96	Sans objet	CCC n _1A=6
99	Non déclaré	N'importe quelle question parmi CCC n _1A à 1X=7, 8 ou 9

5.2 A un problème de santé chronique

Nom au cycle 5 : CCC2DANY
 Nom au cycle 4 : CCC0DANY
 Nom au cycle 3 : CCC8DANY
 Nom au cycle 2 : CCC6DANY
 Nom au cycle 1 : CCC4DANY

Basé sur CCC n DNUM (Source : CCC n _1A à CCC n _1X).

Cette variable dérivée indique si le répondant souffrait ou non d'un problème de santé chronique qui a été diagnostiqué par un professionnel de la santé. Voir aussi CCC n DNUM 2000 ci-après.

1994

CCC4DANY indique si un répondant souffre ou non d'un problème de santé chronique, d'après la réponse à la question CCC4_1V. En 1994, il s'agissait d'une question distincte qui était le dernier élément de la liste de questions sous CHRON-Q1, une question où il fallait choisir toutes les réponses appropriées (dans le fichier maître sous CCC4_NON). Cette variable prêtait à confusion, puisque « Oui » signifiait que le répondant ne souffrait d'aucun problème de santé chronique.

Code	Description	Condition
1	Oui	CCC4_NON=2
2	Non	CCC4_NON=1
6	Sans objet	CCC4_NON=6
9	Non déclaré	Autrement

Spécifications: Changement de nom de variable CCC4_NON à CCC4DANY.

1996, 1998 et 2000 :

CCC6DANY, CCC8DANY et CCC0DANY indiquent si le répondant souffre d'un problème de santé chronique, d'après les réponses aux questions CCCn_1A à CCCn_1V (CCCn_1X en 2000 et 2002).

Nota : La valeur de cette variable est fixée à « Sans objet » pour les personnes en établissement.

2000 et 2002 :

Le nombre de problèmes de santé chroniques n'a pas été modifié dans le cycle 5. La catégorie « Sinusite » (CCCn_1I) a été remplacée par « fibromyalgie » (CCCn_1X) dans le cycle 4. Étant donné que CCCnDNUM et CCCnDANY sont uniquement basées sur la quantité de problèmes de santé chroniques, le changement n'affecte pas le calcul de ces deux variables dérivées.

Code	Description	Condition
1	Oui	CCCnDNUM>0 (une des réponses entre CCCn_1A et CCCn_1X est « Oui »)
2	Non	Aucune réponse entre CCCn_1A et CCCn_1X n'est « Oui »
6	Sans objet	CCCnDNUM=96 (CCCn_1A=6)
9	Non déclaré	Au moins une valeur entre CCCn_1A et CCCn_1X est 7, 8 ou 9 et toutes les autres réponses sont « Non » ou « Non applicable »

VARIABLES RELATIVES AUX PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES SUPPRIMÉES :

1. Nombre de problèmes de santé chroniques - Groupé

Nom au cycle 3 : CCC8GNUM

Nom au cycle 2 : CCC6GNUM

Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)

6. CONSOMMATION DE MÉDICAMENTS (DG)

6.1 Indicateur pour médicament pris

Nom au cycle 5 : DGC2F1

Nom au cycle 4 : DGC0F1

Nom au cycle 3 : DGC8F1

Nom au cycle 2 : DGC6F1

Nom au cycle 1 : DGC4F1

Basé sur DGC_n_1A à 1V, DHC_n_SEX et DHC_n_AGE.

Cette variable dérivée indique si la personne a consommé ou non des médicaments au cours du dernier mois, d'après les réponses aux questions DGC_n_1 A à 1V. En 1994, il s'agissait d'une réponse distincte figurant au bas de la liste de réponses à la question DRG_Q1 pour laquelle il fallait choisir toutes les réponses appropriées (dans le fichier maître à titre de DRGQ1_V). En 1996, la question est devenue une série de questions auxquelles il fallait répondre par « Oui » ou « Non » plutôt qu'une question pour laquelle il fallait choisir toutes les réponses appropriées. Cette variable dérivée remplace la réponse « aucun » à la question DRG_Q1.

Code	Description	Condition
1	A pris au moins un médicament au cours du dernier mois	Une réponse entre DGC _n _1A et 1V =1
2	N'a pris aucun médicament au cours du dernier mois	Toutes les réponses entre DGC _n _1A et 1V=2. Si DHC _n _SEX=1, exclure DGC _n _1S et DGC _n _1T; Si DHC _n _SEX=2 et DHC _n _AGE<=29, exclure DGC _n _1T; Si DHC _n _SEX=2 et DHC _n _AGE>=50, exclure DGC _n _1S.
6	Sans objet	DGC _n _1A=6
9	Non déclaré	Tout autre problème

6.2 Code des médicaments n° 1 à 12

Nom au cycle 5 : DGC2C3A à DGC2C3L

Nom au cycle 4 : DGC0C3A à DGC0C3L

Nom au cycle 3 : DGC8C3A à DGC8C3L

Nom au cycle 2 : DGC6C3A à DGC6C3L

Nom au cycle 1 : DGC4C3A à DGC4C3L

La classification des médicaments se fonde sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. La liste complète des codes est disponible sur demande.

6.3 Code des médicaments n° 1 à 12 - Groupé

Nom au cycle 5 : DGC2G3A à DGC2G3L

Nom au cycle 4 : DGC0G3A à DGC0G3L

Nom au cycle 3 : DGC8G3A à DGC8G3L

Nom au cycle 2 : DGC6G3A à DGC6G3L

Nom au cycle 1 : DGC4G3A à DGC4G3L (Nouveau au cycle 5)

Basé sur DGCnC3A à DGCn3CL. Voir Annexe B.

La classification des médicaments se fonde sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Au cycle 5 (2002) cette variable groupée est aussi calculée pour le Cycle 1 (1994). Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir Annexe B pour la liste des codes.

Code	Description	Condition
1	Tube digestif et métabolisme	substr (DGCnC3x,1,1)='A'
2	Sang et organes sanguiniformateurs	substr (DGCnC3x,1,1)='B'
3	Système cardio-vasculaire	substr (DGCnC3x,1,1)='C'
4	Produits dermatologiques	substr (DGCnC3x,1,1)='D'
7	Syst. génito-urinaires / horm. sexuelles	substr (DGCnC3x,1,1)='G'
8	Préparations hormonales systémiques	substr (DGCnC3x,1,1)='H'
10	Anti-infectieux généraux	substr (DGCnC3x,1,1)='J'
12	Agents antinéoplasiques	substr (DGCnC3x,1,1)='L'
13	Système musculo-squelettique	substr (DGCnC3x,1,1)='M'
14	Système nerveux	substr (DGCnC3x,1,1)='N'
16	Produits antiparasitaires	substr (DGCnC3x,1,1)='P'
18	Système respiratoire	substr (DGCnC3x,1,1)='R'
19	Organes sensoriels	substr (DGCnC3x,1,1)='S'
22	Médicaments et produits divers	substr (DGCnC3x,1,1)='V'
24	Médecines douces	substr (DGCnC3x,1,1)='X'
26	Médicaments ou produits inconnus	substr (DGCnC3x,1,1)='Z'
96	Sans objet	DGCnC3x='9999996'
99	Non déclaré	DGCnC3x='9999997' or '9999998' or '9999999'

6.4 Code des produits pour la santé n° 1 à 12

Nom au cycle 5 : DGC2C5A à DGC2C5L

Nom au cycle 4 : DGC0C5A à DGC0C5L

Nom au cycle 3 : DGC8C5A à DGC8C5L

Nom au cycle 2 : DGC6C5A à DGC6C5L

Nom au cycle 1 : DGC4C5A à DGC4C5L

La classification des médicaments se fonde sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. La liste complète des codes est disponible sur demande.

6.5 **Code des produits pour la santé n° 1 à 12 - Groupé**

Nom au cycle 5 : DGC2G5A à DGC2G5L

Nom au cycle 4 : DGC0G5A à DGC0G5L

Nom au cycle 3 : DGC8G5A à DGC8G5L

Nom au cycle 2 : DGC6G5A à DGC6G5L

Nom au cycle 1 : DGC4G5A à DGC4G5L (*Nouveau au cycle 5*)Basé sur DGCnC5A à DGCnC5L. *Voir Annexe B*

La classification des médicaments se fonde sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Au cycle 5 (2002) cette variable groupée est aussi calculée pour le Cycle 1 (1994). Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. *Voir Annexe B* pour la liste des codes.

Code	Description	Condition
1	Tube digestif et métabolisme	substr (DGCnC5x,1,1)='A'
2	Sang et organes sanguiformateurs	substr (DGCnC5x,1,1)='B'
3	Système cardio-vasculaire	substr (DGCnC5x,1,1)='C'
4	Produits dermatologiques	substr (DGCnC5x,1,1)='D'
7	Syst. génito-urinaires / horm. sexuelles	substr (DGCnC5x,1,1)='G'
8	Préparations hormonales systémiques	substr (DGCnC5x,1,1)='H'
10	Anti-infectieux généraux	substr (DGCnC5x,1,1)='J'
12	Agents antinéoplasiques	substr (DGCnC5x,1,1)='L'
13	Système musculo-squelettique	substr (DGCnC5x,1,1)='M'
14	Système nerveux	substr (DGCnC5x,1,1)='N'
16	Produits antiparasitaires	substr (DGCnC5x,1,1)='P'
18	Système respiratoire	substr (DGCnC5x,1,1)='R'
19	Organes sensoriels	substr (DGCnC5x,1,1)='S'
22	Médicaments et produits divers	substr (DGCnC5x,1,1)='V'

Code	Description	Condition
24	Médecines douces	substr (DGCnC5x,1,1)='X'
26	Médicaments ou produits inconnus	substr (DGCnC5x,1,1)='Z'
96	Sans objet	DGCnC5x='9999996'
99	Non déclaré	DGCnC5x='9999997' or '9999998' or '9999999'

7. VARIABLES CONCERNANT LE MÉNAGE (DH)

7.1 Genre d'animal domestique

Nom au cycle 5 : S.O.

Nom au cycle 4 : S.O.

Nom au cycle 3 : S.O.

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : DH_4DP2 (*anciennement KINDPET*)

Basé sur DH_n_P1.

Étant donné que toutes les réponses appropriées ont été choisies pour les genres d'animaux familiers dans le foyer, les catégories 1 à 6 représentent une combinaison de chats, de chiens et d'autres animaux. La catégorie 7 regroupe les autres animaux familiers uniquement. Question posée au cycle 1 (1994) uniquement.

Code	Description	Condition
1	Chat(s) seulement	DH_n_PI=2
2	Chat(s) et chien(s)	DH_n_PI=1 et DH_n_PI=2
3	Chat(s) et chien(s) et autres	DH_n_PI=1 et DH_n_PI=2 et DH_n_PI=3
4	Chat(s) et autres	DH_n_PI=2 et DH_n_PI=3
5	Chien(s) seulement	DH_n_PI=1
6	Chien(s) et autres	DH_n_PI=1 et DH_n_PI=3
7	Autres seulement	DH_n_PI=3
96	Sans objet	DH_n_PI=6
99	Non déclaré	Autrement

7.2 Taille des ménages

Nom au cycle 5 : DHC2DHSZ

Nom au cycle 4 : DHC0DHSZ

Nom au cycle 3 : DHC8DHSZ

Nom au cycle 2 : DHC6DHSZ

Nom au cycle 1 : DHC4DHSZ (*anciennement HHSIZE*)

Basé sur DHCn_MEM.

Cette variable dérivée représente le nombre de personnes qui habitent dans le ménage. Pour dériver cette variable, le fichier ménage est trié par REALUKEY et PERSONID et on compte le nombre de PERSONID pour chaque REALUKEY.

7.3 Nombre de personnes de moins de 25 ans dans le ménage

Nom au cycle 5 : S.O.

Nom au cycle 4 : S.O.

Nom au cycle 3 : S.O.

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : DHC4DL25 (*anciennement NUMLT25*)

Basé sur DHCn_AGE.

Cette variable dérivée représente le nombre de personnes âgées de moins de 25 ans qui habitent

dans le ménage. Pour dériver cette variable, le fichier ménage est trié par REALUKEY et PERSONID et on compte le nombre de PERSONID pour chaque REALUKEY avec DHC_n_AGE ayant une valeur inférieure à 25.

7.4 Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage

Nom au cycle 5 : DHC2DL12
Nom au cycle 4 : DHC0DL12
Nom au cycle 3 : DHC8DL12
Nom au cycle 2 : DHC6DL12
Nom au cycle 1 : DHC4DL12 (*anciennement NUMLT12*)

Basé sur DHC_n_AGE.

Cette variable dérivée représente le nombre de personnes âgées de moins de 12 ans qui habitent dans le ménage. Pour dériver cette variable, le fichier ménage est trié par REALUKEY et PERSONID et on compte le nombre de PERSONID pour chaque REALUKEY avec DHC_n_AGE ayant une valeur inférieure à 12.

7.5 Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage

Nom au cycle 5 : DHC2DE12
Nom au cycle 4 : DHC0DE12
Nom au cycle 3 : DHC8DE12
Nom au cycle 2 : DHC6DE12
Nom au cycle 1 : DHC4DE12 (*anciennement NUMEQ12*)

Basé sur DHC_n_AGE.

Cette variable dérivée représente le nombre de personnes âgées de 12 ans qui habitent dans le ménage. Pour dériver cette variable, le fichier ménage est trié par REALUKEY et PERSONID et on compte le nombre de PERSONID pour chaque REALUKEY avec DHC_n_AGE ayant une valeur égale à 12.

7.6 Nombre de personnes de 5 ans et moins dans le ménage

Nom au cycle 5 : DHC2DLE5
Nom au cycle 4 : DHC0DLE5
Nom au cycle 3 : DHC8DLE5
Nom au cycle 2 : DHC6DLE5
Nom au cycle 1 : DHC4DLE5 (*anciennement NUMLE5*)

Basé sur DHC_n_AGE.

Cette variable dérivée représente le nombre de personnes âgées de moins de 5 ans qui habitent dans le ménage. Pour dériver cette variable, le fichier ménage est trié par REALUKEY et PERSONID et on compte le nombre de PERSONID pour chaque REALUKEY avec DHC_n_AGE ayant une valeur inférieure à 6.

7.7 Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage

Nom au cycle 5 : DHC2D611
Nom au cycle 4 : DHC0D611
Nom au cycle 3 : DHC8D611
Nom au cycle 2 : DHC6D611
Nom au cycle 1 : DHC4D611 (*anciennement NUM6TO11*)

Basé sur DHC_n_AGE.

Cette variable dérivée représente le nombre de personnes âgées entre 6 et 11 ans qui habitent dans

le ménage. Pour dériver cette variable, le fichier ménage est trié par REALUKEY et PERSONID et on compte le nombre de PERSONID pour chaque REALUKEY avec DHC_n_AGE ayant une valeur entre 6 et 11.

7.8 Âge - Groupé

Nom au cycle 5 : DHC2GAGE

Nom au cycle 4 : DHC0GAGE

Nom au cycle 3 : DHC8GAGE

Nom au cycle 2 : DHC6GAGE

Nom au cycle 1 : DHC4GAGE (*anciennement AGEGRP*)

Basé sur DHC_n_AGE.

Code	Description	Condition
1	0 à 3 ans	DHC _n _AGE>0 et DHC _n _AGE<4
2	4 à 5 ans	DHC _n _AGE>3 et DHC _n _AGE<6
3	6 à 9 ans	DHC _n _AGE>5 et DHC _n _AGE<10
4	10 à 11 ans	DHC _n _AGE>9 et DHC _n _AGE<12
5	12 à 14 ans	DHC _n _AGE>11 et DHC _n _AGE<15
6	15 à 19 ans	DHC _n _AGE>14 et DHC _n _AGE<20
7	20 à 24 ans	DHC _n _AGE>19 et DHC _n _AGE<25
8	25 à 29 ans	DHC _n _AGE>24 et DHC _n _AGE<30
9	30 à 34 ans	DHC _n _AGE>29 et DHC _n _AGE<35
10	35 à 39 ans	DHC _n _AGE>34 et DHC _n _AGE<40
11	40 à 44 ans	DHC _n _AGE>39 et DHC _n _AGE<45
12	45 à 49 ans	DHC _n _AGE>44 et DHC _n _AGE<50
13	50 à 54 ans	DHC _n _AGE>49 et DHC _n _AGE<55
14	55 à 59 ans	DHC _n _AGE>54 et DHC _n _AGE<60
15	60 à 64 ans	DHC _n _AGE>59 et DHC _n _AGE<65
16	65 à 69 ans	DHC _n _AGE>64 et DHC _n _AGE<70
17	70 à 74 ans	DHC _n _AGE>69 et DHC _n _AGE<75
18	75 à 79 ans	DHC _n _AGE>74 et DHC _n _AGE<80
19	80 ans et plus	DHC _n _AGE>79
99	Non déclaré	Autrement

7.9 Type de ménage

Nom au cycle 5 : DHC2DECF

Nom au cycle 4 : DHC0DECF

Nom au cycle 3 : DHC8DECF

Nom au cycle 2 : DHC6DECF

Nom au cycle 1 : DHC4DECF (*anciennement DVECFM94*)

Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage.

On a créé ces variables dérivées pour indiquer les modalités d'habitation dans le ménage. Elles se fondent sur les âges et sur les liens déclarés entre tous les membres du ménage.

On recueille des renseignements sur deux variables qui décrivent les liens unissant les membres du ménage (DHCnDECF) et entre le répondant sélectionné et les autres membres du ménage (DHCnDLVG) grâce à un ensemble de relations qui définissent un lien pour chaque membre du ménage. Cette matrice de relations ne figure pas dans le fichier maître. Les codes utilisés pour décrire les relations ne sont pas les mêmes au cycle 1 que pour les cycles suivants, mais les liens dérivés des relations sont comparables.

Code	Description	Condition
1	Personne sans lien	Personne sans lien vivant seule. Taille du ménage=1.
2	Personne sans lien vivant avec d'autres	Personnes sans lien vivant ensemble. Il ne peut y avoir de relation matrimoniale, d'union de fait ou parentale, mais d'autres liens, comme des liens fraternels, sont permis.
3	Couple seul	Marié ou en union de fait, sans enfant à charge. Aucun autre lien n'est permis. Taille du ménage=2.
4	Couple sans enfant à charge, autres	Marié ou en union de fait, sans enfant à charge. Il ne peut y avoir de lien parent/enfant. D'autres liens sont permis.
5	Couple avec enfant(s) à charge de moins de 25 ans	Couple marié ou en union de fait dont au moins l'un des partenaires est le parent de l'enfant à charge. Aucun autre lien n'est permis.
6	Couple avec enfant(s) de moins de 25 ans, autres	Au moins l'un des partenaires doit être le parent d'un enfant de moins de 25 ans vivant dans le ménage. D'autres liens sont permis.
7	Couple dont tous les enfants ont 25 ans et plus	Couple marié ou en union de fait dont tous les enfants ont 25 ans et plus. Aucun autre lien n'est permis.
8	Couple dont tous les enfants ont 25 ans et plus, autres	Couple marié ou en union de fait dont tous les enfants ont 25 ans et plus. D'autres liens sont permis.
9	Mère seule avec enfant(s) de moins de 25 ans	Un enfant doit avoir moins de 25 ans. Seul les liens parents/enfants sont permis.
10	Mère seule avec enfant(s) de moins de 25 ans, autres	Un enfant doit avoir moins de 25 ans. D'autres liens sont permis.
11	Mère seule dont tous les enfants ont 25 ans et plus	Tous les enfants doivent avoir 25 ans et plus. Aucun autre lien n'est permis.
12	Mère seule dont tous les enfants ont 25 ans et plus, autres	Tous les enfants doivent avoir 25 ans et plus. D'autres liens sont permis.
13	Père seul avec enfant(s) de moins de 25 ans	Un enfant doit avoir moins de 25 ans. Seul les liens parents/enfants sont permis.
14	Père seul avec enfant(s) de moins de 25 ans, autres	Un enfant doit avoir moins de 25 ans. D'autres liens sont permis.

Code	Description	Condition
15	Père seul dont tous les enfants ont 25 ans et plus	Tous les enfants doivent avoir 25 ans et plus. Aucun autre lien n'est permis.
16	Père seul dont tous les enfants ont 25 ans et plus, autres	Tous les enfants doivent avoir 25 ans et plus. D'autres liens sont permis.
17	Autre catégorie de ménage	Toutes les autres catégories de ménage.
99	Non déclaré	Autrement

7.10 Mode de vie du répondant sélectionné

Nom au cycle 5 : DHC2DLVG

Nom au cycle 4 : DHC0DLVG

Nom au cycle 3 : DHC8DLVG

Nom au cycle 2 : DHC6DLVG

Nom au cycle 1 : DHC4DLVG (*anciennement DVLVNG94*)

Basé sur la matrice des liens unissant les personnes.

Cette variable dérivée décrit la composition du ménage en relation avec le répondant sélectionné. Elle est basée sur la relation déclarée de chaque personne par rapport au répondant.

Code	Description	Condition
1	Personne sans lien vivant seule	Le répondant sélectionné vit seul. Taille du ménage=1.
2	Personne sans lien vivant avec d'autres	Le répondant sélectionné vit avec d'autres personnes. Il/elle ne peut entretenir de lien matrimonial, d'union de fait ou parental, mais d'autres liens, tels que des liens fraternels sont permis.
3	Personne vivant avec un(e) époux(se)/conjoint(e)	Le répondant sélectionné vit avec un(e) conjoint(e)/partenaire uniquement. Taille du ménage=2.
4	Parent vivant avec un(e) époux(se)/conjoint(e) et des enfants	Le répondant sélectionné vit avec un(e) conjoint(e)/partenaire et un ou des enfants.
5	Parent seul vivant avec enfant(s)	Le répondant sélectionné vit avec un ou des enfants. Aucun autre lien n'est permis.
6	Enfant vivant avec un parent seul	Le répondant sélectionné est un enfant qui vit avec un parent seul. Taille du ménage=2.
7	Enfant vivant avec un parent seul et des frères et (ou) sœurs	Le répondant sélectionné est un enfant qui vit avec un parent seul et des frères et (ou) sœurs.
8	Enfant vivant avec deux parents	Le répondant sélectionné est un enfant qui vit avec deux parents. Taille du ménage=3.
9	Enfant vivant avec deux parents et des frères et (ou) sœurs	Le répondant sélectionné est un enfant qui vit avec deux parents et des frères et (ou) sœurs.
10	Autre	Le répondant sélectionné vit dans un ménage dont la composition n'est pas classée ici.

Code	Description	Condition
99	Non déclaré	Autrement

VARIABLES RELATIVES AU MÉNAGE SUPPRIMÉES :

1. **Nombre de chambres à coucher - Groupé**
 Nom au cycle 3 : DHC8GBED
 Nom au cycle 2 : DHC6GBED
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)
2. **Nombre de chambres à coucher - Groupé**
 Nom au cycle 3 : DHC8GBD5
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)
3. **État matrimonial - Groupé**
 Nom au cycle 3 : DHC8GMAR
 Nom au cycle 2 : DHC6GMAR
 Nom au cycle 1 : DHC4GMAR (anciennement MARSTATG)
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)
4. **Taille du ménage - Groupé**
 Nom au cycle 3 : DHC8GHSZ
 Nom au cycle 2 : DHC6GHSZ
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)
5. **Type de ménage - Groupé**
 Nom au cycle 3 : DHC8GECF
 Nom au cycle 2 : DHC6GECF
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)
6. **Type de ménage - Groupé**
 Nom au cycle 3 : DHC8GEF7
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)
7. **Présence d'enfants de 5 ans ou moins dans le ménage - Groupé**
 Nom au cycle 3 : DHC8GLE5
 Nom au cycle 2 : DHC6GLE5
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)
8. **Présence d'enfants de 6 à 11 ans dans le ménage - Groupé**
 Nom au cycle 3 : DHC8G611
 Nom au cycle 2 : DHC6G611
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)

8. NIVEAU DE SCOLARITÉ (ED)

8.1 Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux

Nom au cycle 5 : EDC2D1

Nom au cycle 4 : EDC0D1

Nom au cycle 3 : EDC8D1

Nom au cycle 2 : EDC6D1

Nom au cycle 1 : EDC4D1 (*anciennement DVEDC194*)Basé sur EDC_n_4, EDC_n_5, EDC_n_7 et DESIGPRV.

Code	Description	Condition
6	Études partielles dans une école de métier	EDC _n _7=1
7	Études partielles dans un collège communautaire	EDC _n _7=2
8	Études universitaires partielles	EDC _n _7=3
9	Diplôme/certificat - école de métier	EDC _n _7=4
10	Diplôme/certificat - collège communautaire, CÉGEP	EDC _n _7=5
11	Baccalauréat (y compris LLB-LLL)	EDC _n _7=6
12	Maîtrise	EDC _n _7=7
13	Diplôme en médecine, M.D./D.D.S./D.M.D./D.V.M./D.D.	EDC _n _7=8
14	Doctorat acquis	EDC _n _7=9
5	Autres études postsecondaires	EDC _n _7=10
4	Diplôme d'études secondaires	EDC _n _5=1
1	Aucune scolarité	EDC _n _4=1
2	Études primaires	EDC _n _4 dans (2,3) et DESIGPRV dans (10,11,12,13,24,48) ou EDC _n _4 dans (2,3,4,5) et DESIGPRV dans (35,46,47) ou EDC _n _4 dans (2,3,4) et DESIGPRV dans (59)
3	Études secondaires partielles (sans diplôme)	EDC _n _4 dans (4,5,6,7,8,9,10) et DESIGPRV dans (10,11,12,13,24,48) ou EDC _n _4 dans (6,7,8,9,10) et DESIGPRV dans (35,46,47) ou EDC _n _4 dans (5,6,7,8,9,10) et DESIGPRV dans (59)
96	Sans objet (répondant de moins de 12 ans)	EDC _n _4=96
99	Non déclaré	Autrement

* L'ordre dans ce tableau indique l'ordre dans lequel les conditions sont vérifiées, chaque condition étant vérifiée seulement lorsque la précédente est fausse.

8.2 Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux

Nom au cycle 5 : EDC2D2

Nom au cycle 4 : EDC0D2

Nom au cycle 3 : EDC8D2

Nom au cycle 2 : EDC6D2

Nom au cycle 1 : EDC4D2 (*anciennement DVEDC294*)Basé sur EDC_n_4, EDC_n_5, EDC_n_7 et DESIGPRV.

Code	Description	Condition
6	Études partielles dans une école de métier	EDC _n _7=1
7	Études partielles dans un collège communautaire	EDC _n _7=2
8	Études universitaires partielles	EDC _n _7=3
9	Diplôme/certificat - école de métier	EDC _n _7=4
10	Diplôme/certificat - collège communautaire, CÉGEP	EDC _n _7=5
11	Baccalauréat (y compris LLB et LLL)	EDC _n _7=6
12	Maîtrise/diplôme en médecine/doctorat	EDC _n _7 dans (7, 8, 9)
5	Autres études postsecondaires	EDC _n _7=10
4	Diplôme d'études secondaires	EDC _n _5=1
1	Aucune scolarité	EDC _n _4=1
2	Études primaires	EDC _n _4 dans (2, 3) et DESIGPRV dans (10, 11, 12, 13, 24, 48) ou EDC _n _4 dans (2, 3, 4, 5) et DESIGPRV dans (35, 46, 47) ou EDC _n _4 dans (2, 3, 4) et DESIGPRV dans (59)
3	Études secondaires partielles (sans diplôme)	EDC _n _4 dans (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) et DESIGPRV dans (10, 11, 12, 13, 24, 48) ou EDC _n _4 dans (6, 7, 8, 9, 10) et DESIGPRV dans (35, 46, 47) ou EDC _n _4 dans (5, 6, 7, 8, 9, 10) et DESIGPRV dans (59)
96	Sans objet (répondant de moins de 12 ans)	EDC _n _4=96
99	Non déclaré	Autrement

* L'ordre dans ce tableau indique l'ordre dans lequel les conditions sont vérifiées, chaque condition étant vérifiée seulement lorsque la précédente est fausse.

8.3 Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux

Nom au cycle 5 : EDC2D3

Nom au cycle 4 : EDC0D3

Nom au cycle 3 : EDC8D3

Nom au cycle 2 : EDC6D3

Nom au cycle 1 : EDC4D3 (*anciennement DVEDC394*)

Basé sur EDC_n_4, EDC_n_5 et EDC_n_7.

Code	Description	Condition
3	Études postsecondaires partielles	EDC _n _7 dans (1, 2, 3, 10)
4	Diplôme d'études postsecondaires	EDC _n _7 dans (4, 5, 6, 7, 8, 9)
2	Diplôme d'études secondaires	EDC _n _5=1
1	Moins qu'un diplôme d'études secondaires	EDC _n _4<96
6	Sans objet	EDC _n _4=96
9	Non déclaré	Autrement

* L'ordre dans ce tableau indique l'ordre dans lequel les conditions sont vérifiées, chaque condition étant vérifiée seulement lorsque la précédente est fausse.

8.4 Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux

Nom au cycle 5 : S.O.

Nom au cycle 4 : S.O.

Nom au cycle 3 : EDC8D4

Nom au cycle 2 : EDC6D4

Nom au cycle 1 : EDC4D4

Basé sur EDC_nD3 (Source : EDC_n_4, EDC_n_5 et EDC_n_7) pour chacune des personnes dans le ménage.

Cette variable dérivée indique le plus haut niveau de scolarité atteint par n'importe quel membre du ménage.

Code	Description	Condition
3	Études postsecondaires partielles	Valeur la plus élevée pour le ménage EDC _n D3=3
4	Diplôme d'études postsecondaires	Valeur la plus élevée pour le ménage EDC _n D3=4
2	Diplôme d'études secondaires	Valeur la plus élevée pour le ménage EDC _n D3=2
1	Moins qu'un diplôme d'études secondaires	Valeur la plus élevée pour le ménage EDC _n D3=1
6	Sans objet	Valeur la plus élevée pour le ménage EDC _n D3=6
9	Non déclaré	Valeur la plus élevée pour le ménage EDC _n D3=9

* L'ordre dans ce tableau indique l'ordre dans lequel les conditions sont vérifiées, chaque condition étant vérifiée seulement lorsque la précédente est fausse.

8.5 Population active des étudiants

Nom au cycle 5 : S.O. (remplacée par LSC2DSWS)
 Nom au cycle 4 : S.O. (remplacée par LSC0DSWS)
 Nom au cycle 3 : EDC8DLF
 Nom au cycle 2 : EDC6DLF
 Nom au cycle 1 : EDC4DLF (anciennement DVEDLF94)

Basé sur EDC_n_1, EDC_n_2, DHC_n_AGE et LFC_nDCWS (Source : LFC8_2, LFC8_61 à LFC8_63, LFC8_51M et LFC8_71M).

Nota : Une erreur qui figurait dans les données de 1994 a été corrigée dans le fichier longitudinal (certains étudiants appartenant au groupe d'âge approprié non repris dans la VD). En outre, les groupes d'âge utilisés dans les variables d'entrée ont changé de 1994 à 1996. En 1994, on a posé les questions sur la fréquentation scolaire au moment de l'enquête aux personnes de 15 à 64 ans et celles sur l'activité aux personnes de 15 ans et plus. En 1996, on a posé les questions sur la fréquentation scolaire au moment de l'enquête aux personnes de 12 ans et plus et celle sur l'activité à celles de 15 à 75 ans. Pour chaque cycle, la variable dérivée est calculée pour les groupes d'âge appropriés.

Code	Description	Condition
1	A travaillé au cours des 12 derniers mois/études à temps plein	EDC _n _1=1 & EDC _n _2=1 & LFC _n DCWS=1 ou 2 ou 4
2	A travaillé au cours des 12 derniers mois/études à temps partiel	EDC _n _1=1 & EDC _n _2=2 & LFC _n DCWS=1 ou 2 ou 4
3	N'a pas travaillé au cours des 12 derniers mois/études à temps plein	EDC _n _1=1 & EDC _n _2=1 & LFC _n DCWS=3
4	N'a pas travaillé au cours des 12 derniers mois/études à temps partiel	EDC _n _1=1 & EDC _n _2=2 & LFC _n DCWS=3
6	Sans objet	EDC _n _1=2 ou EDC _n _1=6 ou LFC _n DCWS=6; DHC _n _AGE=<15 ou >75 et EDC _n _1=2
9	Non déclaré	Autrement

VARIABLES RELATIVES AU NIVEAU DE SCOLARITÉ SUPPRIMÉES :**1. Plus haut niveau de scolarité - 7 niveaux - Groupé**

Nom au cycle 3 : EDC8G7
 Nom au cycle 2 : EDC6G7
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)

2. Plus haut niveau scolaire - 6 niveaux - Groupé

Nom au cycle 3 : EDC8G6
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)

9. VARIABLES GÉOGRAPHIQUES (GE)

Site Web de Statistique Canada : www.statcan.ca/francais/IPS/Data/92F0027XDB.htm

La création de la plupart des variables géographiques dérivées et groupées de 2002 se fonde sur un couplage entre le code postal du lieu de résidence du répondant et le Fichier de conversion des codes postaux (FCCP) de Janvier 2003. Ce dernier contient les codes géographiques types du Recensement de 2001 qui pourraient différer des codes de 1991 utilisés pour les cycles 1 et 2 de l'ENSP, mais sont les mêmes codes que ceux des cycle 3 et cycle 4. Les variables géographiques dérivées ont été produites pour tous les répondants longitudinaux de l'enquête.

Le FCCP permet d'établir la correspondance entre le code postal à six caractères et les unités géographiques types de Statistique Canada (par exemple, division de recensement, subdivision de recensement, circonscription électorale) pour lesquelles des données de recensement et d'autres statistiques sont produites. L'unité géographique type la plus élémentaire du Recensement de 1991 et 1996 est le secteur de dénombrement (SD). Le SD est l'unité géographique dénombrée par un seul recenseur. Toutes les autres unités géographiques types sont des agrégats de SD. Pour les codes géographiques types de Recensement de 2001, l'aire de diffusion (AD) est le plus petit secteur géographique pour lequel un profil de données de recensement est diffusé. Tous les autres couplages géographiques du code postal sont dérivés à partir de l'aire de diffusion.

Le seul indicateur de couplage (en anglais, le « single link indicator », dont l'acronyme est « SLI ») a été utilisé pour établir un rapport unique entre le code postal et l'aire de diffusion ou « block-face ». Par conséquent, le FCCP contient précisément un enregistrement pour chaque combinaison valide de code postal et de SD. On a appliqué la définition du SD du Recensement de 1996 pour exécuter le couplage des données des troisième et quatrième cycles. Pour les premier et deuxième cycles, on a utilisé les définitions des unités géographiques du Recensement de 1991 qui étaient celles disponibles au moment de la création des variables. Pour le cycle 5, on utilise les codes géographiques types de Recensement de 2001.

Étant donné le passage des unités géographiques du Recensement de 1991 à celles du Recensement de 1996, et maintenant à celles du Recensement de 2001, il faut interpréter avec prudence les comparaisons entre cycles des estimations sur lesquelles influent ces variables géographiques dérivées. Les limites des unités géographiques pourraient avoir changé. Par exemple, des régions qui se trouvaient antérieurement à la périphérie d'une région métropolitaine de recensement (RMR) pourraient maintenant être incluses dans la RMR, ou des régions considérées antérieurement comme étant rurales pourraient maintenant être classées comme étant urbaines.

Chaque enregistrement qui figure dans le FCCP de 2003 fournit les codes géographiques qui correspondent à une paire « code postal/AD » spécifique. Quand la région couverte par un code postal recoupe plus d'un AD, le FCCP contient plusieurs enregistrements pour ce code postal en question (le FCCP de 2001 contient 961 624 enregistrements). Pour chaque code postal, le FCCP contient un enregistrement qui est désigné comme étant le meilleur appariement unique et cet enregistrement est celui utilisé pour produire les variables géographiques dérivées de l'ENSP. En général, le meilleur AD unique correspond au AD qui englobe la gamme la plus étendue d'adresses de voirie couvertes par le code postal. Dans certaines régions rurales pour lesquelles on ne dispose d'aucune gamme d'adresses, l'appariement unique correspond au AD qui représente l'emplacement du bureau de poste.

Pour les répondants longitudinaux à l'enquête, le code postal utilisé pour l'appariement au FCCP provient du Registre d'adresses de 2002 qui contient les renseignements les plus à jour existants sur les adresses des répondants au moment de la collecte des données. On a d'abord essayé d'apparier le code postal à six caractères de la liste d'adresses à un code du FCCP. En cas d'échec, on essayait d'apparier en n'utilisant que les cinq premiers caractères, puis sinon avec seulement les quatre premiers, et enfin avec seulement les trois premiers (c'est-à-dire la région de tri d'acheminement ou RTA), en retenant le premier appariement obtenu. Si aucun de ces appariements ne fonctionnait, on essayait d'apparier en utilisant le code postal à six caractères de l'adresse postale, puis sinon avec les cinq premiers caractères, puis les quatre premiers caractères, puis enfin avec la RTA. Dans les cas où aucune de ces procédures ne parvenait à produire un appariement, on

attribuait aux variables géographiques dérivées, y compris le code postal, le code « Non déclaré ». Dans la grande majorité des cas, on a réussi à apparier les six caractères du code postal de l'adresse figurant sur la liste.

Les codes postaux des membres non-répondants du panel longitudinal ont aussi été trouvés dans le Registre d'adresses de 2002, suivant la même méthode expliquée plus haut. Ceci diffère de ce qui a été fait aux cycles 1, 2 et 3 parce que lors de ces cycles, le code postal était extrait des fichiers maîtres de l'année précédente. Il a été décidé au cycle 4 que le Registre d'adresses contiendrait les codes postaux les plus précis (ce qui permettra d'obtenir des ajustements pondérés plus précis pour la non-réponse)

L'étape finale de la production des variables géographiques dérivées pour le cycle 1, le cycle 2 et le cycle 3 consistait à s'assurer que la province dérivée de l'appariement avec les codes du FCCP était la même que celle indiquée pour la variable déjà existante ACTUPRV (dérivée du fichier de collecte). Dans les cas où les valeurs de ces deux variables de province ne concordaient pas, on a fait coïncider la variable de province figurant dans le fichier maître avec ACTUPRV et on a attribué aux variables géographiques dérivées le code « Non déclaré ». Au cycle 4 et cycle 5, ceci n'était pas nécessaire car, ACTUPRV était établi selon la province de résidence ou celle de l'adresse postale provenant du registre d'adresses. Cette province correspond au code postal utilisé pour l'appariement du FCCP afin que les deux variables (ACTUPRV et la province provenant du couplage au FCCP) soient toujours les mêmes.

9.1 Région rurale ou urbaine

Nom au cycle 5 : GE32DURB

Nom au cycle 4 : GE30DURB

Nom au cycle 3 : GE38DURB

Nom au cycle 2 : GE36DURB

Nom au cycle 1 : GE34DURB (*anciennement DVURBA*)

Cette région indique si le SD est une région rurale ou une région urbaine. Les régions urbaines sont les régions bâties continues ayant une concentration démographique d'au moins 1 000 habitants et une densité de population d'au moins 400 habitants par kilomètre carré, d'après les chiffres de population du recensement précédent. Pour être considérée comme continue, la région bâtie doit s'étendre sans discontinuité sur plus de deux kilomètres. Cette définition est utilisée par le FCCP.

Les régions urbaines ou rurales définies ici pourraient ne pas correspondre à celles auxquelles la Société canadienne des postes attribue des codes postaux urbains ou ruraux. Il convient de souligner que la présente définition diffère aussi de celle utilisée pour créer les variables géographiques dérivées de l'ENSP de 1994. Dans le cas des données de 1994, la variable région urbaine/rurale se fondait sur la définition appliquée pour l'Enquête sur la population active à l'extérieur de la province de Québec et pour l'Enquête sociale et de santé au Québec, enquêtes d'après lesquelles a été conçue l'ENSP. Un numéro de « groupe » à deux chiffres a été intégré dans REALUKEY. Si le numéro de « groupe » est compris entre 61 et 98 ou 99 (région éloignée), alors GE34DURB=1 (région rurale). Si le numéro de groupe est égal à tout autre nombre, alors GE34DURB=2 (région urbaine). Dans le cas des ménages contactés par composition aléatoire (CA), GE34DURB=6 (Sans objet) et pour les ménages du Québec, un chiffre du numéro de strate indique s'il s'agit d'un ménage établi en région rurale ou urbaine.

Pour 1996, cette variable était dérivée à partir des valeurs du FCCP. Si la valeur était 0, GE36DURB=1 (région rurale) et si la valeur de FCCP était de 1, GE36DURB=2 (région urbaine). Les utilisateurs du fichier longitudinal observeront peut-être des écarts entre les estimations calculées au niveau de la région urbaine/rurale au moyen des indicateurs de région urbaine/rurale de 1994 et de 1996. Ces écarts pourraient tenir aux changements de définitions plutôt qu'au fait que des personnes ont déménagé.

Pour 1998 et 2000, cette variable était encore dérivée à partir des valeurs du FCCP. Voici les correspondances :

Code	Description	Condition
1	Banlieue rurale	PCCF =3
1	Région rurale hors des RMR/AR	PCCF=5
2	Noyau urbain	PCCF =1
2	Banlieue urbaine	PCCF =2
2	Région urbaine hors des RMR/AR	PCCF =4
9	Non déclaré	Non-apparié au FCCP - pas de code postal

9.2 Division de recensement

Nom au cycle 5 : GE32DCD (basé sur la géographie du recensement de 2001)
 Nom au cycle 4 : GE30DCD (basé sur la géographie du recensement de 1996)
 Nom au cycle 3 : GE38DCD (basé sur la géographie du recensement de 1996)
 Nom au cycle 2 : GE36DCD (basé sur la géographie du recensement de 1991)
 Nom au cycle 1 : GE34DCD (basé sur la géographie du recensement de 1991) (*anciennement DVDA*)

La division de recensement désigne les régions géographiques établies en vertu des lois provinciales intermédiaires qui sont entre la subdivision de recensement et la province (p. ex. divisions, comtés, districts régionaux, municipalités régionales et sept autres catégories de régions géographiques formées de groupes de subdivisions de recensement). Les lois provinciales de Terre-Neuve, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta ne prévoient pas la création de ces régions administratives. Par conséquent, les divisions de recensement ont été établies par Statistique Canada en collaboration avec ces provinces.

9.3 Subdivision de recensement

Nom au cycle 5 : GE32DCSD (basé sur la géographie du recensement de 2001)
 Nom au cycle 4 : GE30DCSD (basé sur la géographie du recensement de 1996)
 Nom au cycle 3 : GE38DCSD (basé sur la géographie du recensement de 1996)
 Nom au cycle 2 : GE36DCSD (basé sur la géographie du recensement de 1991)
 Nom au cycle 1 : GE34DCSD (basé sur la géographie du recensement de 1991) (*anciennement DVCSA*)

Une subdivision de recensement est le terme générique qui désigne les municipalités (telles que définies par les lois provinciales) ou leurs équivalents (p. ex. les réserves indiennes, les établissements indiens et les territoires non organisés). À Terre-Neuve, en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique, ce terme désigne également les régions géographiques créées par Statistique Canada en collaboration avec les provinces et qui correspondent à des municipalités.

9.4 Région métropolitaine du recensement

Nom au cycle 5 : GE32DCMA (basé sur la géographie du recensement de 2001)
 Nom au cycle 4 : GE30DCMA (basé sur la géographie du recensement de 1996)
 Nom au cycle 3 : GE38DCMA (basé sur la géographie du recensement de 1996)
 Nom au cycle 2 : GE36DCMA (basé sur la géographie du recensement de 1991)
 Nom au cycle 1 : GE34DCMA (basé sur la géographie du recensement de 1991) (*anciennement DVCMAA*)

Le concept général d'une région métropolitaine de recensement (RMR) est celui d'une très grande région urbaine à laquelle sont rattachées des régions urbaines et rurales adjacentes dont le degré d'intégration économique et sociale avec ce noyau urbain est élevé. Une RMR circonscrit une région urbaine (appelée noyau urbain dont la population compte au moins 100 000 habitants, d'après le recensement précédent). Selon le recensement de 1996, il y a 25 RMR.

000 = Aucune RMR assignée
 001 = St. John's
 205 = Halifax
 310 = Saint John
 408 = Saguenay (Chicoutimi pour la géographie du recensement de 1996)
 421 = Québec
 433 = Sherbrooke
 442 = Trois-Rivières
 462 = Montréal
 505 = Ottawa/Gatineau (Ottawa/Hull pour la géographie du recensement de 1996)
 532 = Oshawa
 535 = Toronto
 537 = Hamilton
 539 = St. Catharines
 541 = Kitchener
 555 = London
 559 = Windsor
 580 = Sudbury
 595 = Thunder Bay
 602 = Winnipeg
 705 = Régina
 725 = Saskatoon
 825 = Calgary
 835 = Edmonton
 933 = Vancouver
 935 = Victoria
 996 = Sans objet
 999 = Non déclaré

9.5 Circonscriptions électorales fédérales

Nom au cycle 5 : GE32DFED (basé sur la géographie du recensement de 2001)
 Nom au cycle 4 : GE30DFED (basé sur la géographie du recensement de 1996)
 Nom au cycle 3 : GE38DFED (basé sur la géographie du recensement de 1996)
 Nom au cycle 2 : GE36DFED (basé sur la géographie du recensement de 1991)
 Nom au cycle 1 : GE34DFED (basé sur la géographie du recensement de 1991) (*anciennement DVFEDA*)

Une circonscription électorale fédérale est un endroit ou un territoire pour lequel les habitants sont en droit d'élire un député à la Chambre des communes (source : *Loi électorale du Canada*, 1990). Selon l'Ordonnance de représentation de 1987, il y a 295 CEF au Canada. La variable CEF doit être utilisée de concert avec une variable provinciale (PRC_n_CUR) afin de définir une région géographique.

9.6 Régions sanitaires

Nom au cycle 5 : S.O.
 Nom au cycle 4 : S.O.
 Nom au cycle 3 : S.O.
 Nom au cycle 2 : GE36DHLLR
 Nom au cycle 1 : GE34DHLLR (*anciennement DVHLRGA*)

Au cycle 1 (1994), le code de région sanitaire comportait deux chiffres. Suit la liste des concordances entre le code de région sanitaire et le nom de la province pour 1994 :

Ontario
 51 = Est
 52 = Centre-Est
 53 = Centre-Ouest

54 = Sud-Ouest
55 = Nord-Est et Nord-Ouest

Manitoba

61 = Centre
62 = Eastman
63 = Interlake
64 = Norman et Thompson
65 = Parklands
67 = Westman
68 = Winnipeg

Colombie-Britannique

18 = Intérieur-Nord (Prince George)
96 = Sans objet

Au cycle 2 (1996), cette variable est la même que GE36DHRO pour le Manitoba et l'Alberta. Pour l'Ontario, la définition des limites des régions sanitaires a été modifiée légèrement par rapport à celle établie lors de l'élaboration du plan de sondage et cette variable reflète les nouvelles limites.

Ontario

3511 = Ottawa-Carleton
3512 = Prescott, Russell, Stormont, Dundas, Glengarry, Renfrew
3513 = Lanark, Leeds, Grenville, Hastings, Prince Edward, Frontenac, Lennox & Addington
3521 = Northumberland, Victoria, Haliburton, Peterborough
3522 = Durham
3523 = Peel
3524 = Métro Toronto
3525 = York
3526 = Simcoe
3527 = Halton
3531 = Niagara
3532 = Hamilton-Wentworth
3533 = Brant, Haldiman, Norfolk
3534 = Wellington, Dufferin
3536 = Waterloo
3541 = Essex
3542 = Lambton, Kent
3543 = Elgin, Middlesex, Oxford
3544 = Bruce, Grey, Perth, Huron
3551 = Algoma, Cochrane
3552 = Manitoulin, Sudbury
3553 = Timiskaming, Muskoka, Parry Sound, Nipissing
3561 = Thunder Bay, Kenora, Rainy River

Manitoba

4601 = Westman Sud
4602 = Central
4603 = Eastman Sud
4604 = Brandon
4605 = Winnipeg
4606 = Eastman Nord
4607 = Marquette
4608 = Parklands
4609 = Interlake
4610 = Norman

4611 = Burntwood

Alberta

4801 = Fort McLeod
 4802 = Medicine Hat
 4803 = Canmore
 4804 = Calgary
 4805 = Drumheller
 4806 = Red Deer
 4807 = Vermillion
 4808 = Hinton
 4809 = Breton
 4810 = Edmonton
 4811 = Athabasca
 4812 = Cold Lake
 4813 = Grand Prairie
 4814 = Peace River
 4815 = Slave Lake
 4816 = Fort McMurray
 4817 = Fort Vermillion
 9996 = Sans objet

9.7 Régions sanitaires (échantillon original)

Nom au cycle 5 : S.O.

Nom au cycle 4 : S.O.

Nom au cycle 3 : S.O.

Nom au cycle 2 : GE36DHRO

Nom au cycle 1 : S.O.

Pour les provinces qui ont acheté des unités d'échantillonnage supplémentaires (Ontario, Manitoba et Alberta), cette variable désigne les régions sanitaires infraprovinciales telles que définies par les ministères provinciaux de la Santé. En Ontario, les régions sanitaires correspondent à un comté ou à une division de recensement. L'Ontario compte 23 régions sanitaires originales déclarées ici, tandis que le Manitoba et l'Alberta comptent, l'un et l'autre, cinq régions sanitaires groupées (soit en tout 33 régions sanitaires).

Ontario

3511 = Ottawa-Carleton
 3512 = Lanark, Leeds, Grenville, Prescott-Russell, Stormont, Dundas, Glengarry
 3513 = Hastings, Prince Edward, Frontenac, Lennox, Addington, Renfrew
 3521 = Northumberland, Victoria, Haliburton, Peterborough
 3522 = Durham
 3523 = Peel
 3524 = Métro Toronto
 3525 = York
 3526 = Simcoe
 3531 = Niagara
 3532 = Hamilton-Wentworth
 3533 = Brant, Haldiman, Norfolk
 3534 = Wellington, Dufferin
 3535 = Halton
 3536 = Waterloo
 3541 = Essex
 3542 = Lambton, Kent
 3543 = Elgin, Middlesex, Oxford
 3544 = Bruce, Grey, Perth, Huron

3551 = Algoma, Cochrane
3552 = Manitoulin, Sudbury
3553 = Timiskaming, Muskoka, Parry Sound, Nipissing
3561 = Thunder Bay, Kenora, Rainy River

Manitoba

4601 = Westman Sud
4602 = Centre
4603 = Eastman Sud
4604 = Brandon
4605 = Winnipeg
4606 = Eastman Nord
4607 = Marquette
4608 = Parklands
4609 = Interlake
4610 = Norman
4611 = Burntwood

Alberta

4801 = Fort McLeod
4802 = Medicine Hat
4803 = Canmore
4804 = Calgary
4805 = Drumheller
4806 = Red Deer
4807 = Vermillion
4808 = Hinton
4809 = Breton
4810 = Edmonton
4811 = Athabasca
4812 = Cold Lake
4813 = Grand Prairie
4814 = Peace River
4815 = Slave Lake
4816 = Fort McMurray
4817 = Fort Vermillion
9996 = Sans objet

9.8 Code postal

Nom au cycle 5 : SP32DPC
Nom au cycle 4 : SP30DPC
Nom au cycle 3 : SP38DPC
Nom au cycle 2 : SP36DPC
Nom au cycle 1 : SP34DPC (*anciennement DVPCA*)

Le code postal est un code alphanumérique à six caractères défini et tenu à jour par la Société canadienne des postes aux fins du traitement du courrier. Les caractères alphanumériques sont disposés selon la forme ANA NAN, où « A » représente une lettre de l'alphabet et « N », un chiffre. Le premier caractère d'un code postal (attribué par ordre alphabétique d'Est en Ouest, d'une côte à l'autre du Canada) représente une province ou un territoire, ou un secteur important compris entièrement dans une province.

Pour le cycle 5, le fichier de conversion des codes postaux a été utilisé pour faire l'appariement au FCCP pour dériver les autres variables géographiques. Au cycle 4, le code postal de 2000 et au cycle 3, le code postal de 1998 sont utilisés pour l'appariement avec le FCCP. Les détails sont fournis plus haut dans le cadre de la documentation générale sur les variables géographiques.

Au cycle 2, la version de 1996 du code postal est fondée sur l'adresse où le répondant vivait à ce moment-là.

Au cycle 1, l'adresse postale du répondant figurait dans les fichiers maîtres. Par conséquent, les écarts entre les codes postaux de 1994 (SP34DPC) et de 1996 n'indiquent pas nécessairement qu'un répondant a déménagé entre 1994 et 1996.

VARIABLES GÉOGRAPHIQUES SUPPRIMÉES :

1. Région métropolitaine de recensement de 1991 - Groupé

Nom au cycle 3 : GE38GCMA

Nom au cycle 2 : GE36GCMA

Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)

2. Régions sanitaires - 26 Groupes - Groupé

Nom au cycle 2 : GE36GHLR

Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)

3. Régions sanitaires - 33 Groupes - Groupé

Nom au cycle 2 : GE36GHR0

Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)

4. Région rurale ou urbaine - Groupé

Nom au cycle 3 : GE38GURB

Nom au cycle 2 : GE36GURB

Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)

5. Le répondant a déménagé

Nom au cycle 2 : GE36LMOV

Raison : Information insuffisante pour calculer

10. ÉTAT DE SANTÉ GÉNÉRAL (GH)**10.1 Indice de la description de la santé.**

Nom au cycle 5 : GHC2DHDI

Nom au cycle 4 : GHC0DHDI

Nom au cycle 3 : GHC8DHDI

Nom au cycle 2 : GHC6DHDI

Nom au cycle 1 : GHC4DHDI (*anciennement DVGHI94*)Basé sur $GHCn_1$.

Cette variable dérivée décrit l'état de santé du répondant d'après son propre jugement.

Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé.

Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de $GHCn_1$ en commençant à « 0 ».

Code	Description	Condition
0	Mauvaise	$GHCn_1=5$
1	Passable	$GHCn_1=4$
2	Bonne	$GHCn_1=3$
3	Très bonne	$GHCn_1=2$
4	Excellente	$GHCn_1=1$
6	Sans objet	$GHCn_1=6$
9	Non déclaré	$GHCn_1>6$

VARIABLES RELATIVES À L'ÉTAT DE SANTÉ EN GÉNÉRAL SUPPRIMÉES :**1. A eu recours aux services / médecin ou sage-femme - Groupé**

Nom au cycle 3 : GHC8G23

Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)

11. UTILISATION DES SOINS DE SANTÉ (HC)**11.1 Consultations avec des professionnels de la santé**

Nom au cycle 5 : HCC2DHPC
 Nom au cycle 4 : HCC0DHPC
 Nom au cycle 3 : HCC8DHPC
 Nom au cycle 2 : HCC6DHPC
 Nom au cycle 1 : HCC4DHPC (*anciennement DVHPCN94*)

Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991)

Site Web de Statistique Canada: www.statcan.ca/francais/sdds/3894_f.htm

Basé sur HCCn_2A à HCCn_2J.

Cette variable dérivée indique si le répondant a consulté ou non des professionnels de la santé au cours des 12 derniers mois.

Code	Description	Condition
1	Oui	Toute valeur de HCCn_2A à HCCn_2J est >0 et <996 ou 96
2	Non	HCCn_2A à HCCn_2J=0
6	Sans objet	HCCn_2A à HCCn_2J=996 ou 96
9	Non déclaré	HCCn_2A à HCCn_2C>996 ou 96

11.2 Indicateur pour toute utilisation de service de soins de santé

Nom au cycle 5 : HCC2F1
 Nom au cycle 4 : HCC0F1
 Nom au cycle 3 : HCC8F1
 Nom au cycle 2 : HCC6F1
 Nom au cycle 1 : S.O.

Basé sur HCCn_1 et HCCn_2A à HCCn_2J.

Nota : Cette variable est aussi calculée au cycle 2 (1996) pour les questions pour lesquelles l'Alberta a acheté des unités supplémentaires d'échantillonnage.

Code	Description	Condition
1	Oui	HCCn_1=1 ou (une réponse parmi HCCn_2A à HCCn_2J est >0 et <996)
2	Non	HCCn_1=2 et HCCn_2A à HCCn_2J=0
6	Sans objet	HCCn_1=6
9	Non déclaré	Toute autre condition

11.3 Raison pour chercher des soins aux États-Unis - Réponse élaborée recueillie

Nom au cycle 5 : S.O
 Nom au cycle 4 : S.O
 Nom au cycle 3 : HCC8F13
 Nom au cycle 2 : S.O.
 Nom au cycle 1 : S.O.

Basé sur HCCn_12.

Code	Description	Condition
1	Oui	HCCn_12=1
6	Sans objet	HCCn_12=2 ou HCCn_12=6
9	Non déclaré	HCCn_12=9

11.4 Raison pour ne recevoir aucun soin - Réponse élaborée recueillie

Nom au cycle 5 : S.O.
 Nom au cycle 4 : S.O.
 Nom au cycle 3 : S.O.
 Nom au cycle 2 : S.O.
 Nom au cycle 1 : HCC4F7W

Au cycle 1 uniquement, on a recueilli de longues réponses que l'on a codées manuellement de façon à les classer. Pour le cycle 2 et suivants, la question a été remaniée de façon à allonger la liste des catégories et à « choisir toutes les réponses appropriées ».

11.5 Raison pour ne recevoir aucun soin - Groupé

Nom au cycle 5 : S.O.
 Nom au cycle 4 : S.O.
 Nom au cycle 3 : S.O.
 Nom au cycle 2 : S.O.
 Nom au cycle 1 : HCC4G7

Au cycle 1 uniquement, on a recueilli de longues réponses que l'on a codées manuellement de façon à les classer. Pour le cycle 2 et suivants, la question a été remaniée de façon à allonger la liste des catégories et à « choisir toutes les réponses appropriées ».

11.6 Genre de soins reçus à domicile - Réponse élaborée recueillie

Nom au cycle 5 : S.O.
 Nom au cycle 4 : S.O.
 Nom au cycle 3 : S.O.
 Nom au cycle 2 : S.O.
 Nom au cycle 1 : HCC4FS

Au cycle 1 uniquement, on a recueilli de longues réponses que l'on a codées manuellement de façon à les classer. Pour les cycles 2 et suivants, la question a été remaniée de façon à allonger la liste des catégories et à « choisir toutes les réponses appropriées ».

11.7 Nombre de consultations avec des médecins

Nom au cycle 5 : HCC2DMDC
 Nom au cycle 4 : HCC0DMDC
 Nom au cycle 3 : HCC8DMDC
 Nom au cycle 2 : HCC6DMDC
 Nom au cycle 1 : HCC4DMDC (anciennement DVMDCN94)

Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991)

Site Web de Statistique Canada: www.statcan.ca/francais/sdds/3894_f.htm

Basé sur la somme de HCCn_2A et HCCn_2C.

Cette variable dérivée donne le nombre de consultations avec un médecin de famille, un pédiatre, un omnipraticien ou tout autre médecin.

Code	Description	Condition
0-666	Nombre de consultations	Somme de (HCCn_2A>=0 et <=366) et (HCCn_2C>=0 et <=300)
996	Sans objet	HCCn_2A et HCCn_2C=996
999	Non déclaré	HCCn_2A ou HCCn_2C>996

VARIABLES RELATIVES À L'UTILISATION DES SOINS DE SANTÉ SUPPRIMÉES :

1. **Nombre de nuit comme patient - Groupé**
 Nom au cycle 3 : HCC8G1A
 Nom au cycle 2 : HCC6G1A
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)
2. **Nombre de consultations - médecin / omnipraticien - Groupé**
 Nom au cycle 3 : HCC8G2A
 Nom au cycle 2 : HCC6G2A
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)
3. **Nombre de consultations - spécialiste de la vue - Groupé**
 Nom au cycle 3 : HCC8G2B
 Nom au cycle 2 : HCC6G2B
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)
4. **Nombre de consultations - autre médecin - Groupé**
 Nom au cycle 3 : HCC8G2C
 Nom au cycle 2 : HCC6G2C
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)
5. **Nombre de consultations - infirmière - Groupé**
 Nom au cycle 3 : HCC8G2D
 Nom au cycle 2 : HCC6G2D
Raison Variable regroupée (FMGD seulement)
6. **Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste - Groupé**
 Nom au cycle 3 : HCC8G2E
 Nom au cycle 2 : HCC6G2E
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)
7. **Nombre de consultations - chiropraticien - Groupé**
 Nom au cycle 3 : HCC8G2F
 Nom au cycle 2 : HCC6G2F
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)
8. **Nombre de consultations - physiothérapeute - Groupé**
 Nom au cycle 3 : HCC8G2G
 Nom au cycle 2 : HCC6G2G
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)

9. **Nombre de consultations - travailleur social / conseiller - Groupé**
Nom au cycle 3 : HCC8G2H
Nom au cycle 2 : HCC6G2H
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)
10. **Nombre de consultations - psychologue - Groupé**
Nom au cycle 3 : HCC8G2I
Nom au cycle 2 : HCC6G2I
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)
11. **Nombre de consultations - orthophoniste / audiologiste / ergothérapeute - Groupé**
Nom au cycle 3 : HCC8G2J
Nom au cycle 2 : HCC6G2J
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)
12. **Plus récente consultation - médecin de famille - Groupé**
Nom au cycle 3 : HCC8G3A
Nom au cycle 2 : HCC6G3A
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)
13. **Plus récente consultation - autre médecin - Groupé**
Nom au cycle 3 : HCC8G3C
Nom au cycle 2 : HCC6G3C
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)
14. **Soins de santé alternatifs - autre - Groupé**
Nom au cycle 3 : HCC8G5L
Nom au cycle 2 : HCC6G5L
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)
15. **Nombre de consultations avec des médecins - Groupé**
Nom au cycle 3 : HCC8GMDC
Nom au cycle 2 : HCC6GMDC
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)

12. ÉTAT DE SANTÉ (HS)

12.1 Indice de l'état de santé (HUI3)

Nom au cycle 5 : HSC2DHSI

Nom au cycle 4 : HSC0DHSI

Nom au cycle 3 : HSC8DHSI

Nom au cycle 2 : HSC6DHSI

Nom au cycle 1 : HSC4DHSI (*anciennement DVHST94*)

Source : Université McMaster

Site Internet : Université McMaster : www.fhs.mcmaster.ca/hug/update.htm,
www.fhs.mcmaster.ca/hug/wp9811.htm, www.healthutilities.com/hui3.htm

Basé sur HSC_n_1 à HSC_n_28 et HSC_n_30.

L'indice composite est fondé sur les questions de la section sur l'état de santé

L'état de santé est d'autant meilleur que la valeur de l'indice est élevée.

De -0,360 à 1,000 par augmentation de 0,001

9,996 Sans objet

9,999 Non déclaré

L'indice de l'état de santé (IES) est un indice générique permettant de synthétiser les aspects quantitatifs et qualitatifs de la santé. L'indice, mis au point par le *Centre for Health Economics and Policy Analysis* de l'Université McMaster, se fonde sur le *Comprehensive Health Status Measurement System (CHSMS)*. Il donne une idée de la santé fonctionnelle globale d'une personne, fondée sur huit attributs, à savoir la vision, l'ouïe, l'élocution, la mobilité (capacité de se déplacer), la dextérité (usage des mains et des doigts), la cognition (mémoire et pensée), l'émotion (sentiments), ainsi que la douleur et les malaises.

En plus de décrire les niveaux de l'état de santé fonctionnel, le CHSMS sert de fondement à l'IES3 (*HUI3* en anglais). L'IES3 est une valeur numérique unique pour toute combinaison possible de niveaux de ces huit attributs de la santé auto-déclarés. L'IES3 permet de représenter n'importe quel vecteur des niveaux des huit attributs de la santé par une valeur sommaire comprise entre -0,360 et 1. Par exemple, une personne qui ne voit pas de près, mais qui est en parfaite santé d'après les sept autres attributs, reçoit une cote de 0,973. Sur cette échelle, le niveau de santé le plus souhaitable (santé parfaite) reçoit une cote de 1,000 et le décès reçoit une cote de 0,000; les cotes négatives reflètent des états de santé considérés comme étant pires que le décès.

Les cotes de l'IES3 traduisent les opinions de la société concernant l'état de santé. Ces opinions sont appelées « préférences sociétales » puisque les préférences concernant divers états de santé sont enregistrées auprès d'un échantillon représentatif de la population.

L'IES3 (*HUI3*), qui a été mis au point par le *Centre for Health Economics and Policy Analysis* de l'Université McMaster, était calculé d'après les données sur les préférences sociétales recueillies auprès d'un échantillon aléatoire de 500 personnes vivant dans les limites de la ville de Hamilton, sélectionnées d'après une liste fournie par le service de planification de la municipalité régionale d'Hamilton-Wentworth (Ontario), Canada.

L'algorithme permettant d'établir la concordance entre les questions et le CHSMS proprement dit est la propriété de Health Utilities Inc. et est couvert par des droits d'auteur. Statistique Canada a l'autorisation, si la demande lui en est faite, de communiquer cet algorithme aux utilisateurs de données qui souhaitent reproduire les résultats ou les analyses de Statistique Canada. L'utilisation de l'algorithme à d'autres fins ou sa communication à des tiers est interdite.

Pour une explication détaillée du calcul de l'IES3, consulter :

Furlong WJ, Feeny DH, Torrance GW. « Health Utilities Index (HUI): Algorithm for determining HUI Mark 2 (HUI2)/Mark 3 (HUI3) health status classification levels, health states, health-related quality of life utility scores and single-attribute utility score from 40-item interviewer-administered health status questionnaires ». Dundas, Canada: Health Utilities Inc. février 1999.

Furlong WJ, Feeny DH, Torrance GW, et al. « Multiplicative multi-attribute utility function for the Health Utilities Index Mark 3 (HUI3) system: a technical report » Hamilton, Canada: McMaster University Centre for Health Economics and Policy Analysis Working Paper #98-11, décembre 1998.

Nota : Pour les cycles 1 et 2, l'IES [HUI] était calculé d'après les cotes de préférences sociétales MARK II et un algorithme provisoire avait été développé. Après l'élaboration de l'IES3, les variables des cycles 1 et 2 ont été recalculées d'après le nouvel indice pour le fichier longitudinal. Pour l'IES2, les préférences sociétales ont été dérivées à partir d'une étude à petite échelle sur le cancer chez l'enfant. Cet indice provisoire est utilisé avec d'autres enquêtes, avec quelques ajustements (p. ex. l'Enquête sur la santé en Ontario). Par conséquent, les résultats de l'IES2 étaient provisoires, mais pertinents. L'évaluation de la cohérence de cet antécédent du CHSMS a indiqué qu'il fournissait une évaluation raisonnable de l'état de santé individuel.

Pour une explication détaillée du calcul de l'IES2, consulter :

Berthelot J-M, Roberge R, Wolfson MC. « The calculation of health-adjusted life expectancy for a Canadian province using a multi-attribute utility function: a first attempt ». Montpellier, France: Colloque *Inserm/John Libbey Eurotext Ltd*, 1993 :161-72.

Roberge R, Berthelot J-M, et Wolfson MC. « Mesurer les écarts dans l'état de santé en Ontario, selon la situation socio-économique », *Rapports sur la santé*, Statistique Canada, n° 82-003 au catalogue, Volume 7, numéro 2, 1995: 25-32.

12.2 Problème de vision - Code fonctionnel

Nom au cycle 5 : HSC2DVIS

Nom au cycle 4 : HSC0DVIS

Nom au cycle 3 : HSC8DVIS

Nom au cycle 2 : HSC6DVIS

Nom au cycle 1 : HSC4DVIS (*anciennement DVVISF94*)

Basé sur DVVIS* = HSC_{n_1} || HSC_{n_2} || HSC_{n_3} || HSC_{n_4} || HSC_{n_5}.

(* DVVIS enchaîne toutes les valeurs des items individuels).

Nota : Exemple d'enchaînement : Si HSC_{n_1}=2, HSC_{n_2}=1, HSC_{n_3}=6, HSC_{n_4}=1, HSC_{n_5}=6 alors l'état devient 21616 et la valeur de HSC_n DVVIS est 2.

Cette variable dérivée permet de classer le répondant selon sa vision.

Code	Description	Condition
1	Aucun problème visuel	DVVIS=16616
2	Problème corrigé par des verres	DVVIS=16621, 21616, 21621
3	Problème pour voir à distance - non corrigé	DVVIS=16622, 21622
4	Problème pour voir de près - non corrigé	DVVIS=22116, 22121
5	Problème pour voir à distance et de près - non corrigé	DVVIS=22122
6	Ne peut pas voir du tout	DVVIS=22266
96	Sans objet	DVVIS=66666
99	Non déclaré	Autrement

12.3 Problème de l'ouïe - Code fonctionnel

Nom au cycle 5 : HSC2DHER

Nom au cycle 4 : HSC0DHER

Nom au cycle 3 : HSC8DHER

Nom au cycle 2 : HSC6DHER

Nom au cycle 1 : HSC4DHER (*anciennement DVHEAF94*)

Basé sur DVHEA* = HSCn_6 || HSCn_7 || HSCn_7A || HSCn_8 || HSCn_9.

(* DVHEA enchaîne toutes les valeurs des items individuels).

Cette variable dérivée permet de classer le répondant selon son ouïe.

Code	Description	Condition
1	Aucun problème d'ouïe	DVHEA=16666
2	Problème d'ouïe, en groupe - corrigé	DVHEA=21616
3	Problème d'ouïe, en groupe et individuellement - corrigé	DVHEA=21621, 21622
4	Problème d'ouïe, en groupe - non corrigé	DVHEA=22116
5	Problème d'ouïe, en groupe et individuellement - corrigé pour conversation individuelle	DVHEA=22121
6	Ne peut pas entendre	DVHEA=22122, 22266
96	Sans objet	DVHEA=66666
99	Non déclaré	Autrement

12.4 Problème d'élocution - Code fonctionnel

Nom au cycle 5 : HSC2DSPE

Nom au cycle 4 : HSC0DSPE

Nom au cycle 3 : HSC8DSPE

Nom au cycle 2 : HSC6DSPE

Nom au cycle 1 : HSC4DSPE (*anciennement DVSPF94*)

Basé sur DVSPPE* = HSCn_10 || HSCn_11 || HSCn_12 || HSCn_13.

(* DVSPPE enchaîne toutes les valeurs des items individuels).

Cette variable dérivée permet de classer le répondant selon son élocution.

Code	Description	Condition
1	Aucun problème d'élocution	DVSPE=1666
2	Partiellement compris par des inconnus	DVSPE=2116
3	Partiellement compris par des amis	DVSPE=2121
4	Incompris par des inconnus	DVSPE=2216, 2221
5	Incompris par des amis	DVSPE=2122, 2222
6	Sans objet	DVSPE=6666
9	Non déclaré	Autrement

12.5 Problème de mobilité - Code fonctionnel

Nom au cycle 5 : HSC2DMOB

Nom au cycle 4 : HSC0DMOB

Nom au cycle 3 : HSC8DMOB

Nom au cycle 2 : HSC6DMOB

Nom au cycle 1 : HSC4DMOB (*anciennement DVMOBF94*)

Basé sur DVMOB* = HSCn_14 || HSCn_15 || HSCn_16 || HSCn_17 || HSCn_18.

(* DVMOB enchaîne toutes les valeurs des items individuels).

Cette variable dérivée permet de classer le répondant selon sa mobilité.

Code	Description	Condition
1	Aucun problème de mobilité	DVMOB=16666
2	Problème - aucune aide nécessaire	DVMOB=21222
3	Problème - besoin d'un appareil	DVMOB=21122
4	Problème - besoin d'un fauteuil roulant	DVMOB=21121, 21221
5	Problème - besoin de l'aide d'une autre personne	DVMOB=21111, 21112, 21211, 21212
6	Ne peut pas marcher	DVMOB=22661, 22662
96	Sans objet	DVMOB=66666
99	Non déclaré	Autrement

12.6 Problème de dextérité - Code fonctionnel

Nom au cycle 5 : HSC2DDEX

Nom au cycle 4 : HSC0DDEX

Nom au cycle 3 : HSC8DDEX

Nom au cycle 2 : HSC6DDEX

Nom au cycle 1 : HSC4DDEX (*anciennement DVDEXF94*)

Basé sur DVDEX* = HSCn_21 || HSCn_22 || HSCn_23 || HSCn_24.

(* DVDEX enchaîne toutes les valeurs des items individuels).

Cette variable dérivée permet de classer le répondant selon sa dextérité.

Code	Description	Condition
1	Aucun problème de dextérité	DVDEX=1666
2	Problème de dextérité - ne nécessite aucune aide	DVDEX=2262
3	Problème de dextérité - besoin d'équipement spécial	DVDEX=2261
4	Problème de dextérité - besoin d'aide pour exécuter certaines tâches	DVDEX=2111, 2112
5	Problème de dextérité - besoin d'aide pour la plupart des tâches	DVDEX=2121, 2122, 2131, 2132
6	Problème de dextérité - besoin d'aide pour toutes les tâches	DVDEX=2141, 2142
96	Sans objet	DVDEX=6666
99	Non déclaré	Autrement

12.7 Problème émotif - Code fonctionnel

Nom au cycle 5 : HSC2DEMO

Nom au cycle 4 : HSC0DEMO

Nom au cycle 3 : HSC8DEMO

Nom au cycle 2 : HSC6DEMO

Nom au cycle 1 : HSC4DEMO (*anciennement DVEMOF94*)

Basé sur HSC_n_25.

Cette variable dérivée permet de classer le répondant selon son état émotionnel.

Code	Description	Condition
1	Heureux(se) et intéressé(e) à vivre	HSC _n _25=1
2	Plutôt heureux(se)	HSC _n _25=2
3	Plutôt malheureux(se)	HSC _n _25=3
4	Très malheureux(se)	HSC _n _25=4
5	Si malheureux(se) que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue	HSC _n _25=5
6	Sans objet	HSC _n _25=6
9	Non déclaré	Autrement

12.8 Problème de cognition - Code fonctionnel

Nom au cycle 5 : HSC2DCOG

Nom au cycle 4 : HSC0DCOG

Nom au cycle 3 : HSC8DCOG

Nom au cycle 2 : HSC6DCOG

Nom au cycle 1 : HSC4DCOG (*anciennement DVCOGF94*)

Basé sur DVCOG* = HSC_n_26 || HSC_n_27.

(* DVCOG enchaîne toutes les valeurs des items individuels).

Cette variable dérivée permet de classer le répondant selon sa cognition.

Code	Description	Condition
1	Aucun problème de cognition	DVCOG=11
2	Éprouve un peu de difficulté à penser	DVCOG=12, 13
3	Plutôt porté(e) à oublier des choses	DVCOG=21
4	Plutôt porté(e) à oublier des choses/un peu de difficulté à penser	DVCOG=22, 23
5	Très porté(e) à oublier des choses/beaucoup de difficulté à penser	DVCOG=14, 24, 31, 32, 33, 34
6	Incapable de se rappeler ou de penser	DVCOG=15, 25, 35, 41, 42, 43, 44, 45
96	Sans objet	DVCOG=66
99	Non déclaré	Autrement

12.9 Activités empêchées par la douleur - Code fonctionnel

Nom au cycle 5 : HSC2DPAD

Nom au cycle 4 : HSC0DPAD

Nom au cycle 3 : HSC8DPAD

Nom au cycle 2 : HSC6DPAD

Nom au cycle 1 : HSC4DPAD (*anciennement DVPAAF94*)

Basé sur DVPAIN* = HSC n _28 || HSC n _30.

(* DVPAIN enchaîne toutes les valeurs des items individuels).

Cette variable dérivée permet de classer le répondant en fonction des activités qu'il a du mal à faire en raison de la douleur ou de malaises.

Code	Description	Condition
1	Aucune douleur ou malaise	DVPAIN=16
2	Douleur n'empêche aucune activité	DVPAIN=21
3	Douleur empêche quelques activités	DVPAIN=22
4	Douleur empêche plusieurs activités	DVPAIN=23
5	Douleur empêche la plupart des activités	DVPAIN=24
6	Sans objet	DVPAIN=66
9	Non déclaré	Autrement

Nota : Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable.

VARIABLES RELATIVES À L'ÉTAT DE SANTÉ SUPPRIMÉES :

1. **Problème de vision - Code fonctionnel - Groupé**
Nom au cycle 3 : HSC8GVIS
Nom au cycle 2 : HSC6GVIS
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)
2. **Problème de l'ouïe - Code fonctionnel - Groupé**
Nom au cycle 3 : HSC8GHER
Nom au cycle 2 : HSC6GHER
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)
3. **Problème de l'élocution - Code fonctionnel - Groupé**
Nom au cycle 3 : HSC8GSPE
Nom au cycle 2 : HSC6GSPE
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)
4. **Problème de mobilité - Code fonctionnel - Groupé**
Nom au cycle 3 : HSC8GMOB
Nom au cycle 2 : HSC6GMOB
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)
5. **Problème de dextérité - Code fonctionnel - Groupé**
Nom au cycle 3 : HSC8GDEX
Nom au cycle 2 : HSC6GDEX
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)
6. **Problème de cognition - Code fonctionnel - Groupé**
Nom au cycle 3 : HSC8GCOG
Nom au cycle 2 : HSC6GCOG
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)
7. **Intensité de la douleur - Code fonctionnel**
Nom au cycle 2 : HSC6DSEV
Nom au cycle 1 : HSC4DSEV
Raison : N'est pas utilisée dans le calcul de HUI (voir HSCnDPAD)

13. TAILLE ET POIDS (HW)

13.1 Indice de la masse corporelle

Nom au cycle 5 : HWC2DBMI

Nom au cycle 4 : HWC0DBMI

Nom au cycle 3 : HWC8DBMI

Nom au cycle 2 : HWC6DBMI

Nom au cycle 1 : HWC4DBMI (*anciennement DVBMI94*)

Basé sur HWC_n_HT, HWC_n_3KG et PHC_n_4B (*anciennement HWC_n_1*).

L'indice de la masse corporelle (IMC) constitue une méthode rapide et exacte pour déterminer le risque pour la santé puisqu'il se rapporte au poids et à la taille corporels. Il est calculé pour les personnes de 18* à 64 ans, **sauf** pour les femmes enceintes. On ne calcule pas l'IMC pour toute personne mesurant moins de 0,914 mètre (3 pieds) ou plus de 2,108 mètres (7 pieds).

IMC = POIDS (KG) / CARRÉ DE LA TAILLE (EN MÈTRES)

*Nota : En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002), l'IMC a été recalculé pour toutes les personnes âgées de 18 et 19 ans, et rétroactivement pour tous les cycles précédents.

13.2 Poids standard – Standard International

Nom au cycle 5 : HWC2DISW

Nom au cycle 4 : HWC0DISW

Nom au cycle 3 : HWC8DISW

Nom au cycle 2 : HWC6DISW

Nom au cycle 1 : HWC4DISW

Site Internet : *Canadian Guidelines for Body Weight Classification in Adults* ;
http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/onpp-bppn/index_f.html

Basé sur HWC_nDBMI (Source : HWC_n_HT, HWC_n_3KG et PHC_n_4B (*anciennement HWC_n_1*)). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que HWC_nDSW au cycle 1 (1994), 2 (1996), 3 (1998) et 4 (2000). Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents cette variable est recalculée pour inclure les personnes âgées de 18 et 19 ans.

Nota : Santé Canada a révisé les Lignes directrices pour la classification du poids chez les adultes pour se conformer aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) adoptées internationalement. Ce système de classification n'est pas indiqué pour les personnes de moins de 18 ans et pour les femmes enceintes. On doit aussi tenir compte de certaines considérations particulières en utilisant ce système de classification : on peut sous-estimer ou surestimer les risques pour la santé de groupes spécifiques, tel que : les jeunes adultes qui n'ont pas terminé leur croissance, les adultes qui ont une corpulence mince, les très musclés, les adultes de plus de 65 ans et certains groupes ethniques ou raciaux.

Code	Description	Risque de développement de problèmes de santé	Condition
1	Poids insuffisant	Augmente	$HWC_nDBMI < 18.5$
2	Poids normal	Le moindre	$HWC_nDBMI \geq 18.5$ et < 25.0
3	Poids excessif	Augmente	$HWC_nDBMI \geq 25.0$ et < 30.0
4	Obèse – Catégorie I	Grand	$HWC_nDBMI \geq 30.0$ et < 35.0
5	Obèse – Catégorie II	Très grand	$HWC_nDBMI \geq 35.0$ et < 40.0
6	Obèse – Catégorie III	Extrêmement grand	$HWC_nDBMI \geq 40.0$ et < 99.6
96	Sans objet	Sans objet	$HWC_nDBMI = 99.6$
99	Non déclaré	Non déclaré	$HWC_nDBMI > 99.6$

VARIABLES RELATIVES À LA TAILLE ET AU POIDS SUPPRIMÉES :

1. **Poids - kilogrammes - Groupé**
 Nom au cycle 3 : HWC8G3KG
 Nom au cycle 2 : HWC6G3KG
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)
2. **Indice de la masse corporelle - Groupé**
 Nom au cycle 3 : HWC8GBMI
 Nom au cycle 2 : HWC6GBMI
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)
3. **Taille - Groupé**
 Nom au cycle 3 : HWC8GHT
 Nom au cycle 2 : HWC6GHT
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)
4. **Poids standard - Groupé**
 Nom au cycle 3 : HWC8GSW
 Nom au cycle 2 : HWC6GSW
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)
5. **Poids à la naissance - Groupé**
 Nom au cycle 3 : HWC8GBW
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)

6. Poids standard

Nom au cycle 4 : HWC0DSW (*remplacée par HWC0DISW*)

Nom au cycle 3 : HWC8DSW (*remplacée par HWC8DISW*)

Nom au cycle 2 : HWC6DSW (*remplacée par HWC6DISW*)

Nom au cycle 1 : HWC4DSW (*remplacée par HWC4DISW*) (*anciennement DVBMIC94*)

Raison : *Nouveau standard International pour le cycle 5 (2003)*

14. BLESSURES (IJ)**14.1 Genre de blessure selon la partie du corps**

Nom au cycle 5 : S.O. (remplacée par IJC2DTBS)

Nom au cycle 4 : S.O. (remplacée par IJC0DTBS)

Nom au cycle 3 : IJC8D1

Nom au cycle 2 : IJC6D1

Nom au cycle 1 : IJC4D1 (anciennement DVINJ194)

Basé sur IJCN_3 et IJCN_4.

Depuis le cycle 4, cette variable dérivée n'est pas disponible à cause de changements de catégorie pour les questions IJCN_3 et IJCN_4 et de l'introduction d'une nouvelle question (IJCN_4A). Cette variable dérivée a été remplacée par IJCNDTBS.

Pour dériver cette variable, on a créé une matrice de toutes les réponses possibles à la question IN_Q3 (genre de blessure), d'une part, et de toutes les réponses possibles à la question IN_Q4 (partie du corps atteinte), d'autre part. Un code unique a été attribué à chaque combinaison de la matrice, sauf aux combinaisons impossibles (p. ex. commotion de l'épaule) auxquelles on a attribué le code 996.

Les blessures multiples de même genre (p. ex. fractures multiples) sont classées dans une catégorie unique de blessure (p. ex., fractures). Pareillement, on n'a codé qu'une seule partie du corps en cas de blessure à des endroits multiples de la partie du corps en question. Par exemple, des fractures multiples des deux jambes ou des deux pieds sont classées dans la catégorie fracture de la jambe ou fracture du pied. Donc, un cas de fractures multiples aux deux jambes et aux deux pieds se verrait attribuer le code « 17 ». Un cas de fractures et de brûlures multiples aux deux jambes et aux deux pieds se verrait attribuer le code « 27 ».

La catégorie « Autre » genre de blessure comprend les écrasements, les gelures, les corps étrangers, les blessures ne se classant dans aucune autre catégorie et les blessures dont la catégorie n'est pas précisée.

Code	Description	Condition
Toutes les valeurs	Voir les tableaux qui suivent	Voir les tableaux qui suivent
9996	Sans objet (aucune blessure)	IJCN_3=96
9999	Non déclaré	(IJCN_3=97, 98 ou 99) ou (IJCN_4=97, 98 ou 99)

Structure de codage de IJcD1 = IJc3 II IJc4

	Parties multiples	Yeux	Tête (sauf les yeux)	Cou	Épaule	Bras ou main	Hanche	Jambe ou pied	Dos ou colonne vertébrale	Tronc	Effet systématique
Blessures multiples	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	999
Fractures	20	-	22	23	24	25	26	27	28	29	999
Brûlure	30	31	32	32	35	35	39	37	39	39	999
Dislocation	40	-	42	43	44	45	46	47	48	49	999
Entorse ou foulure	50	-	52	53	54	55	56	57	58	59	999
Coupure, plaie, amputation	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	999
Meurtrissure, contusion, écorchure	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	999
Commotion	-	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-
Empoisonnement par absorption d'un solide ou d'un liquide	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	90
Lésion interne	100	102	102	102	104	105	109	107	109	109	999
Autre	110	111	112	112	114	115	116	117	119	119	999
96	996	996	996	996	996	996	996	996	996	996	996

Nota : 996 = « Sans objet », 999 = « Non déclaré » et « - » = « Une combinaison impossible ».

14.2 Cause de la blessure selon le lieu de l'accident

Nom au cycle 5 : S.O. (remplacée par IJc2DCAU et IJc2DCBP)

Nom au cycle 4 : S.O. (remplacée par IJc0DCAU et IJc0DCBP)

Nom au cycle 3 : IJc8D2

Nom au cycle 2 : IJc6D2

Nom au cycle 1 : IJc4D2 (anciennement DVINJ294)

Basé sur IJc5 et IJc6.

Depuis le cycle 4, cette variable dérivée n'est pas disponible à cause de changements aux questions IJc5 et IJc10B et de l'introduction d'une nouvelle question sur les chutes (IJc10). Cette variable dérivée a été remplacée par IJcDCAU et IJcDCBP.

Pour dériver cette variable, on a créé une matrice de toutes les réponses possibles à la question IN_Q6 (cause de la blessure), d'une part, et de toutes les réponses possibles à la question IN_Q5 (lieu où s'est produite la blessure) provisoirement recodée, d'autre part. Les deux premiers chiffres de cette variable à trois chiffres indiquent la cause extérieure de la blessure; le troisième chiffre indique le lieu où la blessure s'est produite.

Un « Accident impliquant un véhicule à moteur » est un accident de transport impliquant la plupart des véhicules à moteur et peut concerner le conducteur, un passager, un motocycliste, un piéton, une personne montant un animal ou le conducteur d'un véhicule tiré par un ou plusieurs animaux. Cette catégorie n'inclut pas les accidents impliquant un train, un bateau ou un avion, à moins qu'un véhicule à moteur ne soit impliqué.

La catégorie « Autre cause de blessure » peut inclure des accidents tels que ceux causés par un courant électrique, une arme à feu, une bicyclette, un remonte-pente ainsi que les accidents de

transport par eau ne comportant ni noyade ni submersion.

Code	Description	Condition
Toutes les valeurs	Voir les tableaux qui suivent	Voir les tableaux qui suivent
9996	Sans objet (aucune blessure)	IJCn_5=96
9999	Non déclaré	(IJCn_5=97, 98 ou 99) ou (IJCn_6=97, 98 ou 99)

Structure de codage de IJCnD2 = IJCn_6 || IJCn_5 recodé

	Maison	Ferme	Lieu de loisirs	Rue	Immeuble public	Établissement résidentiel	Mine	Site industriel	Autre
Accident impliquant un véhicule à moteur	10	11	14	15	16	17	12	13	18
Chute accidentelle	20	21	24	25	26	27	22	23	28
Incendie ou flammes	30	31	34	35	36	37	32	33	38
Heurté accidentellement	40	41	44	45	46	47	42	43	48
Agression	50	51	54	55	56	57	52	53	58
Tentative de suicide	60	61	64	65	66	67	62	63	68
Blessure- explosion	70	71	74	75	76	77	72	73	78
Blessure- facteur naturel	80	81	84	85	86	87	82	83	88
Noyade accidentelle	90	91	94	95	96	97	92	93	98
Suffocation accidentelle	100	101	104	105	106	107	102	103	108
Liquides chauds	110	111	114	115	116	117	112	113	118
Accident - machinerie	120	121	124	125	126	127	122	123	128
Accident - objets tranchants	130	131	134	135	136	137	132	133	138
Empoisonnement accidentel	140	141	144	145	146	147	142	143	148
Autre	150	151	154	155	156	157	152	153	158

14.3 Genre de blessure selon la partie du corps atteinte

Nom au cycle 5 : IJC2DTBS

Nom au cycle 4 : IJC0DTBS

Nom au cycle 3 : S.O.

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : S.O.

Basé sur IJCn_1, IJCn_3, IJCn_4 et IJCn_4A. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJCnD1 au cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998).

Cette variable dérivée catégorise le genre de blessure selon la partie du corps. Pour dériver cette variable, on a créé une matrice de toutes les réponses possibles à la question IJCn_3 (genre de blessure), d'une part, et de toutes les réponses possibles aux questions IJCn_4 et IJCn_4A (partie du corps atteinte), d'autre part. Un code unique a été attribué à chaque combinaison de la matrice à l'exception de celles qui semblent impossible (p. ex., dislocation des yeux).

Les blessures multiples de même genre (p. ex. fractures multiples) sont classées dans une catégorie unique de blessures (p. ex., fractures). De même, on n'a codé qu'une seule partie du corps en cas de blessure à des endroits multiples de la partie du corps en question. Par exemple, des fractures

multiples des deux genoux ou des deux jambes sont classées dans la catégorie fracture du genou ou fracture de la partie inférieure de la jambe. Donc, un cas de fractures et de brûlures multiples aux deux genoux et aux deux jambes se verrait attribuer le code « 110 ». Un cas de fractures multiples aux deux genoux et aux deux jambes se verrait attribuer le code « 210 ».

La catégorie « Autre » genre de blessure comprend les écrasements, les gelures, les corps étrangers, les blessures ne se classant dans aucune autre catégorie et les blessures dont la catégorie n'est pas précisée.

Code	Description	Condition
Toutes les valeurs	Voir les tableaux qui suivent	Voir les tableaux qui suivent
9996	Sans objet (aucune blessure)	IJCn_1 =2 ou 6
9999	Non déclaré	(IJCn_3 =97, 98 ou 99) ou (IJCn_4 =97, 98 ou 99) ou (IJCn_4A =7, 8 ou 9)

Structure de codage de IJc_nDTBS = IJc_n_3 || IJc_n_4 ou IJc_n_3 || IJc_n_4A pour les blessures internes

	Parties multiples IJc _n _4-01	Yeux =02	Tête (sauf les yeux) =03	Cou =04	Épaule, bras =05	Coude, avant-bras =06	Poignet, main =07	Hanche =08	Cuisse =09	Genou, partie inférieure de la jambe =10	Cheville, pied =11	Partie supérieure du dos ou de la colonne vertébrale =12	Partie inférieure du dos ou de la colonne vertébrale =13	Cage thoracique =14	Abdomen ou pelvis =15	Autre =16
Blessures multiples IJc _n _3=1	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	-
Fracture =2	201	9999	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	-
Brûlure, brûlure chimique =3	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	-
Dislocation =4	401	9999	403	404	405	406	407	408	9999	10	411	412	413	414	415	-
Ertorse ou foulure =5	501	9999	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	-
Coupure, perforation, morsure d'animal (plate ouverte) =6	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	-
Éraflure, meurtrissure, cloque =7	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	-
Commotion ou autre traumatisme cérébral =8	-	-	800*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empoison- nement =9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900*
Lésion des organes internes =10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1014	1015	1016
Autre =11	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	-

Nota : « - » = une combinaison impossible

* Aucune partie du corps n'a été attribuée à ces choix. Il n'y a donc pas de critères d'attribution.

14.4 **Cause de la blessure**

Nom au cycle 5 : IJC2DCAU

Nom au cycle 4 : IJC0DCAU

Nom au cycle 3 : S.O

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : S.O.

Basé sur IJCN_10 et IJCN_10B.

Cette variable dérivée indique la cause de la blessure du répondant. Pour dériver cette variable, on a fusionné l'indicateur « chute » (IJCN_10) et la liste des « autres causes de blessure » (IJCN_10B). Une valeur « sans objet » sera attribuée aux répondants qui n'ont pas subi de blessure au cours des 12 derniers mois (IJCN_1). Une valeur « Non déclaré » sera produite en l'absence de réponse à la question IJCN_10B (ne sait pas, refus, non déclaré).

Code	Description	Condition
1	Chute	IJCN_10 =1
2	Accident de transport	IJCN_10B =1
3	Frappé, poussé, mordu, etc. accidentellement par une personne ou par un animal	IJCN_10B =2
4	Heurté ou écrasé accidentellement par un objet	IJCN_10B=3
5	Contact accidentel avec une machine, un objet ou un outil tranchant	IJCN_10B =4
6	Fumée, feu, flammes	IJCN_10B =5
7	Contact accidentel avec un objet, un liquide ou un gaz chaud	IJCN_10B =6
8	Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle	IJCN_10B =7
9	Exercice trop intensif ou mouvement ardu	IJCN_10B =8
10	Agression	IJCN_10B =9
11	Autre - Précisez	IJCN_10B =10
96	Sans objet	IJCN_1=2 ou 6
99	Non déclaré	IJCN_10B =97, 98 ou 99

14.5 **Cause de la blessure selon le lieu où la blessure s'est produite**

Nom au cycle 5 : IJC2DCBP

Nom au cycle 4 : IJC0DCBP

Nom au cycle 3 : S.O

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : S.O.

Basé sur IJCN_5 et IJCN_DCAU (Source : IJCN_10 et IJCN_10B). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJCN_D2 au cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998).

Cette variable dérivée catégorise la blessure selon le lieu où elle s'est produite. Pour dériver cette variable à trois chiffres, on a créé une matrice de toutes les réponses possibles aux questions IJCN_5 (cause de la blessure), d'une part, et de toutes les réponses possibles à la nouvelle variable dérivée IJCN_DCAU d'autre part.

La catégorie « Autre cause de blessure » peut inclure des accidents tels que ceux causés par un

courant électrique, une arme à feu, une bicyclette et un remonte-pente.

Code	Description	Condition
Toutes les valeurs	Voir le tableau qui suit	Voir le tableau qui suit
996	Sans objet (aucune blessure)	IJCn_1 =2 ou 6
999	Non déclaré	(IJCn_5 =97, 98 ou 99) ou (IJCnD4 =97, 98 ou 99)

Structure de codage de IJCnDCBP = (IJCnDCAU || IJCn_5)

IJCnDCAU		Maison IJCn_5=1	Établ. résidentiel =2	École, université =3	Autre établissement =4	Aires de sport =5	Rue =6	Zone commer- -ciale =7	Zone in- dustrielle =8	Entreprise agricole =9	Autre =10
=1	Chute	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
=2	Accident de transport	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
=3	Frappé, poussé, mordu, etc. accidentellement par une personne ou par un animal	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
=4	Frappé ou écrasé accidentellement par un objet	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
=5	Contact accidentel avec une machine, un objet ou un outil tranchant	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
=6	Fumée, feu, flammes	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
=7	Contact accidentel avec un objet, un liquide ou un gaz chaud	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
=8	Conditions climatiques extrêmes ou catastrophe naturelle	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
=9	Exercice trop intensif ou mouvement ardu	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
=10	Agression	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
=11	Autre	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119

VARIABLES RELATIVES AUX BLESSURES SUPPRIMÉES :

- 1. *Lieu où la blessure s'est produite - Groupé***
Nom au cycle 3 : IJC8G5
Nom au cycle 2 : IJC6G5
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)

- 2. *Raison de la blessure - Groupé***
Nom au cycle 3 : IJC8G6
Nom au cycle 2 : IJC6G6
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)

- 3. *Cause de la blessure selon le lieu où la blessure s'est produite - Groupé***
Nom au cycle 3 : IJC8GD2
Nom au cycle 2 : IJC6GD2
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)

15. REVENU (IN)

15.1 Capacité du revenu - 2 groupes

Nom au cycle 5 : INC2DIA2
 Nom au cycle 4 : INC0DIA2
 Nom au cycle 3 : INC8DIA2
 Nom au cycle 2 : INC6DIA2
 Nom au cycle 1 : INC4DIA2 (anciennement DVINC294)

Basé sur INC_n_3A à INC_n_3G et sur DHC_nDHSZ (Source : DHC_n_MEM).

Cette variable dérivée classifie le revenu total du ménage dans 2 catégories basées sur le revenu total du ménage et le nombre de personnes vivant dans le ménage.

Code	Description	Revenu	Taille du Ménage
1	Faible revenu	Moins de 15 000 \$	1 ou 2 personnes
		Moins de 20 000 \$	3 ou 4 personnes
		Moins de 30 000 \$	5 personnes et plus
2	Revenu moyen ou élevé	15 000 \$ ou plus	1 ou 2 personnes
		20 000 \$ ou plus	3 ou 4 personnes
		30 000 \$ ou plus	5 personnes et plus
9	Non déclaré	Revenu inconnu	Autrement

15.2 Capacité du revenu - 4 groupes

Nom au cycle 5 : INC2DIA4
 Nom au cycle 4 : INC0DIA4
 Nom au cycle 3 : INC8DIA4
 Nom au cycle 2 : INC6DIA4
 Nom au cycle 1 : INC4DIA4 (anciennement DVINC494)

Basé sur INC_n_3A à INC_n_3G et sur DHC_nDHSZ (Source : DHC_n_MEM).

Cette variable dérivée classifie le revenu total du ménage dans 4 catégories basées sur le revenu total du ménage et le nombre de personnes vivant dans le ménage.

Code	Description	Revenu	Taille du Ménage
1	Revenu inférieur	Moins de 15 000 \$	1 ou 2 personnes
		Moins de 20 000 \$	3 ou 4 personnes
		Moins de 30 000 \$	5 personnes et plus
2	Revenu inférieur moyen	De 15 000 \$ à 29 999 \$	1 ou 2 personnes
		De 20 000 \$ à 39 999 \$	3 ou 4 personnes
		De 30 000 \$ à 59 999 \$	5 personnes et plus
3	Revenu supérieur moyen	De 30 000 \$ à 59 999 \$	1 ou 2 personnes
		De 40 000 \$ à 79 999 \$	3 ou 4 personnes
		De 60 000 \$ à 79 999 \$	5 personnes et plus

Code	Description	Revenu	Taille du Ménage
4	Revenu supérieur	60 000 \$ ou plus	1 ou 2 personnes
		80 000 \$ ou plus	3 personnes et plus
9	Non déclaré	Revenu inconnu	Autrement

15.3 Capacité du revenu - 5 groupes

Nom au cycle 5 : INC2DIA5

Nom au cycle 4 : INC0DIA5

Nom au cycle 3 : INC8DIA5

Nom au cycle 2 : INC6DIA5

Nom au cycle 1 : INC4DIA5 (anciennement DVINC594)

Basé sur INC_n_3A à INC_n_3G et sur DHC_nDHSZ (Source : DHC_n_MEM).

Cette variable dérivée classe le revenu total du ménage dans 5 catégories basées sur le revenu total du ménage et le nombre de personnes vivant dans le ménage.

Code	Description	Revenu	Taille du Ménage
1	Revenu inférieur	Moins de 10 000 \$	1 à 4 personnes
		Moins de 15 000 \$	5 personnes et plus
2	Revenu inférieur moyen	De 10 000 \$ à 14 999 \$	1 ou 2 personnes
		De 10 000 \$ à 19 999 \$	3 ou 4 personnes
		De 15 000 \$ à 29 999 \$	5 personnes et plus
3	Revenu moyen	De 15 000 \$ à 29 999 \$	1 ou 2 personnes
		De 20 000 \$ à 39 999 \$	3 ou 4 personnes
		De 30 000 \$ à 59 999 \$	5 personnes et plus
4	Revenu supérieur moyen	De 30 000 \$ à 59 999 \$	1 ou 2 personnes
		De 40 000 \$ à 79 999 \$	3 ou 4 personnes
		De 60 000 \$ à 79 999 \$	5 personnes et plus
5	Revenu supérieur	60 000 \$ ou plus	1 ou 2 personnes
		80 000 \$ ou plus	3 personnes et plus
9	Non déclaré	Revenu inconnu	Autrement

15.4 Revenu total du ménage - Toutes sources

Nom au cycle 5 : INC2DHH

Nom au cycle 4 : INC0DHH

Nom au cycle 3 : INC8DHH

Nom au cycle 2 : INC6DHH

Nom au cycle 1 : INC4DHH (anciennement DVHHIN94)

Basé sur INC_n_3A à INC_n_3G, (c'est-à-dire une question *en cascade* sur le revenu).

Cette variable dérivée regroupe le revenu total du ménage de toutes provenances. Si la personne a indiqué le revenu exact de son ménage à la question INC_n_3, les réponses aux questions INC_n_3A à

3G ont été inscrites durant le processus de changement de format d'après INC_n_3, et INC_nDHH a été dérivée d'après ces valeurs.

Code	Description	Condition
1	Aucun revenu	INC _n _3A=3
2	Moins de 5 000 \$	INC _n _3C=1
3	De 5 000 \$ à 9 999 \$	INC _n _3C=2
4	De 10 000 \$ à 14 999 \$	INC _n _3D=1
5	De 15 000 \$ à 19 999 \$	INC _n _3D=2
6	De 20 000 \$ à 29 999 \$	INC _n _3F=1
7	De 30 000 \$ à 39 999 \$	INC _n _3F=2
8	De 40 000 \$ à 49 999 \$	INC _n _3G=1
9	De 50 000 \$ à 59 999 \$	INC _n _3G=2
10	De 60 000 \$ à 79 999 \$	INC _n _3G=3
11	80 000 \$ ou plus	INC _n _3G=4
99	Non déclaré	Autrement (y compris les R et NSP)

15.5 Indice des prix à la consommation

Nom au cycle 5 : INC2CCPI

Nom au cycle 4 : INC0CCPI

Nom au cycle 3 : INC8CCPI

Nom au cycle 2 : INC6CCPI

Nom au cycle 1 : INC4CCPI

Moyenne annuelle de tous les items, non désaisonnalisée (1992 = 100) utilisée pour gonfler les variables de revenu.

1994 - Tous les éléments - Non désaisonnalisé, moyenne annuelle=102.0

1996 - Tous les éléments - Non désaisonnalisé, moyenne annuelle=105.9

1998 - Tous les éléments - Non désaisonnalisé, moyenne annuelle=108.6

2000 - Tous les éléments - Non désaisonnalisé, moyenne annuelle=113.5

2002 - Tous les éléments - Non désaisonnalisé, moyenne annuelle=119.0

15.6 Revenu personnel total - Toutes sources

Nom au cycle 5 : INC2DPER

Nom au cycle 4 : INC0DPER

Nom au cycle 3 : INC8DPER

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : S.O.

Basé sur INC_n_4A à INC_n_4G (c'est-à-dire une question *en cascade* sur le revenu).

Cette variable dérivée détermine le revenu personnel du répondant de toutes provenances. Si la personne a indiqué le revenu du ménage exact à la question INC_n_4, alors INC_nDPER est calculée d'après cette valeur. Ces questions ne sont posées qu'aux répondants sélectionnés âgés de 15 ans et plus.

Code	Description	Condition
1	Aucun revenu	INC _n _4A=3
2	Moins de 5 000 \$	INC _n _4C=1
3	De 5 000 \$ à 9 999 \$	INC _n _4C=2
4	De 10 000 \$ à 14 999 \$	INC _n _4D=1
5	De 15 000 \$ à 19 999 \$	INC _n _4D=2
6	De 20 000 \$ à 29 999 \$	INC _n _4F=1
7	De 30 000 \$ à 39 999 \$	INC _n _4F=2
8	De 40 000 \$ à 49 999 \$	INC _n _4G=1
9	De 50 000 \$ à 59 999 \$	INC _n _4G=2
10	De 60 000 \$ à 79 999 \$	INC _n _4G=3
11	80 000 \$ ou plus	INC _n _4G=4
96	Sans objet	DHC _n _AGE<=14
99	Non déclaré	Autrement (y compris les R et NSP)

15.7 Questions sur le revenu posées aux répondants du H05

Nom au cycle 5 : S.O.

Nom au cycle 4 : S.O.

Nom au cycle 3 : INC8F1

Nom au cycle 2 : INC6F1

Nom au cycle 1 : INC4F1

Dans les cycles 1 à 3, des questions sur le revenu ont été posées à tous les occupants. Parce que chaque question demandait le total des revenus pour tous les membres occupants, ces questions ont été posées une seule fois et extrapolées pour les autres membres de la famille. Cet indicateur montre si le répondant fournit l'information pour le ménage. Dans le cycle 4, ces questions ont seulement été posées aux répondants longitudinaux, alors cet indicateur n'est plus nécessaire.

15.8 Indicateur pour insécurité alimentaire

Nom au cycle 5 : S.O.

Nom au cycle 4 : S.O.

Nom au cycle 3 : FIC8F1

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : S.O.

Basé sur FIC_n_1 à FIC_n_3.

Cette variable dérivée indique si le répondant a éprouvé de l'insécurité relative à des aliments au cours des 12 derniers mois.

Code	Description	Condition
1	A éprouvé de l'insécurité alimentaire	FICn_1=1 ou FICn_2=1 ou FICn_3=1
2	N'a pas éprouvé d'insécurité alimentaire	FICn_1=2 et FICn_2=2 et FICn_3=2
6	Sans objet	FICn_1=6
9	Non déclaré	Autrement

VARIABLES RELATIVES AU REVENU SUPPRIMÉES :

1. Source principale du revenu total du ménage- Groupé

Nom au cycle 3 : INC8G2

Nom au cycle 2 : INC6G2

Raison : variable regroupée (FMGD seulement)

2. Revenu personnel total de toutes sources - Groupé

Nom au cycle 3 : INC8GPER

Raison : variable regroupée (FMGD seulement)

16. ASSURANCE (IS)**16.1 Nombre de types d'assurance médicale**

Nom au cycle 5 : ISC2D1

Nom au cycle 4 : ISC0D1

Nom au cycle 3 : ISC8D1

Nom au cycle 2 : ISC6D1 (*anciennement IS_6D1*)

Nom au cycle 1 : S.O.

Basé sur $ISCn_1$ (*anciennement DGC6_6 au cycle 2*); $ISCn_2$ (*anciennement DV_6_66 au cycle 2*); $ISCn_3$ (*anciennement EX_6_77 au cycle 2*) et $ISCn_4$ (*anciennement ES_6_82 au cycle 2*).

Code	Description	Condition
0	Aucune assurance	Nombre de « Oui » dans $ISCn_1$, 2, 3 et 4
1	Un type d'assurance	Nombre de « Oui » dans $ISCn_1$, 2, 3 et 4
2	Deux types d'assurance	Nombre de « Oui » dans $ISCn_1$, 2, 3 et 4
3	Trois types d'assurance	Nombre de « Oui » dans $ISCn_1$, 2, 3 et 4
4	Quatre types d'assurance	Nombre de « Oui » dans $ISCn_1$, 2, 3 et 4
6	Sans objet	$ISCn_4=6$ ($DHCn_AGE < 12$ ou le répondant sélectionné est en établissement)
9	Non déclaré	$ISCn_1$ ou $ISCn_2$ ou $ISCn_3$ ou $ISCn_4 > 6$

17. POPULATION ACTIVE (LF)

Comme le nombre d'emplois pour lesquels on a recueilli des données est passé de 6 au cycle 1 à 3 aux cycles 2 et 3, on a supprimé certaines variables dérivées et, pour celles qui ont été retenues, on a modifié certaines catégories. Pour le fichier longitudinal du cycle 1, on n'a retenu des données que pour trois emplois. Les valeurs pour l'emploi principal ont été recalculées. Pour le cycle 4, la section sur la population active du questionnaire a été modifiée encore une fois. Pour ce cycle, de nombreuses nouvelles variables dérivées ont été créées et la section est désignée sous un nouveau nom, situation en regard de l'activité, les nouvelles variables dérivées commençant maintenant par le préfixe « LSC » plutôt que « LFC » (comme c'était le cas pour les anciennes variables dérivées sur la population active). Ces variables dérivées sur la population active sont présentées dans deux sections distinctes.

17.1 Situation en regard de l'activité (12 derniers mois)

Nom au cycle 5 : S.O. (remplacée par LSC2DYWS)

Nom au cycle 4 : S.O. (remplacée par LSC0DYWS)

Nom au cycle 3 : LFC8DCWS

Nom au cycle 2 : LFC6DCWS

Nom au cycle 1 : LFC4DCWS (anciennement DVWK94)

Basé sur LFC_n_2, LFC_n_6i (où i = 1, 2, 3, p. ex. LFC_n_61), LFC_n_51M et LFC_n_71M.

Code	Description	Condition
1	Travaille à l'heure actuelle	LFC _n _2=1 et LFC _n _6i=1
2	Ne travaille pas à l'heure actuelle mais a travaillé durant les 12 derniers mois	LFC _n _2=1 et LFC _n _6i=2
3	N'a pas travaillé durant les 12 derniers mois	LFC _n _2=2
4	A travaillé durant les 12 derniers mois - situation actuelle inconnue	LFC _n DCWS=9 et LFC _n _2=1
6	Sans objet	LFC _n _2=6
9	Non déclaré	LFC _n _2>6

Au cycle 4, les questions relatives à la situation en regard de l'activité au cours des 12 derniers mois ne sont posées qu'à ceux qui ne travaillaient pas au cours de la dernière semaine. Cette variable dérivée a été remplacée par LSC_nDYWS.

17.2 Raison pour ne pas travailler au moment de l'enquête - Groupé

Nom au cycle 5 : S.O.

Nom au cycle 4 : S.O.

Nom au cycle 3 : S.O.

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : LFC4G17B* (anciennement DVREAS94)

Basé sur LFC_n_17B.

*LFC4G17B reste dans le fichier longitudinal parce que LFC4_17B n'existait pas au cycle 1.

Code	Description	Condition
1	Maladie ou incapacité de la personne visée	LFC _n _17B=1, 14
2	Responsabilités familiales	LFC _n _17B=2, 3, 4, 5
3	Études/congé d'études	LFC _n _17B=6
4	Conflit de travail/mise à pied	LFC _n _17B=7, 8, 9, 10
5	Retraité durant toute l'année	LFC _n _17B=11
6	Autre raison de ne pas travailler actuellement	LFC _n _17B=12, 13, 15, 16, 17
96	Sans objet	LFC _n _17B=96
99	Non déclaré	LFC _n _17B>96

* Problème concernant la retraite en 1994. Les données ne permettent d'évaluer la retraite avec précision que pour l'année entière précédant la collecte des données. Pour « ne travaille pas à l'heure actuelle pour cause de retraite », il faut se servir de la question sur l'emploi principal qui est moins précise.

Au cycle 4, étant donné que l'ordre des questions a été modifié, cette variable dérivée a été remplacée par la variable LSC_nDRNW.

17.3 Classification type des professions pour l'emploi principal - 47 groupes

Nom au cycle 5 : LFC2GO47

Nom au cycle 4 : LFC0GO47

Nom au cycle 3 : LFC8GO47

Nom au cycle 2 : LFC6GO47

Nom au cycle 1 : LFC4GO47

Classification type des professions 1991 (CTP) - Structure

Site Web de Statistique Canada : www.statcan.ca/english/Subjects/Standard/Soc/1991/Soc91-menu.htm

Basé sur LFC_nCO91.

Code	Description	Condition
1	Cadres supérieurs/cadres supérieures	A011-A016
2	Directeurs/directrices spécialistes	A111-A141
3	Directeurs/directrices de la vente au détail, de la restauration et des services d'hébergement	A211-A222
4	Autres directeurs/directrices non classifié ailleurs (n.c.a.)	A301-A392
5	Personnel professionnel en gestion des affaires et en finance	B011-B022
6	Personnel d'administration des finances et des assurances	B111-B116
7	Secrétaires	B211-B214
8	Personnel administratif et de réglementation	B311-B318
9	Personnels de supervision du travail de bureau	B411-B415
10	Personnel de bureau	B511-B576

Code	Description	Condition
11	Personnel professionnel des sciences naturelles et appliquées	C011-C063
12	Personnel technique relié aux sciences naturelles et appliquées	C111-C175
13	Personnel professionnel des soins de santé	D011-D044
14	Professionnel(le)s en sciences infirmières	D111-D112
15	Personnel technique et personnel assimilé du secteur de la santé	D211-D235
16	Personnel de soutien des services de santé	D311-D313
17	Professionnel(le)s en sciences sociales, en enseignement, en administration publique et en religion	E011-E038
18	Enseignants/enseignantes	E111-E133
19	Personnel technique en sciences sociales, en administration publique et en religion	E211-E216
20	Professionnel(le)s des arts et de la culture	F011-F036
21	Personnel technique des arts, de la culture, des sports et des loisirs	F111-F154
22	Personnel de supervision des ventes et des services	G011-G016
23	Personnel de la vente en gros technique et non technique, de l'assurance et de l'immobilier, des achats en gros et au détail et des achats de grain	G111-G134
24	Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses	G211
25	Caissiers/caissières	G311
26	Chefs et cuisiniers/cuisinières	G411-G412
27	Personnel des services des aliments et boissons	G511-G513
28	Personnel des services de protection	G611-G631
29	Personnel de l'hébergement et des voyages	G711-G732
30	Personnel de soutien familial et de garderie	G811-G814
31	Personnel de la vente et des services n.c.a.	G911-G983
32	Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses du personnel des métiers et des transports	H011-H022
33	Personnel des métiers de la construction	H111-H145
34	Mécaniciens/mécaniciennes de machines fixes, opérateurs/opératrices de réseaux électriques et électriciens/électriciennes et monteurs/monteuses de télécommunications	H211-H222
35	Machinistes, personnel du formage, profilage et montage du métal	H311-H325
36	Mécaniciens/mécaniciennes	H411-H435
37	Autres métiers n.c.a.	H511-H535
38	Conducteurs/conductrices d'équipement lourd et grutiers/grutières et foreurs/foreuses	H611-H623

Code	Description	Condition
39	Conducteurs/conductrices de matériel de transport et matériel assimilé, sauf les manœuvres	H711-H737
40	Aides de soutien des métiers, manœuvres en construction et de transport et personnel assimilé	H811-H832
41	Professions propres à l'agriculture sauf les manœuvres	I011-I022
42	Professions propres à l'exploitation forestière, minière, pétrolière et gazière et à la pêche, sauf les manœuvres	I111-I182
43	Personnel élémentaire de la production primaire	I211-I216
44	Surveillants/surveillantes dans la fabrication	J011-J027
45	Conducteurs/conductrices de machines dans la fabrication	J111-J197
46	Monteurs/monteuses dans la fabrication	J211-J228
47	Manœuvres dans la fabrication et les services d'utilités publiques	J311-J319
96	Sans objet	LFCnCO91 =9996
99	Non déclaré	LFCnCO91 > 9996

17.4 Classification type des professions pour l'emploi principal - 25 groupes

Nom au cycle 5 : LFC2GO25

Nom au cycle 4 : LFC0GO25

Nom au cycle 3 : LFC8GO25

Nom au cycle 2 : LFC6GO25

Nom au cycle 1 : LFC4GO25

Classification type des professions 1991 (CTP) - Structure

Site Web de Statistique Canada : www.statcan.ca/english/Subjects/Standard/Soc/1991/Soc91-menu.htm

Basé sur LFCnCO91.

Code	Description	Condition
1	Cadres supérieurs/cadres supérieures	A011-A016
2	Autres directeurs/directrices	A111-A392
3	Personnel professionnel en gestion des affaires et en finance	B011-B022
4	Personnel d'administration des finances, de secrétariat et administratif	B111-B318
5	Personnel de bureau, y compris le personnel de supervision	B411-B576
6	Personnel des sciences naturelles et appliquées et personnel assimilé	C011-C175
7	Personnel professionnel des soins de santé, professionnels/professionnelles en sciences infirmières	D011-D112
8	Personnel technique, personnel de soutien et personnel assimilé du secteur de la santé	D211-D313

Code	Description	Condition
9	Personnel en sciences sociales, en enseignement, en administration publique et en religion	E011-E038, E211-E216
10	Enseignants/enseignantes	E111-E133
11	Personnel des arts, de la culture, des loisirs et des sports	F011-F154
12	Personnel de la vente en gros technique et non technique, de l'assurance et de l'immobilier, des achats en gros et au détail et des achats de grains	G111-G134
13	Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses, y compris le personnel de supervision des ventes au détail	G011, G211- G311
14	Chefs et cuisiniers/cuisinières, et personnel des services des aliments et boissons, y compris le personnel de supervision	G012, G411- G513
15	Personnel des services de protection	G611-G631
16	Personnel de soutien familial et de garderie	G811-G814
17	Personnel de la vente et des services n.c.a., y compris le personnel de l'hébergement et des voyages et les préposés/préposées dans les sports et les loisirs, ainsi que le personnel de supervision	G013-G016, G711-G732, G911-G983
18	Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses du personnel des métiers et des transports	H011-H022
19	Personnel des métiers de la construction	H111-H145
20	Personnel des autres métiers	H211-H535
21	Conducteurs/conductrices de matériel de transport et d'équipement lourd	H611-H737
22	Aides de soutien des métiers, manœuvres en construction et de transports et personnel assimilé	H811-H832
23	Professions propres au secteur primaire	I011-I216
24	Conducteurs/conductrices de machines dans la fabrication, y compris le personnel de supervision	J011-J228
25	Manœuvres dans la transformation, la fabrication et les services d'utilités publiques	J311-J319
96	Sans objet	LFC _n CO91= 9996
99	Non déclaré	LFC _n CO91 > 9996

17.5 Classification type des industries pour l'emploi principal - 16 groupes

Nom au cycle 5 : LFC2GI16
 Nom au cycle 4 : LFC0GI16
 Nom au cycle 3 : LFC8GI16
 Nom au cycle 2 : LFC6GI16
 Nom au cycle 1 : LFC4GI16

Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997.

Site Web de Statistique Canada :

http://www.statcan.ca/francais/Subjects/Standard/naics/1997/naics97-index_f.htm

Basé sur LFCnCI97.

Code	Description	Condition
1	Agriculture	1100-1129, 1151-1152
2	Foresterie, pêche, extraction minière et extraction de pétrole et de gaz	1131-1142, 1153, 2100-2131
3	Services publics	2211-2213
4	Construction	2311-2329
5	Fabrication	3111-3399
6	Commerce	4111-4543
7	Transports et entreposage	4811-4931
8	Finance, assurances, services immobiliers et services de location et de location à bail	5211-5331
9	Services professionnels, scientifiques et techniques	5411-5419
10	Services de gestion, services administratifs et autres services de soutien	5511-5629
11	Services d'enseignement	6111-6117
12	Soins de santé et assistance sociale	6211-6244
13	Information, culture et loisirs	5111-5142, 7111-7139
14	Hébergement et services de restauration	7211-7224
15	Autres services (sauf les administrations publiques)	8111-8141
16	Administrations publiques	9110-9191
96	Sans objet	LFCnCI97=9996
99	Non déclaré	LFCnCI97> 9996

17.6 Numéro d'emploi de l'ancien emploi principal

Nom au cycle 5 : S.O.

Nom au cycle 4 : S.O.

Nom au cycle 3 : S.O.

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : LFC4DOMN

Au cycle 1, on a recueilli des données allant jusqu'aux 6 derniers emplois occupés par le répondant au cours des 12 mois précédant l'interview. Comme fort peu de répondants avaient occupé plus de trois emplois, on a décidé qu'à partir du deuxième cycle, on ne recueillerait des données que sur 3 emplois. En prévision de la création d'un fichier longitudinal, les données recueillies au premier cycle ont été converties à la même présentation que celles sur les emplois du deuxième cycle. Le classement des emplois a été modifié, de façon que l'emploi principal ne soit pas l'un des emplois 4, 5 ou 6, que l'on a éliminé. La présente variable « ancien emploi principal » indique le numéro de l'emploi principal qui figure dans le fichier maître du cycle 1 et dans les FMGD.

17.7 Numéro d'emploi de l'emploi principal

Nom au cycle 5 : S.O.
 Nom au cycle 4 : S.O.
 Nom au cycle 3 : LFC8FMN
 Nom au cycle 2 : LFC6FMN
 Nom au cycle 1 : LFC4FMN (*anciennement LFS_MAIN*)

Au cycle 4, cette question ne concerne que l'emploi le plus récent ou l'emploi actuel. Dans le cas des cycles précédents, s'il existait plus d'un emploi, les emplois ont été classés de façon à ce que l'emploi 1 soit l'emploi courant le plus récent (p. ex. date de fin=juin 1997). Si deux emplois ont la même date de fin, le tri se fait d'après la date de début.

17.8 Indicateur de travail

Nom au cycle 5 : S.O.
 Nom au cycle 4 : S.O.
 Nom au cycle 3 : LFC8FWK
 Nom au cycle 2 : LFC6FWK
 Nom au cycle 1 : LFC4FWK (*anciennement LFS_WORK*)

On se sert de cet indicateur pour déterminer si la personne travaillait au moment de l'enquête. Cependant, en cas de non-réponse à toute question de la section sur l'activité, sa valeur est fixée à « Non déclaré ».

17.9 Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours

Nom au cycle 5 : S.O.
 Nom au cycle 4 : S.O.
 Nom au cycle 3 : LFC8FGAP
 Nom au cycle 2 : LFC6FGAP
 Nom au cycle 1 : LFC4FGAP (*anciennement LFS_GAPS*)

Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours, à l'exception du cycle 1, où l'interruption d'emploi était de plus de 6 jours.

17.10 Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus

Nom au cycle 5 : S.O.
 Nom au cycle 4 : S.O.
 Nom au cycle 3 : LFC8DGA
 Nom au cycle 2 : LFC6DGA
 Nom au cycle 1 : LFC4DGA (*anciennement DVNOGP94*)

Basé sur toutes les dates de début et de fin d'emploi au cours des 12 derniers mois. LFC n DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC n FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et pas seulement l'arrêt entre les emplois 1, 2 et 3 :

Nombre d'interruptions de l'emploi d'au moins 30 jours .

0 = Aucune interruption
 1 = Une interruption
 2 = Deux interruptions
 6 = Sans objet
 9 = Non déclaré

17.11 Durée de la période d'emploi continu de plus de 30 jours

Nom au cycle 5 : S.O.
 Nom au cycle 4 : S.O.
 Nom au cycle 3 : LFC8DDA
 Nom au cycle 2 : LFC6DDA

Nom au cycle 1 : LFC4DDA (*anciennement DVCOWD94*)

Basé sur LFC_n_5 et LFC_n_7 (date de fin moins date de début, divisé par 30).

Durée de la période d'emploi continu > 30 jours : durée de la dernière période de travail sans interruption d'emploi :

0 à 12 = mois

96 = sans objet

99 = non déclaré

17.12 **Caractéristiques des heures de travail pour tous les emplois**

Nom au cycle 5 : S.O.

Nom au cycle 4 : S.O.

Nom au cycle 3 : LFC8DHA

Nom au cycle 2 : LFC6DHA

Nom au cycle 1 : LFC4DHA (*anciennement DVWH94*)

Basé sur LFC_nDJA (Source : LFC_n_2, LFC_n_111, LFC_n_112), LFC_nDH1 (Source : LFC_n_81), LFC_nDH2 (Source : LFC_n_82), et LFC_nDH3 (Source : LFC_n_83).

Nombre d'heures de travail pour tous les emplois :

1 = 1 emploi, temps plein

2 = 1 emploi, temps partiel

3 = Seulement temps plein pour tous les emplois

4 = Seulement temps partiel pour tous les emplois

5 = Certains à temps plein, certains à temps partiel

6 = Sans objet

9 = Non déclaré

17.13 **Nombre d'emplois**

Nom au cycle 5 : S.O.

Nom au cycle 4 : S.O.

Nom au cycle 3 : LFC8DJJA

Nom au cycle 2 : LFC6DJJA

Nom au cycle 1 : LFC4DJJA (*anciennement DVNOJB94*)

Basé sur LFC_n_2, LFC_n_111 et LFC_n_112.

Nota : Au cycle 1 (1994), la longueur de cette variable était de 2 octets.

Nombre d'emplois

0 = Pas d'emploi

1 = 1 emploi

2 = 2 emplois

3 = 3 emplois

6 = Sans objet

9 = Non déclaré

17.14 **Caractéristiques du nombre d'emplois**

Nom au cycle 5 : S.O.

Nom au cycle 4 : S.O.

Nom au cycle 3 : LFC8DJGA

Nom au cycle 2 : LFC6DJGA

Nom au cycle 1 : LFC4DJGA (*anciennement DVJOB94*)

Basé sur LFC_nDJA (Source : LFC_n_2, LFC_n_111, LFC_n_112), LFC_nDCWS (Source : LFC_n_2,

LFC_n_61, LFC_n_62, LFC_n_63, LFC_n_51M, LFC_n_71M), et LFC_nDGA (Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus).

Nombre d'emplois et d'interruptions :

- 1 = 1 emploi, travaille présentement
- 2 = 1 emploi, ne travaille pas présentement
- 3 = 2 emplois et plus, pas d'interruption, sans chevauchement
- 4 = 2 emplois et plus, pas d'interruption, avec chevauchements
- 5 = 2 emplois et plus, au moins une interruption, sans chevauchement
- 6 = 2 emplois et plus, au moins une interruption, avec chevauchement
- 7 = Autre
- 96 = Sans objet
- 99 = Non déclaré

17.15 **Emploi courant est l'emploi principal**

Nom au cycle 5 : S.O.

Nom au cycle 4 : S.O.

Nom au cycle 3 : LFC8DCMN

Nom au cycle 2 : LFC6DCMN

Nom au cycle 1 : LFC4DCMN (*anciennement DVMNWK94*)

Basé sur LFC_nFMN (Numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC_n_61, LFC_n_62 et LFC_n_63.

17.16 **Durée de la période de travail - emploi principal**

Nom au cycle 5 : S.O.

Nom au cycle 4 : S.O.

Nom au cycle 3 : LFC8DDMN

Nom au cycle 2 : LFC6DDMN

Nom au cycle 1 : LFC4DDMN (*anciennement DVMNWD94*)

Basé sur LFC_n_51 et LFC_n_71 (date de fin moins date de début, divisé par 30).

17.17 **Heures de travail - emploi principal**

Nom au cycle 5 : S.O.

Nom au cycle 4 : S.O.

Nom au cycle 3 : LFC8DHMN

Nom au cycle 2 : LFC6DHMN

Nom au cycle 1 : LFC4DHMN (*anciennement DVMNWH94*)

Basé sur LFC_nFMN (Numéro d'emploi de l'emploi principal), et LFC_n_81.

Heures de travail - emploi principal

1 = Temps plein (30 heures et plus)

2 = Temps partiel (moins de 30 heures)

6 = Sans objet

9 = Non déclaré

17.18 **Catégorie d'heures de travail - emploi principal**

Nom au cycle 5 : S.O.

Nom au cycle 4 : S.O.

Nom au cycle 3 : LFC8DTMN

Nom au cycle 2 : LFC6DTMN

Nom au cycle 1 : LFC4DTMN (*anciennement DVMNTH94*)

Basé sur LFC_nFMN (Numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC_n_91 à LFC_n_93 et LFC_n_101 à LFC_n_103.

Catégorie d'heures de travail - emploi principal
 1 = Quart normal, sans fin de semaine
 2 = Quart normal, avec fin de semaine
 3 = Quart brisé ou rotatif, sans fin de semaine
 4 = Quart brisé ou rotatif, avec fin de semaine
 5 = Horaire irrégulier ou sur appel, sans fin de semaine
 6 = Horaire irrégulier ou sur appel, avec fin de semaine
 7 = Autre, sans fin de semaine
 8 = Autre, avec fin de semaine
 96 = Sans objet
 99 = Non déclaré

17.19 Durée de la période de travail - emploi 1

Nom au cycle 5 : S.O.
 Nom au cycle 4 : S.O.
 Nom au cycle 3 : LFC8DD1
 Nom au cycle 2 : LFC6DD1
 Nom au cycle 1 : LFC4DD1 (*anciennement DVWD194*)

Basé sur LFC n _51 et LFC n _71 (date de fin moins date du début, divisé par 30).

Durée de la période de travail - emploi 1
 0-12 = Mois
 96 = Sans objet
 99 = Non déclaré

17.20 Durée de la période de travail - emploi 2

Nom au cycle 5 : S.O.
 Nom au cycle 4 : S.O.
 Nom au cycle 3 : LFC8DD2
 Nom au cycle 2 : LFC6DD2
 Nom au cycle 1 : LFC4DD2 (*anciennement DVWD294*)

Basé sur LFC n _52 et LFC n _72 (date de fin moins date du début, divisé par 30).

Durée de la période de travail - emploi 2
 0-12 = Mois
 96 = Sans objet
 99 = Non déclaré

17.21 Durée de la période de travail - emploi 3

Nom au cycle 5 : S.O.
 Nom au cycle 4 : S.O.
 Nom au cycle 3 : LFC8DD3
 Nom au cycle 2 : LFC6DD3
 Nom au cycle 1 : LFC4DD3 (*anciennement DVWD394*)

Basé sur LFC n _53 et LFC n _73 (date de fin moins date du début, divisé par 30).

Durée de la période de travail - emploi 3
 0-12 = Mois
 96 = Sans objet
 99 = Non déclaré

17.22 Heures de travail - emploi 1

Nom au cycle 5 : S.O.
Nom au cycle 4 : S.O.
Nom au cycle 3 : LFC8DH1
Nom au cycle 2 : LFC6DH1
Nom au cycle 1 : LFC4DH1 (*anciennement DVWH194*)

Basé sur LFCn_81.

Heures de travail - emploi 1
1 = Temps plein (30 heures et plus)
2 = Temps partiel (moins de 30 heures)
6 = Sans objet
9 = Non déclaré

17.23 Heures de travail - emploi 2

Nom au cycle 5 : S.O.
Nom au cycle 4 : S.O.
Nom au cycle 3 : LFC8DH2
Nom au cycle 2 : LFC6DH2
Nom au cycle 1 : LFC4DH2 (*anciennement DVWH294*)

Basé sur LFCn_82.

Heures de travail - emploi 2
1 = Temps plein (30 heures et plus)
2 = Temps partiel (moins de 30 heures)
6 = Sans objet
9 = Non déclaré

17.24 Heures de travail - emploi 3

Nom au cycle 5 : S.O.
Nom au cycle 4 : S.O.
Nom au cycle 3 : LFC8DH3
Nom au cycle 2 : LFC6DH3
Nom au cycle 1 : LFC4DH3 (*anciennement DVWH394*)

Basé sur LFCn_83.

Heures de travail - emploi 3
1 = Temps plein (30 heures et plus)
2 = Temps partiel (moins de 30 heures)
6 = Sans objet
9 = Non déclaré

17.25 Catégorie d'heures de travail - emploi 1

Nom au cycle 5 : S.O.
Nom au cycle 4 : S.O.
Nom au cycle 3 : LFC8DT1
Nom au cycle 2 : LFC6DT1
Nom au cycle 1 : LFC4DT1 (*anciennement DVTH194*)

Basé sur LFCn_91 et LFCn_101.

Catégorie d'heures de travail - emploi 1
1 = Quart normal, sans fin de semaine
2 = Quart normal, avec fin de semaine
3 = Quart brisé ou rotatif, sans fin de semaine
4 = Quart brisé ou rotatif, avec fin de semaine
5 = Horaire irrégulier ou sur appel, sans fin de semaine
6 = Horaire irrégulier ou sur appel, avec fin de semaine
7 = Autre, sans fin de semaine
8 = Autre, avec fin de semaine
96 = Sans objet
99 = Non déclaré

17.26 **Catégorie d'heures de travail - emploi 2**

Nom au cycle 5 : S.O.
Nom au cycle 4 : S.O.
Nom au cycle 3 : LFC8DT2
Nom au cycle 2 : LFC6DT2
Nom au cycle 1 : LFC4DT2 (*anciennement DVTH294*)

Basé sur LFCn_92 et LFCn_102.

Catégorie d'heures de travail - emploi 2
1 = Quart normal, sans fin de semaine
2 = Quart normal, avec fin de semaine
3 = Quart brisé ou rotatif, sans fin de semaine
4 = Quart brisé ou rotatif, avec fin de semaine
5 = Horaire irrégulier ou sur appel, sans fin de semaine
6 = Horaire irrégulier ou sur appel, avec fin de semaine
7 = Autre, sans fin de semaine
8 = Autre, avec fin de semaine
96 = Sans objet
99 = Non déclaré

17.27 **Catégories d'heures de travail - emploi 3**

Nom au cycle 5 : S.O.
Nom au cycle 4 : S.O.
Nom au cycle 3 : LFC8DT3
Nom au cycle 2 : LFC6DT3
Nom au cycle 1 : LFC4DT3 (*anciennement DVTH394*)

Basé sur LFCn_93 et LFCn_103.

Catégorie d'heures de travail - emploi 3
1 = Quart normal, sans fin de semaine
2 = Quart normal, avec fin de semaine
3 = Quart brisé ou rotatif, sans fin de semaine
4 = Quart brisé ou rotatif, avec fin de semaine
5 = Horaire irrégulier ou sur appel, sans fin de semaine
6 = Horaire irrégulier ou sur appel, avec fin de semaine
7 = Autre, sans fin de semaine
8 = Autre, avec fin de semaine
96 = Sans objet
99 = Non déclaré

VARIABLES RELATIVES À LA POPULATION ACTIVE SUPPRIMÉES :

1. **État de l'activité du ménage - actuel**
Nom au cycle 3 : LFC8DHW1
Nom au cycle 2 : LFC6DHW1
Raison : Les questions relatives à la population active sont uniquement posées au répondant longitudinal (l'information sur le ménage n'est plus disponible)
2. **État de l'activité du ménage - au cours de l'année**
Nom au cycle 3 : LFC8DHW2
Nom au cycle 2 : LFC6DHW2
Raison : Les questions relatives à la population active sont uniquement posées au répondant longitudinal (l'information sur le ménage n'est plus disponible)
3. **Classification type des professions / emploi principal - 34 groupes**
Nom au cycle 2 : LFC6GO34 (remplacé par LFC6GO47)
Nom au cycle 1 : LFC4GO34 (remplacé par LFC4GO47)
Raison : Nouveau système de codage en 1998
4. **Classification type des professions / emploi principal - 21 groupes**
Nom au cycle 2 : LFC6GO21 (remplacé par LFC6GO25)
Nom au cycle 1 : LFC4GO21 (remplacé par LFC4GO25)
Raison : Nouveau système de codage en 1998
5. **Classification type des industries / emploi principal -13 groupes**
Nom au cycle 2 : LFC6GI13 (remplacé par LFC6GI16)
Nom au cycle 1 : LFC4GI13 (remplacé par LFC4GI16)
Raison : Nouveau système de codage en 1998
6. **Classification type des professions pour l'emploi principal**
Nom au cycle 2 : LFC6CSOC (remplacé par LFC6CO91)
Nom au cycle 1 : LFC4CSOC (remplacé par LFC4CO91)
Raison : Nouveau système de codage en 1998
7. **Classification type des industries pour l'emploi principal**
Nom au cycle 2 : LFC6CSIC (remplacée par LFC6C197)
Nom au cycle 1 : LFC4CSIC (remplacée par LFC4C197)
Raison : Nouveau système de codage en 1998
8. **Indice socio-économique Blisshen pour l'emploi principal**
Nom au cycle 2 : LFC6DBLI
Nom au cycle 1 : LFC4DBLI
Raison : Nouveau système de codage en 1998
9. **Classification socio-économique Pineo / activité principale**
Nom au cycle 2 : LFC6DPIN
Nom au cycle 1 : LFC4DPIN
Raison : Nouveau système de codage en 1998
10. **Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période - Groupé**
Nom au cycle 3 : LFC8G17A
Nom au cycle 2 : LFC6G17A
Raison : variable regroupée (FMGD seulement)

11. *Raisons pour ne pas travailler au moment de l'enquête - Groupé*

Nom au cycle 3 : LFC8G17B

Nom au cycle 2 : LFC6G17B

*Nom au cycle 1 : S.O. (*LFC4G17B* (anciennement *DVREAS94*))

Raison : Variable regroupée (*FMGD* seulement)

**LFC4G17B est toujours dans le fichier longitudinal parce que LFC4_17B n'existait pas au cycle 1 (voir 17.2). LFC6G17B et LFC4G17B ont été abandonnées.*

12. *Changement d'emploi entre cycle 1 et cycle 2*

Nom au cycle 2 : LFC6LEMP

Raison : Les données ne permettent pas un calcul final.

18. PARTICIPATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL (LS)**18.1 Situation des étudiants en regard de l'activité au cours des 12 derniers mois**

Nom au cycle 5 : LSC2DSWS

Nom au cycle 4 : LSC0DSWS

Nom au cycle 3 : S.O.

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : S.O.

Basé sur EDC_n_1, EDC_n_2, DHC_n_AGE et LSC_nDYWS (Source : LSC_n_1, LSC_n_2, LSC_n_11, LSC_n_21 et LSC_n_22). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que EDC_nDLF au cycle 1 (1994), cycle 2 (1996), et cycle 3 (1998).

Cette variable dérivée indique la situation du répondant (si un étudiant) en regard de l'activité.

Code	Description	Condition
1	A travaillé durant les 12 derniers mois et est actuellement aux études à temps plein.	EDC _n _1=1 et EDC _n _2=1 et LSC _n DYWS=1 ou 2
2	A travaillé durant les 12 derniers mois et est actuellement aux études à temps partiel.	EDC _n _1=1 et EDC _n _2=2 et LSC _n DYWS=1 ou 2
3	N'a pas travaillé durant les 12 derniers mois et est actuellement aux études à temps plein.	EDC _n _1=1 et EDC _n _2=1 et LSC _n DYWS=3 ou 4 ou 5 ou 6
4	N'a pas travaillé durant les 12 derniers mois et est actuellement aux études à temps partiel.	EDC _n _1=1 et EDC _n _2=2 et LSC _n DYWS=3 ou 4 ou 5 ou 6
6	Sans objet	EDC _n _1=2 ou EDC _n _1=6 ou LSC _n DYWS=96; DHC _n _AGE<15 ou >75
9	Non déclaré	Autrement

18.2 Situation actuelle en regard de l'activité

Nom au cycle 5 : LSC2DCWS

Nom au cycle 4 : LSC0DCWS

Nom au cycle 3 : S.O.

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : S.O.

Basé sur : LSC_n_1, LSC_n_2 et DHC_n_AGE.

Cette variable dérivée classe le répondant selon la situation actuelle en regard de l'activité au cours de la semaine précédant l'interview.

Code	Description	Condition
1	Avait un emploi - a travaillé la semaine dernière	LSC _n _1=1
2	Avait un emploi - absent du travail la semaine dernière	LSC _n _2=1
3	N'avait pas d'emploi la semaine dernière	LSC _n _2=2
4	Incapacité permanente	LSC _n _1=3
6	Sans objet	DHC _n _AGE<15 ou >75 ou LSC _n _1=6
9	Non déclaré	LSC _n _1=7,8 ou 9 ou LSC _n _2=7,8 ou 9

18.3 Situation en regard de l'activité au cours des 12 derniers mois

Nom au cycle 5 : LSC2DYWS

Nom au cycle 4 : LSC0DYWS

Nom au cycle 3 : S.O.

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : S.O.

Basé sur LSC_n_1, LSC_n_2, LSC_n_11, LSC_n_21, LSC_n_22 et DHC_n_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC_nDCWS au cycle 1 (1994), cycle 2 (1996), et cycle 3 (1998).

Code	Description	Condition
1	Avait un emploi la semaine dernière	LSC _n _1=1 ou LSC _n _2=1
2	N'avait pas d'emploi, mais a travaillé au cours des 12 derniers mois	LSC _n _1=2 et LSC _n _21=1
3	N'avait pas d'emploi au cours des 12 derniers mois et a cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	LSC _n _11=1 et LSC _n _21=2
4	N'avait pas d'emploi au cours des 12 derniers mois et a cherché du travail au cours des 12 derniers mois	LSC _n _21=2 et (LSC _n _11=1 ou LSC _n _22=1)
5	N'avait pas d'emploi au cours des 12 derniers mois et n'a pas cherché de travail au cours des 12 derniers mois	LSC _n _21=2 et (LSC _n _11=2 et LSC _n _22=2)
6	Incapacité permanente	LSC _n _1=3
96	Sans objet	DHC _n _AGE<15 ou >75 ou LSC _n _1=6
99	Non déclaré	LSC _n _1=(7, 8 ou 9) ou LSC _n _2=(7, 8 ou 9) ou LSC _n _11=(7, 8 ou 9) ou LSC _n _21=(7, 8 ou 9) ou LSC _n _22=(7, 8 ou 9)

18.4 Raison principale pour ne pas avoir travaillé la semaine dernière

Nom au cycle 5 : LSC2DRNW

Nom au cycle 4 : LSC0DRNW

Nom au cycle 3 : S.O.

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : S.O.

Basé sur LSC_n_1, LSC_n_11, LSC_n_12, LSC_n_13, LSC_n_41 et DHC_n_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC_nG17A au cycle 2 (1996), et cycle 3 (1998).

Cette variable dérivée indique la raison principale pour laquelle le répondant ne travaillait pas au cours de la semaine précédant l'interview.

Code	Description	Condition
1	Incapacité permanente	LSC _n _1=3
2	Maladie ou incapacité de l'enquêté(e)	LSC _n _13=1 ou LSC _n _41=1
3	Soins à donner - à ses enfants	LSC _n _13=2 ou LSC _n _41=2
4	Soins à donner - à des personnes âgées apparentées	LSC _n _13=3 ou LSC _n _41=3
5	Grossesse / congé de maternité	LSC _n _13=4 ou LSC _n _41=4
6	Autres obligations personnelles ou familiales	LSC _n _13=5 ou LSC _n _41=5
7	Vacances	LSC _n _13=6 ou LSC _n _41=6
8	École ou congé d'études	LSC _n _13=7 ou LSC _n _41=14
9	A pris sa retraite	LSC _n _13=8
10	Croyait qu'il n'y avait pas de travail (dans la région correspondant à ses compétences)	LSC _n _13=9
11	Conflit de travail	LSC _n _41=7
12	Mise à pied temporaire due à la conjoncture économique	LSC _n _41=8
13	Mise à pied saisonnière	LSC _n _41=9
14	Travail occasionnel, manque de travail	LSC _n _41=10
15	Travail à son compte, manque de travail	LSC _n _41=12
16	Activité saisonnière	LSC _n _41=13
17	À la recherche d'un emploi	LSC _n _11=1
18	Horaire de travail	LSC _n _41=11
19	Emploi devant débiter	LSC _n _12=1
20	Autre	LSC _n _13=10 ou LSC _n _41=15
96	Sans objet (répondant au travail)	LSC _n _1=1 ou 6 ou (DHC _n _AGE<15 ou >75)
99	Non déclaré	(LSC _n _11=7, 8 ou 9) ou (LSC _n _13=97, 98 ou 99) ou (LSC _n _41=97, 98 ou 99)

18.5 **Emplois multiples**

Nom au cycle 5 : LSC2DMJS
 Nom au cycle 4 : LSC0DMJS
 Nom au cycle 3 : S.O.
 Nom au cycle 2 : S.O.
 Nom au cycle 1 : S.O.

Basé sur LSCn_1, LSCn_3, LSCn_21, LSCn_23, LSCn_51 et DHCn_AGE.

Cette variable dérivée permet de classer le répondant en fonction du fait qu'il a eu et qu'il a ou non des emplois multiples au cours de la dernière année.

Code	Description	Condition
1	Travaille actuellement à plus d'un emploi - occupait tous les emplois l'an dernier	LSCn_51 =52 et LSCn_3=1
2	Travaille actuellement à plus d'un emploi - ne les occupait pas tous l'an dernier	LSCn_3 =1 et LSCn_51 <52
3	N'a actuellement qu'un seul emploi	LSCn_3 =2
4	N'a actuellement pas d'emploi - travaillait à plus d'un emploi l'année dernière	LSCn_23 =1
5	N'a actuellement pas d'emploi - ne travaillait qu'à un emploi à la fois au cours des 12 derniers mois	LSCn_23 =2
6	N'a actuellement pas d'emploi - pas d'emploi l'année dernière	LSCn_21 =2
96	Sans objet	DHCn_AGE <15 ou >75 ou LSCn_1=6
99	Non déclaré	(LSCn_3 =7, 8 ou 9) ou (LSCn_21 =7, 8 ou 9) ou (LSCn_23 =7, 8 ou 9) ou (LSCn_3=1 et LSCn_51 =97, 98 ou 99)

18.6 **Total du nombre habituel d'heures de travail par semaine**

Nom au cycle 5 : LSC2DHPW
 Nom au cycle 4 : LSC0DHPW
 Nom au cycle 3 : S.O.
 Nom au cycle 2 : S.O.
 Nom au cycle 1 : S.O.

Basé sur LSCn_1, LSCn_42, LSCn_53 et DHCn_AGE.

Cette variable dérivée donne le nombre total d'heures travaillées par semaine par le répondant.

Code	Description	Condition
LSCn_42	Le nombre d'heures habituellement travaillées dans le cas des répondants n'ayant qu'un emploi	LSCn_42<996 et LSCn_53=996
LSCn_42 + LSCn_53	Le nombre d'heures habituellement travaillées par les répondants qui ont plus d'un emploi	LSCn_42<996 et LSCn_53<996
996	Sans objet	DHCn_AGE<15 ou >75 (LSCn_1=6) ou LSCn_42=996

Code	Description	Condition
999	Non déclaré	(LSC _{n_42} =997, 998 ou 999) ou (LSC _{n_53} =997, 998 ou 999)

18.7 État de l'emploi - plein temps ou temps partiel (pour le total des heures habituelles)

Nom au cycle 5 : LSC2DPFT

Nom au cycle 4 : LSC0DPFT

Nom au cycle 3 : S.O.

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : S.O.

Basé sur DHC_n_AGE et LSC_nDHPW (Source : LSC_{n_1}, LSC_{n_42}, LSC_{n_53}).

Cette variable dérivée indique si le répondant travaillait à temps plein ou à temps partiel.

Code	Description	Condition
1	Temps plein (30 heures ou plus)	LSC _n DHPW >= 30
2	Temps partiel (moins de 30 heures)	LSC _n DHPW < 30
6	Sans objet	LSC _n DHPW = 96
9	Non déclaré	Autrement

18.8 Situation en regard de l'activité au cours de la dernière année

Nom au cycle 5 : LSC2DJST

Nom au cycle 4 : LSC0DJST

Nom au cycle 3 : S.O.

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : S.O.

Basé sur LSC_{n_1}, LSC_{n_11}, LSC_{n_22}, LSC_{n_61}, LSC_{n_71} et DHC_n_AGE.

Cette variable dérivée indique la situation d'emploi du répondant au cours de la dernière année.

Code	Description	Condition
1	Le répondant avait un emploi tout au long de la dernière année	LSC _{n_61} =52
2	Le répondant n'avait pas d'emploi et était à la recherche de travail tout au long de la dernière année	LSC _{n_71} =52
3	Le répondant n'avait pas d'emploi et ne cherchait pas de travail tout au long de la dernière année	LSC _{n_22} =2
4	Le répondant avait un emploi pendant une partie de l'année - était sans emploi et à la recherche de travail pendant l'autre partie de l'année	(LSC _{n_61} + LSC _{n_71})=52 et (LSC _{n_71} >0 et <52) et (LSC _{n_61} <52)
5	Le répondant avait un emploi une partie de l'année - était sans emploi et ne cherchait pas de travail pendant l'autre partie de l'année	LSC _{n_61} <52 et LSC _{n_71} =0

Code	Description	Condition
6	Le répondant n'avait pas d'emploi et était à la recherche de travail pendant une partie de l'année - était sans emploi et n'était pas à la recherche de travail pendant l'autre partie de l'année	$LSCn_{71} < 52$ et $LSCn_{21} = 2$ et ($LSCn_{11} = 1$ ou $LSCn_{22} = 1$)
7	Le répondant avait un emploi une partie de l'année - était sans emploi et cherchait du travail pendant une partie de l'année - était sans emploi et ne cherchait pas de travail pendant l'autre partie de l'année	$(LSCn_{61} + LSCn_{71}) < 52$ et $(LSCn_{71} > 0$ et $< 52)$ et $(LSCn_{61} < 52)$
96	Sans objet	$DHCn_{AGE} < 15$ ou > 75 ($LSCn_1 = 6$)
99	Non déclaré	$(LSCn_{22} = 7, 8$ ou $9)$ ou $(LSCn_{61} = 97, 98$ ou $99)$ ou $(LSCn_{71} = 97, 98$ ou $99)$

19. SANTÉ MENTALE (MH)**19.1 Échelle de détresse**

Nom au cycle 5 : MHC2DDS

Nom au cycle 4 : MHC0DDS

Nom au cycle 3 : MHC8DDS

Nom au cycle 2 : MHC6DDS

Nom au cycle 1 : MHC4DDS (*anciennement DVMHDS94*)

Site Internet : National Comorbidity Survey : www.hcp.med.harvard.edu/ncs/
 Composite International Diagnostic Interview (CIDI) : www.who.int/msa/cidi/index.htm

Basé sur la somme des réponses aux questions MHC_n_1A à MHC_n_1F.

MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée)

Les résultats ont été inversés pour les questions MHC_n_1A, 1B, 1C, 1D, 1E et 1F.

Cette variable dérivée détermine l'échelle de détresse du répondant. Les questions et les cotes utilisées pour calculer l'échelle de détresse sont basées sur les travaux de Kessler et Mroczek (de l'Université du Michigan). L'indice se fonde sur un sous-ensemble de questions de la *Composite International Diagnostic Interview (CIDI)*. La CIDI est un instrument diagnostique structuré conçu pour produire des diagnostics conformes aux définitions et critères du DSM-III-R et des Critères diagnostiques pour la recherche de la Classification internationale des maladies, 10^{ième} révision (CIM-10)).

Code	Description	Condition
0-24	Valeur de l'indice (cote)	Somme des résultats des questions MHC _n _1A à MHC _n _1F. Tous les résultats ont été inversés et convertis selon une échelle de 0 à 4.
96	Sans objet	MHC _n _1A=6
99	Non déclaré	Une question parmi MHC _n _1A à MHC _n _1F est égale à 7, 8 ou 9

19.2 Échelle de chronicité de la détresse

Nom au cycle 5 : MHC2DCH

Nom au cycle 4 : MHC0DCH

Nom au cycle 3 : MHC8DCH

Nom au cycle 2 : MHC6DCH

Nom au cycle 1 : MHC4DCH (*anciennement DVMHCH94*)

Site Internet : National Comorbidity Survey : www.hcp.med.harvard.edu/ncs/
 Composite International Diagnostic Interview (CIDI) : www.who.int/msa/cidi/index.htm

Basé sur MHC_n_1G à MHC_n_1I.

Appariement de l'échelle susmentionnée (MHC_nDDS) et des réponses aux questions MHC_n_1G à MHC_n_1I qui évaluent la chronicité de la détresse et de l'affaiblissement lié à la détresse.

Code	Description	Condition
1	Beaucoup plus souvent que d'habitude	MHCn_1H=1
2	Plutôt plus souvent que d'habitude	MHCn_1H=2
3	Un peu plus souvent que d'habitude	MHCn_1H=3
4	Sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude	MHCn_1G=3
5	Un peu moins souvent que d'habitude	MHCn_1I=3
6	Plutôt moins souvent que d'habitude	MHCn_1I=2
7	Beaucoup moins souvent que d'habitude	MHCn_1I=1
8	N'a jamais ressenti ces sentiments	MHCn_1G=4
96	Sans objet	MHCn_1G=6
99	Non déclaré	Toute autre condition

19.3 Échelle de dépression - cote du questionnaire abrégé

Nom au cycle 5 : MHC2DSF

Nom au cycle 4 : MHC0DSF

Nom au cycle 3 : MHC8DSF

Nom au cycle 2 : MHC6DSF

Nom au cycle 1 : MHC4DSF (anciennement DVFSFS94)

Site Internet : National Comorbidity Survey : www.hcp.med.harvard.edu/ncs/
Composite International Diagnostic Interview (CIDI) : www.who.int/msa/cidi/index.htm

Basé sur MHCn_2, MHCn_3, MHCn_4, MHCn_5, MHCn_6, MHCn_8A, MHCn_8B, MHCn_10, MHCn_11, MHCn_12, MHCn_13, MHCn_16, MHCn_17, MHCn_18, MHCn_19, MHCn_21A, MHCn_21B, MHCn_23, MHCn_24, MHCn_25 et MHCn_26.

La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée

Cette variable dérivée évalue l'état de dépression du répondant. Les questions utilisées pour évaluer la dépression se fondent sur les travaux de Kessler et Mroczek (de l'Université du Michigan). Ces chercheurs ont sélectionné un sous-ensemble de questions de la *Composite International Diagnostic Interview (CIDI)* qui permet de déterminer si la personne a vécu un épisode de dépression majeure (EDM). La CIDI est un instrument diagnostique structuré conçu pour produire des diagnostics conformément aux définitions et critères du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-III-R) et des Critères diagnostiques pour la recherche de la CIM-10. Le questionnaire abrégé utilisé dans le cadre de l'ENSP pour évaluer l'EDM a été mis au point de façon à appliquer les critères A à C de diagnostic de l'EDM du DSM-III-R. On n'a pas tenu compte des règles hiérarchiques de diagnostic définies au critère D (« non superposée à une schizophrénie, un trouble schizophréniforme, un trouble délirant ou un trouble psychotique n.c.a. »).

Nota : Les questions relatives à l'épisode de dépression majeure visaient à déterminer les périodes au cours desquelles le répondant s'est senti triste ou déprimé ou a perdu tout intérêt au cours des 12 derniers mois. Cela comprend les périodes normales de tristesse (par exemple, après le décès d'un être aimé) de même que la dépression grave. Au départ, on demandait au répondant s'il avait expérimenté une période de tristesse ou de dépression pendant au moins deux semaines consécutives. S'il répondait « Non », alors on lui posait la question MHCn_16 pour savoir s'il avait perdu tout intérêt pendant une période de deux semaines, ce qui permettait également d'évaluer les symptômes dépressifs du répondant.

19.4 **Échelle de dépression - probabilité prévue**

Nom au cycle 5 : MHC2DPP
 Nom au cycle 4 : MHC0DPP
 Nom au cycle 3 : MHC8DPP
 Nom au cycle 2 : MHC6DPP
 Nom au cycle 1 : MHC4DPP (*anciennement DVPP94*)

Site Internet : National Comorbidity Survey : www.hcp.med.harvard.edu/ncs/
 Composite International Diagnostic Interview (CIDI) : www.who.int/msa/cidi/index.htm

Basé sur MHCnDSF (Source : MHCn_2 à MHCn_28)

On a attribué la probabilité prévue (MHCnDPP) aux répondants en fonction de la cote calculée d'après les réponses au questionnaire abrégé. On a attribué une probabilité nulle (0) de constituer un cas aux répondants qui ont répondu « Non » aux questions de base. La valeur de MHCnDPP a été attribuée comme suit:

MHCnDSF =	0	1	2	3	4	>4	96	99
MHCnDPP =	0	0,05	0,25	0,5	0,8	0,9	9,96	9,99

19.5 **Nombre de semaines (pendant lesquelles le répondant) s'est senti déprimé**

Nom au cycle 5 : MHC2DWK
 Nom au cycle 4 : MHC0DWK
 Nom au cycle 3 : MHC8DWK
 Nom au cycle 2 : MHC6DWK
 Nom au cycle 1 : MHC4DWK (*anciennement DVMHWW94*)

Basé sur MHCn_14 ou MHCn_27. Réponse à une seule question.

Cette variable dérivée indique le nombre de semaines pendant lesquelles le répondant s'est senti déprimé.

Code	Description	Condition
2-52	Nombre de semaines durant lesquelles le répondant était déprimé au cours de la dernière année. (Valeur de MHCn_14)	(MHCn_14<96)
2-52	Nombre de semaines durant lesquelles le répondant a perdu tout intérêt au cours de la dernière année. (Valeur de MHCn_27)	(MHCn_14>=96) et (MHCn_27<96)
96	Répondant non déprimé ou « Sans objet ». (p. ex. exclu de la population)	MHCnDSF=96 ou (MHCn_14=96 et MHCn_27=96)
99	Le répondant n'a pas répondu à la question.	MHCnDSF=99 ou MHCn_14>96 ou MHCn_27>96

19.6 **Mois au cours duquel le répondant s'est senti déprimé la dernière fois**

Nom au cycle 5 : MHC2DMT
 Nom au cycle 4 : MHC0DMT
 Nom au cycle 3 : MHC8DMT
 Nom au cycle 2 : MHC6DMT
 Nom au cycle 1 : MHC4DMT (*anciennement DVMHMT94*)

Basé sur MHCn_15 ou MHCn_28. Réponse à une seule question.

Cette variable dérivée détermine le mois au cours duquel le répondant s'est senti déprimé la dernière fois.

Code	Description	Condition
1-12	Mois spécifique pour lequel le répondant s'est senti déprimé pendant au moins deux semaines consécutives. (Valeur de <i>MHCn_15</i>)	$MHCn_{14} < 52$ et $MHCn_{15} < 96$
1-12	Mois spécifique pour lequel le répondant a perdu tout intérêt pendant au moins deux semaines consécutives. (valeur de <i>MHCn_28</i>)	$MHCn_{14} = 96$ et $MHCn_{27} < 52$ et $MHCn_{28} < 96$
96	Répondant non déprimé ou sans objet. (p. ex. exclu de la population)	$MHCn_{14} = 96$ et $MHCn_{27} = 96$
99	Le répondant n'a pas répondu à la question ou à été déprimé pendant plus de 51 semaines au cours de la dernière année.	$(MHCn_{14} = 52, 53, 97, 98$ ou $99)$ ou $(MHCn_{15} = 97, 98$ ou $99)$ ou $(MHCn_{27} = 52, 53, 97, 98$ ou $99)$ ou $(MHCn_{28} = 97, 98$ ou $99)$

VARIABLES RELATIVES À LA SANTÉ MENTALE SUPPRIMÉES :

1. Nombre de consultations - Professionnel de la santé / santé mentale

Nom au cycle 3 : MHC8G1L

Nom au cycle 2 : MHC6G1L

Nom au cycle 1 : S.O. (anciennement *MH_Q1L*)

Raison : Variable regroupée (*FMGD* seulement)

20. NUTRITION (NU)**20.1 Consommation quotidienne totale de fruits et de légumes**

Nom au cycle 5 : FV_2DTOT

Nom au cycle 4 : S.O.

Nom au cycle 3 : S.O.

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : S.O.

Basé sur FV_n_1A à FV_n_6B.

Cette variable dérivée représente la consommation quotidienne totale de fruits et de légumes. Elle a été créée à partir des variables de la consommation annuelle FV_Q1AY à FV_Q6AY (elles-mêmes créées lors du processus de reformatage à partir des variables FV_n_1A à FV_n_6B). On fait la somme des variables de la consommation annuelle que l'on divise ensuite par 365 pour obtenir une valeur agrégée de la consommation quotidienne de fruits et de légumes. Seule la consommation quotidienne totale agrégée est montrée, puisqu'il convient d'analyser les variables de la consommation de fruits et de légumes comme un tout, et non pas indépendamment les unes des autres.

Code	Description	Condition
0 - 120	Nombre total de portions de fruits et de légumes par jour	$(FV_Q1AY + FV_Q2AY + FV_Q3AY + FV_Q4AY + FV_Q5AY + FV_Q6AY)/365$
99,96	Sans objet	FV_n_1A=996
99,99	Non déclaré	Toute valeur de FV_n_1A à FV_n_6A=999

20.2 Nombre de raisons de choisir ou d'éviter des aliments

Nom au cycle 5 : S.O.

Nom au cycle 4 : S.O.

Nom au cycle 3 : NU_8D1

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : S.O.

Source : Santé Canada, Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition

Basé sur NU_n_1A à NU_n_1G.

Code	Description	Condition
0	Aucune	Nombre de « Oui » dans NU_n_1A à NU_n_1G
1	Une	Nombre de « Oui » dans NU_n_1A à NU_n_1G
2	Deux	Nombre de « Oui » dans NU_n_1A à NU_n_1G
3	Trois	Nombre de « Oui » dans NU_n_1A à NU_n_1G
4	Quatre	Nombre de « Oui » dans NU_n_1A à NU_n_1G
5	Cinq	Nombre de « Oui » dans NU_n_1A à NU_n_1G

Code	Description	Condition
6	Six	Nombre de « Oui » dans NU_n_1A à NU_n_1G
7	Sept	Nombre de « Oui » dans NU_n_1A à NU_n_1G
96	Sans objet	NU_n_1A=6
99	Non déclaré	Une question parmi NU_n_1A à NU_n_1G égale à 7, 8 ou 9

20.3 Nombre de raisons de choisir des aliments

Nom au cycle 5 : S.O.

Nom au cycle 4 : S.O.

Nom au cycle 3 : NU_8D2

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : S.O.

Source : Santé Canada, Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition

Basé NU_n_2A à NU_n_2E.

Code	Description	Condition
0	Aucune	Nombre de « Oui » dans NU_n_2A à NU_n_2E
1	Une	Nombre de « Oui » dans NU_n_2A à NU_n_2E
2	Deux	Nombre de « Oui » dans NU_n_2A à NU_n_2E
3	Trois	Nombre de « Oui » dans NU_n_2A à NU_n_2E
4	Quatre	Nombre de « Oui » dans NU_n_2A à NU_n_2E
5	Cinq	Nombre de « Oui » dans NU_n_2A à NU_n_2E
96	Sans objet	NU_n_2A=6
99	Non déclaré	Une question parmi NU_n_2A à NU_n_2E égale à 7, 8 ou 9

20.4 Nombre de raisons d'éviter des aliments

Nom au cycle 5 : S.O.

Nom au cycle 4 : S.O.

Nom au cycle 3 : NU_8D3

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : S.O.

Source : Santé Canada, Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition

Basé NU_n_3A à NU_n_3G.

Code	Description	Condition
0	Aucune	Nombre de « Oui » dans NU_n_3A à NU_n_3G
1	Une	Nombre de « Oui » dans NU_n_3A à NU_n_3G
2	Deux	Nombre de « Oui » dans NU_n_3A à NU_n_3G
3	Trois	Nombre de « Oui » dans NU_n_3A à NU_n_3G

4	Quatre	Nombre de « Oui » dans NU_n_3A à NU_n_3G
5	Cinq	Nombre de « Oui » dans NU_n_3A à NU_n_3G
6	Six	Nombre de « Oui » dans NU_n_3A à NU_n_3G
7	Sept	Nombre de « Oui » dans NU_n_3A à NU_n_3G
96	Sans objet	NU_n_3A=6
99	Non déclaré	Une question parmi NU_n_3A à NU_n_3G égale à 7, 8 ou 9

20.5 Nombre de raisons de choisir ou d'éviter des aliments (version courte)

Nom au cycle 5 : NU_2D4

Nom au cycle 4 : S.O.

Nom au cycle 3 : NU_8D4

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : S.O.

Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada

Basé sur NU_n_1A, NU_n_1C, NU_n_1D et NU_n_1E.

Cette variable dérivée est différente de NU_nD1; elle tient compte du fait que certaines questions du cycle 3 n'ont pas été posées au cycle 5 (NU_8_1B, NU_8_1F et NU_8_1G).

Code	Description	Condition
0	Aucune	Nombre de « Oui » dans NU_n_1A et NU_n_1C à NU_n_1E
1	Une	Nombre de « Oui » dans NU_n_1A et NU_n_1C à NU_n_1E
2	Deux	Nombre de « Oui » dans NU_n_1A et NU_n_1C à NU_n_1E
3	Trois	Nombre de « Oui » dans NU_n_1A et NU_n_1C à NU_n_1E
4	Quatre	Nombre de « Oui » dans NU_n_1A et NU_n_1C à NU_n_1E
6	Sans objet	NU_n_1A=6
9	Non déclaré	Une question parmi NU_n_1A ou NU_n_1C à NU_n_1E égale à 7, 8 ou 9

20.6 Nombre de raisons de choisir des aliments (version courte)

Nom au cycle 5 : NU_2D5

Nom au cycle 4 : S.O.

Nom au cycle 3 : NU_8D5

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : S.O.

Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada

Basé sur NU_n_2A à NU_n_2C.

Cette variable dérivée est différente de NU_nD2; elle tient compte du fait que certaines questions du cycle 3 n'ont pas été posées au cycle 5 (NU_8_2D et NU_8_2E).

Code	Description	Condition
0	Aucune	Nombre de « Oui » dans NU_n_2A à NU_n_2C
1	Une	Nombre de « Oui » dans NU_n_2A à NU_n_2C
2	Deux	Nombre de « Oui » dans NU_n_2A à NU_n_2C
3	Trois	Nombre de « Oui » dans NU_n_2A à NU_n_2C
6	Sans objet	NU_n_2A=6
9	Non déclaré	Une question parmi NU_n_2A à NU_n_2C égale à 7, 8 ou 9

20.7 Nombre de raisons d'éviter des aliments (version courte)

Nom au cycle 5 : NU_2D6

Nom au cycle 4 : S.O.

Nom au cycle 3 : NU_8D6

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : S.O.

Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada

Basé sur NU_n_3A à NU_n_3D et NU_n_3G.

Cette variable dérivée est différente de NU_nD3; elle tient compte du fait que certaines questions du cycle 3 n'ont pas été posées au cycle 5 (NU_8_3E et NU_8_3F)

Code	Description	Condition
0	Aucune	Nombre de « Oui » dans NU_n_3A à NU_n_3D et NU_n_3G
1	Une	Nombre de « Oui » dans NU_n_3A à NU_n_3D et NU_n_3G
2	Deux	Nombre de « Oui » dans NU_n_3A à NU_n_3D et NU_n_3G
3	Trois	Nombre de « Oui » dans NU_n_3A à NU_n_3D et NU_n_3G
4	Quatre	Nombre de « Oui » dans NU_n_3A à NU_n_3D et NU_n_3G
5	Cinq	Nombre de « Oui » dans NU_n_3A à NU_n_3D et NU_n_3G
6	Sans objet	NU_n_3A=6
9	Non déclaré	Une question parmi NU_n_3A à NU_n_3D ou NU_n_3G égale à 7, 8 ou 9

20.8 Fréquence de la consommation de suppléments de vitamines ou de minéraux

Nom au cycle 5 : NU_2DCON

Nom au cycle 4 : S.O.

Nom au cycle 3 : NU_8DCON

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : S.O.

Basé sur NU_n_4A à NU_n_4C.

Code	Description	Condition
1	Pas de consommation au cours des quatre dernières semaines	NU_n_4A=2
2	Consommation occasionnelle au cours des quatre dernières semaines	NU_n_4B=2
3	Consommation régulière au cours des quatre dernières semaines - 1 à 2 jours la dernière semaine	NU_n_4C=1 ou 2
4	Consommation régulière au cours des quatre dernières semaines - 3 à 4 jours la dernière semaine	NU_n_4C=3 ou 4
5	Consommation régulière au cours des quatre dernières semaines - 5 à 6 jours la dernière semaine	NU_n_4C=5 ou 6
6	Consommation régulière au cours des quatre dernières semaines - 7 jours la dernière semaine	NU_n_4C=7
96	Sans objet	NU_n_4A=6
99	Non déclaré	Autrement

21. ACTIVITÉS PHYSIQUES (PA)

21.1 Dépense d'énergie

Nom au cycle 5 : PAC2DEE

Nom au cycle 4 : PAC0DEE

Nom au cycle 3 : PAC8DEE

Nom au cycle 2 : PAC6DEE

Nom au cycle 1 : PAC4DEE (*anciennement DVEE94*)

Site Internet : *L'Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode de vie :*
www.cflri.ca/

Basé sur PAC_n_1A à 1X, PAC_n_2A à 2X et PAC_n_3A à 3X. (La liste des activités est unique à chaque cycle).

La liste des activités (PAC_n_1) a subi des modifications minimales depuis 1994. En 1996, l'énoncé « patinage » de 1994 a été remplacé par « patinage sur glace ». En outre, on a supprimé de la liste « Yoga ou tai-chi » et on a ajouté « basket-ball ». En 1998, on a supprimé « ski de fond » de la liste et on y a ajouté « patin à roues alignées ». Il n'y a pas eu de changement en 2000. En 2002 « planche à neige » est incluse avec « ski alpin ».

Pour dériver l'indice d'activité physique, il faut estimer la dépense d'énergie (DE) des participants durant les activités de loisirs. On se fonde, pour calculer la DE, sur la fréquence et sur la durée des séances d'activité physique, ainsi que sur la valeur de la MET. La MET représente la demande d'énergie métabolique exprimée sous forme de multiple du taux de métabolisme au repos. Donc, une activité de 4 MET exige quatre fois la quantité d'énergie brûlée par l'organisme au repos.

On calcule les valeurs de la dépense d'énergie pour toutes les activités d'une journée de la façon suivante :

$$\text{DE (kcal/kg/jour)} = \text{Somme des } ((N_i * D_i * \text{valeur de la MET}) / 365)$$

N_i = nombre de fois que le répondant a fait une activité_i durant une période de 12 mois

D_i = durée moyenne, en heures, de l'activité_i (AVEDUR_i)

MET = demande d'énergie de l'activité, exprimée en kilocalories dépensées par kilo de masse corporelle par heure d'activité (kcal/kg par heure)/365 (pour convertir les données annuelles en données quotidiennes)

Code	Description	Condition
0	Ne fait pas d'activité physique	PAC _n _1V=1
0,1 - xx.x	Unités d'énergie (kcal/kg/jour)	Somme de (($N_i * D_i * \text{valeur de la MET}$) / 365)
99,6	Sans objet	PAC _n _1V=6
99,9	Non déclaré	PAC _n _1V dans (7, 8, 9)

En général, on regroupe les valeurs de la MET en trois niveaux d'intensité (c.-à-d. faible, moyenne et forte). Comme l'ENSP ne contient aucune question demandant de préciser le niveau d'intensité des activités physiques, on a utilisé les valeurs de la MET correspondant à une faible intensité pour chaque activité. Cette approche est celle adoptée par l'Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode de vie, car les gens ont tendance à surestimer l'intensité, la fréquence et la durée de leurs activités. Les valeurs de la MET sont :

Activité	Valeur de la MET, cycle 1	Valeur de la MET, cycle 2	Valeur de la MET, cycle 3	Valeur de la MET, cycle 4	Valeur de la MET, cycle 5
PACn_1A - Marche pour faire de l'exercice	3	3	3	3	3
PACn_1B - Jardinage ou travaux à l'extérieur	3	3	3	3	3
PACn_1C - Natation	3	3	3	3	3
PACn_1D - Bicyclette	4	4	4	4	4
PACn_1E - Danse moderne ou danse sociale	3	3	3	3	3
PACn_1F - Exercices à la maison	3	3	3	3	3
PACn_1G - Hockey sur glace	6	6	6	6	6
PACn_1H - Patinage sur glace (« patinage » au cycle 1)	4	4	4	4	4
PACn_1I - Ski alpin ou planche à neige	4	4	4	4	4
PACn_1J - Jogging ou course	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
PACn_1K - Golf	4	4	4	4	4
PACn_1L - Exercices dirigés ou aérobie	4	4	4	4	4
PACn_1M - Ski de fond	5	5	S.O.	S.O.	S.O.
PACn_1N - Quilles	2	2	2	2	2
PACn_1O - Baseball ou balle molle	3	3	3	3	3
PACn_1P - Tennis	4	4	4	4	4
PACn_1Q - Poids et haltères	3	3	3	3	3
PACn_1R - Pêche	3	3	3	3	3
PACn_1S - Volley-ball	5	5	5	5	5
PACn_1T - Basket-ball	S.O.	6	6	6	6
PACn_1Y - Patins à roues alignées	S.O.	S.O.	5	5	5
PACn_1Z - Yoga ou tai-chi	2	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
PACn_1U , PACn_1W, PACn_1X Autres activités (voir la note)	4,2	4	4	4	4

Nota : Puisqu'il est difficile d'attribuer une valeur de MET à la catégorie « Autres activités », la valeur utilisée est la moyenne des valeurs correspondant aux activités énumérées, sauf pour le jogging (valeur de la MET = 7) ou la course (valeur de la MET = 12). Pour ces deux activités, on a remplacé la moyenne par la valeur correspondant au jogging uniquement dans le calcul de la moyenne globale pour les « autres activités ». La valeur de la MET est inférieure à la moyenne pour certaines activités. Toutefois, cette approche concorde avec celle adoptée pour d'autres études, comme l'Enquête Campbell et l'Enquête sur la santé en Ontario (ESO).

On a calculé la valeur de **PACnDEE** d'après les réponses aux questions PACn_1n, PACn_2n et PACn_3n comme suit :

Somme des valeurs $((PACn_2n * 4) * AVEDUR * MET) / 365$

pour chaque activité PAC_n_1n (sauf la catégorie « Aucune ») où :

- PAC_n_1n = une activité
- PAC_n_2n *4 = le nombre de fois qu'a eu lieu chaque activité durant une période de 12 mois
- AVEDUR = durée moyenne, en heures, de chaque activité - PAC_n_3n
- MET = valeur correspondante de la MET en kcal/kg/h
- PAC_n_1n, PAC_n_2n, PAC_n_3n = PAC_n_1A...1X, PAC_n_2A....2X, PAC_n_3A....3X

Nota : Si PAC_n_2n ou PAC_n_3n est NSP, R ou N.D., la valeur de ((PAC_n_2n*4)*AVEDUR*MET) / 365 de cette activité = 0

Temps consacré chaque fois à l'activité (PAC _n _3n)	Durée moyenne attribuée (AVEDUR)
De 1 à 15 minutes	13 minutes ou 0,2167 heure
De 16 à 30 minutes	23 minutes ou 0,3833 heure
De 31 à 60 minutes	45 minutes ou 0,75 heure
Plus d'une heure	60 minutes ou 1 heure

21.2 Participant à une activité physique de loisir

Nom au cycle 5 : PAC2DLEI
 Nom au cycle 4 : PAC0DLEI
 Nom au cycle 3 : PAC8DLEI
 Nom au cycle 2 : PAC6DLEI
 Nom au cycle 1 : PAC4DLEI (anciennement DVPART94)

Source : Enquête sur la santé des Ontariens

Site Internet : www.chass.utoronto.ca/datalib/codebooks/utm/ohs/ohs90.htm

Basé sur PAC_n_1V.

Cette variable dérivée indique si le répondant a participé à des activités de loisirs dans les trois mois précédant l'interview.

Code	Description	Condition
1	Participant	PAC _n _1V=2
2	Non participant	PAC _n _1V=1
6	Sans objet	PAC _n _1V=6
9	Non déclaré	PAC _n _1V>6

21.3 Fréquence mensuelle des activités physiques durant plus de 15 minutes

Nom au cycle 5 : PAC2DFM
 Nom au cycle 4 : PAC0DFM
 Nom au cycle 3 : PAC8DFM
 Nom au cycle 2 : PAC6DFM
 Nom au cycle 1 : PAC4DFM (anciennement DVMOFQ94)

Source : Enquête sur la santé des Ontariens

Site Internet : www.chass.utoronto.ca/datalib/codebooks/utm/ohs/ohs90.htm

Basé sur PAC_n_1V, PAC_n_2A à PAC_n_2X et PAC_n_3A à PAC_n_3X (la liste des activités est unique à chaque cycle)

Cette variable dérivée indique le nombre de fois que la personne s'est livrée, au cours du dernier mois, à une activité physique de plus de 15 minutes. Il convient de souligner que la question se rapporte à une période de trois mois, mais que la variable se rapporte à une période d'un mois (la fréquence totale est divisée par trois).

Code	Description	Condition
0	Aucune activité physique	PAC _n _1V=1
1- xxx	Fréquence mensuelle	$\Sigma \text{PAC}_{n_2i} / 3$ où PAC _n _2 _i <996 et PAC _n _3 _i dans (2, 3, 4) pour i =A à X, excluant V.
996	Sans objet	PAC _n _1V=6
999	Non déclaré	PAC _n _1V dans (7, 8, 9)

21.4 Fréquence de toutes les activités physiques d'une durée de plus de 15 minutes

Nom au cycle 5 : PAC2DFR
 Nom au cycle 4 : PAC0DFR
 Nom au cycle 3 : PAC8DFR
 Nom au cycle 2 : PAC6DFR
 Nom au cycle 1 : PAC4DFR (*anciennement DVPAFQ94*)

Basé sur PAC_nDFM (Source : PAC_n_1V, PAC_n_2A à PAC_n_2X et PAC_n_3A à PAC_n_3X).

Cette variable dérivée permet de classer les répondants d'après la fréquence mensuelle de leurs activités physiques de plus de 15 minutes.

Code	Description	Condition
1	Régulière	PAC _n DFM >=12 fois et plus par mois
2	Occasionnelle	4 <= PAC _n DFM <= 11 fois par mois
3	Peu fréquente	0 <= PAC _n DFM <= 3 fois par mois
6	Sans objet	PAC _n DFM=996
9	Non déclaré	PAC _n DFM=999

21.5 Participation quotidienne à des activités physiques d'une durée de plus de 15 minutes

Nom au cycle 5 : PAC2DFD
 Nom au cycle 4 : PAC0DFD
 Nom au cycle 3 : PAC8DFD
 Nom au cycle 2 : PAC6DFD
 Nom au cycle 1 : PAC4DFD (*anciennement DVAFQ94*)

Basé sur PAC_nDFM. (Source : PAC_n_1V, PAC_n_2A à PAC_n_2X et PAC_n_3A à PAC_n_3X).

Code	Description	Condition
1	Quotidienne	PACnDFM \geq 30 fois par mois et <996
2	Non quotidienne	PACnDFM<30 fois par mois
6	Sans objet	PACnDFM=996
9	Non déclaré	Autrement

21.6 Indice de l'activité physique

Nom au cycle 5 : PAC2DPAI

Nom au cycle 4 : PAC0DPAI

Nom au cycle 3 : PAC8DPAI

Nom au cycle 2 : PAC6DPAI

Nom au cycle 1 : PAC4DPAI (anciennement DVPAID94)

Site Internet : L'Enquête Campbell sur le mieux-être au Canada :
www.cflri.ca/icrcp/ap/sondages/sondage_88.html

Basé sur PACnDEE (Source : PACn_1A à PACn_1X, PACn_2A à PACn_2X et PACn_3A à PACn_3X).

Les valeurs de la dépense d'énergie utilisées pour classer les personnes sont les mêmes que celles utilisées pour l'ESO et l'Enquête Campbell sur le mieux-être au Canada.

Code	Description	Condition
1	Actif	PACnDEE \geq 3,0 et <996. Cette valeur correspond approximativement à la quantité d'exercice nécessaire pour améliorer l'état de santé cardio-vasculaire.
2	Modérément actif	PACnDEE \geq 1,5 et <3,0. Ce niveau d'activité peut procurer une certaine amélioration de la santé, mais peu d'amélioration de la santé cardio-vasculaire.
3	Inactif	PACnDEE \geq 0 et <1,5
6	Sans objet	PACnDEE=996
9	Non déclaré	Autrement

22. LIMITATION DES ACTIVITÉS (RA)**22.1 Indicateur pour limitation d'activité**

Nom au cycle 5 : RAC2F1

Nom au cycle 4 : RAC0F1

Nom au cycle 3 : RAC8F1

Nom au cycle 2 : RAC6F1

Nom au cycle 1 : RAC4F1 (*anciennement RES_FLG*)Basé sur RAC_n_1A à RAC_n_1D et RAC_n_2.

Nota : Dans le calcul de l'indicateur de limitation des activités du cycle 1 (1994), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « Refus », mais dans celui des indicateurs du cycle 2 (1996) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe *uniquement* les réponses « Non ».

Code	Description	Condition
1	Oui	Toute valeur de RAC _n _1A à 1D=1 ou RAC _n _2=1
2	Non	(RAC _n _1A=2) et (RAC _n _1B=2 ou RAC _n _1B=3 ou RAC _n _1B=6) et (RAC _n _1C=2 ou RAC _n _1C=3 ou RAC _n _1C=6) et RAC _n _1D=2 et RAC _n _2=2
9	Non déclaré	RAC _n _1A à 1D=7, 8 ou 9 et RAC _n _2=7, 8 ou 9

22.2 Indicateur pour limitation d'activité excluant les invalidités ou handicaps de longue durée

Nom au cycle 5 : RAC2F2

Nom au cycle 4 : RAC0F2

Nom au cycle 3 : RAC8F2

Nom au cycle 2 : RAC6F2

Nom au cycle 1 : RAC4F2

Basé sur RAC_n_1A à RAC_n_1D.

Cette variable dérivée indique si l'état de santé du répondant se répercute sur sa participation.

Nota : Cette variable dérivée est parallèle à la variable examinée en 22.1, à l'exception que la question RAC_n_2 n'est pas prise en considération. Cette question qui porte sur « une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée » est assez différente des questions RAC_n_1A à 1D (limitation d'activité à la maison, à l'école, au travail, ou dans d'autres domaines comme le transport). On pense que cette question risque d'être interprétée en termes trop vastes. Cette variable dérivée a été établie dans le cadre de l'ESCC.

Code	Description	Condition
1	Oui	Toute valeur de RAC _n _1A à 1D=1
2	Non	(RAC _n _1A=2) et (RAC _n _1B=2 ou RAC _n _1B=3 ou RAC _n _1B=6) et (RAC _n _1C=2 ou RAC _n _1C=3 ou RAC _n _1C=6) et RAC _n _1D=2
9	Non déclaré	RAC _n _1A à 1D égale à 7, 8 ou 9

22.3 Indicateur pour besoin d'aide pour certaines tâches à l'intérieur

Nom au cycle 5 : RAC2F6

Nom au cycle 4 : RAC0F6

Nom au cycle 3 : RAC8F6 (anciennement RAC8D6G)

Nom au cycle 2 : RAC6F6 (anciennement RAC6D6G)

Nom au cycle 1 : S.O.

Basé sur RAC_n_6A à RAC_n_6F. Cette variable a été renommée au cycle 4.

Cette variable dérivée indique si le répondant a besoin ou non d'aide pour accomplir une série de tâches.

*RAC_nF6 n'a pas été calculé pour le cycle 1 parce que le type de réponse pour toutes ces questions était « choisissez toutes les réponses appropriées ».

Code	Description	Condition
1	Oui	Toute valeur de RAC _n _6A à RAC _n _6F=1
2	Non	Toutes les valeurs de RAC _n _6A à RAC _n _6F=2 ou (Pour les répondants en établissements) : (RAC _n _6A=6 et RAC _n _6E=2 et RAC _n _6F=2)
6	Sans objet	Toutes les valeurs de RAC _n _6A à RAC _n _6F=6 (Questions non demandées en raison de l'âge)
9	Non déclaré	Autrement

22.4 Indicateur pour besoin d'aide pour certaines tâches à l'intérieur et à l'extérieur

Nom au cycle 5 : RAC2F6X

Nom au cycle 4 : S.O.

Nom au cycle 3 : S.O.

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : S.O.

Basé sur RAC_n_6A à RAC_n_6G.

Nota : Cette variable dérivée est parallèle à la variable examinée en 22.3. Une nouvelle tâche a été ajoutée lors du cycle 5 (RAC_n_6G).

Code	Description	Condition
1	Oui	Toute valeur de RAC _n _6A à RAC _n _6G=1
2	No	Toutes les valeurs de RAC _n _6A à RAC _n _6G=2 ou (pour les répondants en établissements) : (RAC _n _6A=6 et RAC _n _6E=2 et RAC _n _6F=2 (et RAC _n _6G=2))
6	Sans objet	Toutes les valeurs de RAC _n _6A à RAC _n _6G=6 (questions non posées en raison de l'âge)
9	Non déclaré	Autrement

22.5 Principal problème de santé - 25 groupes

Nom au cycle 5 : RAC2GC25

Nom au cycle 4 : RAC0GC25

Nom au cycle 3 : RAC8GC25

Nom au cycle 2 : RAC6GC25

Nom au cycle 1 : RAC4GC25 (*anciennement DVRST94*)

Basé sur RACnCIC (la Classification internationale des maladies, 9^{ième} révision (CIM-9)). Voir Annexe A.

22.6 Principal problème de santé - 12 groupes

Nom au cycle 5 : RAC2GC12

Nom au cycle 4 : RAC0GC12

Nom au cycle 3 : RAC8GC12

Nom au cycle 2 : RAC6GC12

Nom au cycle 1 : RAC4GC12 (*anciennement DVRSTC94*)

Basé sur RACnGC25 (Source : RACnCIC).

Code	Description	Condition
1	Maladies du système nerveux et des organes des sens	RACnGC25=1, 2, 3, 4, 5
2	Cardiopathies ischémiques	RACnGC25=7
3	Autres maladies cardiaques	RACnGC25=6, 8
4	Autres maladies circulatoires	RACnGC25=9
5	Maladies des appareils respiratoire et digestif	RACnGC25=10, 11, 12, 13
6	Arthrite - membres	RACnGC25=15, 16
7	Arthrite - dos et colonne vertébrale	RACnGC25=17
8	Arthrite - autre et non précisé	RACnGC25=18
9	Maladies du système ostéoarticulaire - membres	RACnGC25=19,20
10	Maladies du système ostéoarticulaire - dos	RACnGC25=21
11	Autres maladies du système ostéoarticulaire	RACnGC25=22
12	Autre	RACnGC25=23, 24, 25,14
96	Sans objet	RACnGC25=96
99	Non déclaré	Autrement

VARIABLES RELATIVES À LA LIMITATION DES ACTIVITÉS SUPPRIMÉES :

- 1. Cause du problème de santé - Groupé**
Nom au cycle 3 : RAC8G5
Nom au cycle 2 : RAC6G5
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)

- 2. A besoin de l'aide - certaines tâches- Dérivé**
Nom au cycle 3 : RAC8D6G
Nom au cycle 2 : RAC6D6G
Raison : renommé à RACnF6 au cycle 4 (voir 22.3)

- 3. Principal problème de santé dérivé (selon la CIM-9) - 7 groupes**
Nom au cycle 3 : RAC8GC7
Nom au cycle 2 : RAC6GC7
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)

23. SOINS PERSONNELS (SC)**23.1 Attitude envers les soins personnels**

Nom au cycle 5 : S.O.

Nom au cycle 4 : S.O.

Nom au cycle 3 : SC_8DFCT

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : S.O.

Basé sur SC_n_12 à SC_n_16.

MIN = 0 (indique que la personne préfère se fier à un médecin)

MAX = 20 (indique que la personne préfère se soigner elle-même)

Les résultats ont été inversés pour les questions SC_n_12 et SC_n_15.

La valeur de la variable dérivée est fixée à « sans objet » pour les personnes de moins de 18 ans et celles en établissement, car les questions pertinentes ne leur ont pas été posées.

On a demandé aux répondants d'indiquer s'ils étaient d'accord ou en désaccord avec une série d'énoncés au moyen d'une échelle à cinq points où 1 correspond à « tout à fait d'accord » et 5 à « entièrement en désaccord », puis on a recodé les réponses pour les ramener dans la fourchette de 0 à 4 pour calculer les cotes. 0 indique que les personnes préfèrent se fier à un médecin et 4 qu'elles préfèrent se soigner elles-mêmes. Pour les questions SC_n_12 et SC_n_15, on a inversé l'échelle pour calculer la cote.

24. RENSEIGNEMENTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES (SD)**24.1 Langue(s) parlée(s) par le répondant**

Nom au cycle 5 : SDC2DLNG

Nom au cycle 4 : SDC0DLNG

Nom au cycle 3 : SDC8DLNG

Nom au cycle 2 : SDC6DLNG

Nom au cycle 1 : SDC4DLNG (*anciennement DVLANG94*)

Basé sur SDCn_5A à SDCn_5S.

Cette variable dérivée représente la ou les langues avec lesquelles le répondant peut communiquer.

Code	Description	Condition
1	Anglais uniquement	SDCn_5A=1
2	Français uniquement	SDCn_5B=1
3	Anglais et français uniquement	SDCn_5A=1 et SDCn_5B=1
4	Anglais, français et autre	SDCn_5A=1 et SDCn_5B=1 et une question parmi SDCn_5C à SDCn_5S=1
5	Anglais et autre (pas français)	SDCn_5A=1 et SDCn_5B ≠ 1 et une question parmi SDCn_5C à SDCn_5S=1
6	Français et autre (pas anglais)	SDCn_5B=1 et SDCn_5A ≠ 1 et SDCn_5A à SDCn_5S=1
7	Ni anglais ni français (autre)	Une question parmi SDCn_5C à SDCn_5S=1 et SDCn_5A et SDCn_5B ≠ 1
96	Sans objet	SDCn_5A=6
99	Non déclaré	Autrement

24.2 Origine culturelle ou raciale

Nom au cycle 5 : S.O.

Nom au cycle 4 : SDC0DRAC

Nom au cycle 3 : SDC8DRAC

Nom au cycle 2 : SDC6DRAC *(nouvelles catégories)

Nom au cycle 1 : SDC4DRAC (*anciennement DVRACE94*)

Basé sur SDCn_7A à SDCn_7L.

Cette variable dérivée indique la race d'origine du répondant.

Les définitions de SDC4DRAC sont différentes de celles de SDC6DRAC, SDC8DRAC et SDC0DRAC. Les catégories 10, 11 et 12 ne sont pas les mêmes due à un changement en 1996.
--

Code	Description	Condition
1	Blanc(che)	SDCn_7A=1
2	Noir(e)	SDCn_7D=1
3	Coréen(ne)	SDCn_7K=1
4	Philippin(e)	SDCn_7G=1
5	Japonais(e)	SDCn_7J=1
6	Chinois(e)	SDCn_7B=1
7	Autochtone	SDCn_7E=1
8	Asiatique du Sud	SDCn_7C=1
9	Asiatique du Sud-Est	SDCn_7H=1
10	Arabe ou Asiatique de l'Ouest	SDCn_7F=1
11	Latino-américain(e)	SDCn_7I=1
12	Races multiples	Plus d'une catégorie indiquée
96	Sans objet	SDCn_7A=6
99	Non déclaré	SDCn_7L=1 uniquement ou SDCn_7A=7, 8 ou 9

24.3 Nombre d'années au Canada depuis l'immigration

Nom au cycle 5 : SDC2DRES

Nom au cycle 4 : SDC0DRES

Nom au cycle 3 : SDC8DRES

Nom au cycle 2 : SDC6DRES

Nom au cycle 1 : SDC4DRES (*anciennement DVIMMIG*)

Basé sur DHCn_AGE, AM6n_BYE et YOI (Source : SDCn_3). Inclus les immigrants seulement.

Cette variable dérivée donne le nombre d'années vécues au Canada par le répondant depuis son immigration.

Code	Description	Condition
1-135	Années au Canada	SDCnDRES = AM6n_BYE - YOI ou si SDCnDRES > DHCn_AGE alors, SDCnDRES = DHCn_AGE
996	Sans objet (né au Canada)	YOI=9995 ou YOI=9996
999	Non déclaré	YOI=9997 ou 9998 ou 9999

VARIABLES RELATIVES AUX RENSEIGNEMENTS SOCO-DÉMOGRAPHIQUES SUPPRIMÉES :

1. **Âge au moment de l'immigration**
Nom au cycle 3 : SDC8DAIM
Nom au cycle 2 : SDC6DAIM
Nom au cycle 1 : SDC4DAIM (anciennement DVAGIM94)
Raison : Remplacée par la variable longitudinale - AOI
2. **Drapeau indiquant que le répondant est un immigrant**
Nom au cycle 3 : SDC8FIMM
Nom au cycle 2 : SDC6FIMM
Nom au cycle 1 : SDC4FIMM
Raison : Remplacée par la variable longitudinale - IMM
3. **Pays de naissance - 7 groupes**
Nom au cycle 1 : SDC4GCB7 (anciennement DVBORN94)
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)
4. **Pays de naissance - 4 groupes**
Nom au cycle 3 : SDC8GCB4
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)
5. **Code pour le pays de naissance**
Nom au cycle 3 : SDC8CB
Nom au cycle 2 : SDC6CB
Raison : Remplacée par la variable longitudinale - COBC
6. **Pays de naissance - Groupé**
Nom au cycle 3 : SDC8GCB
Nom au cycle 2 : SDC6GCB
Raison : Remplacée par la variable longitudinale - COBGC
7. **Race du répondant - Groupé**
Nom au cycle 3 : SDC8GRAC
Nom au cycle 2 : SDC6GRAC
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)
8. **Langue dans laquelle le répondant peut soutenir une conversation - Groupé**
Nom au cycle 2 : SDC6GLG4
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)
9. **Langue dans laquelle le répondant peut soutenir une conversation - Groupé**
Nom au cycle 3 : SDC8GLNG
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)
10. **Nombre d'année au Canada depuis l'immigration - Groupé**
Nom au cycle 3 : SDC8GRES
Nom au cycle 2 : SDC6GRES
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)

25. SANTÉ SEXUELLE (SH)**25.1 A eu au moins une maladie transmise sexuellement (MTS)**

Nom au cycle 5 : S.O.

Nom au cycle 4 : S.O.

Nom au cycle 3 : S.O.

Nom au cycle 2 : SHS6D1

Nom au cycle 1 : S.O.

Basé sur DHC_n_SEX et SHS_n_8 à SHS_n_16.

Code	Description	Condition
1	A été atteinte d'une maladie transmise sexuellement	Toute valeur de '1' de SHS _n _8 à SHS _n _16
2	N'a pas été atteinte d'une maladie transmise sexuellement	DHC _n _SEX=1 et '2' de SHS _n _8 à SHS _n _14; ou DHC _n _SEX=2 et '2' de SHS _n _8 à SHS _n _16
6	Sans objet	SHS _n _8=6
9	Non déclaré	Autrement

VARIABLES RELATIVES À LA SANTÉ SEXUELLE SUPPRIMÉES :**1. Âge de la première relation sexuelle**

Nom au cycle 2 : SHS6G2

Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)

26. USAGE DU TABAC (SM)**26.1 Teneur en goudron des cigarettes**

Nom au cycle 5 : SMC2DTAR

Nom au cycle 4 : S.O.

Nom au cycle 3 : S.O.

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : S.O.

Source : Santé Canada, Direction générale de la santé de la population et de la santé publique, Centre de prévention et de contrôle des maladies chroniques, Division intervention en cas de maladie, Section du développement et administration

Basé sur les codes des marques de cigarettes assignés lors du traitement, les marques sont classées selon leur teneur en goudron (en milligrammes).

Code	Description
1	Teneur en goudron 0 à 4 mg
2	Teneur en goudron 5 à 9 mg
3	Teneur en goudron 10 à 14 mg
4	Teneur en goudron 15+ mg
6	Sans objet
9	Non déclaré

*Nota : La catégorie « 9 » (non déclaré) comprend aussi les diverses marques de cigarettes qui ne sont plus en vente ou qui n'existaient pas. Elle comprend également les marques « sans nom » qu'il a été impossible de préciser.

26.2 Force des cigarettes fumées (descripteur)

Nom au cycle 5 : SMC2DSTR

Nom au cycle 4 : S.O.

Nom au cycle 3 : S.O.

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : S.O.

Source : Santé Canada, Direction générale de la santé de la population et de la santé publique, Centre de prévention et de contrôle des maladies chroniques, Division intervention en cas de maladie, Section du développement et administration

Basé sur les codes des marques de cigarettes assignés lors du traitement, les marques sont classées selon le descripteur figurant sur l'emballage. Ce descripteur sert de substitut pour mesurer la force des cigarettes fumées.

Code	Description
1	Extra Douce Légère
2	Ultra Douce
3	Extra Douce
4	Extra Légère
5	Ultra Légère
6	Douce
7	Ultra
8	Légère
9	Régulière
96	Sans objet
99	Non déclaré

*Nota : La catégorie « 99 » (non déclaré) comprend aussi les diverses marques de cigarettes qui ne sont plus en vente ou qui n'existaient pas. Elle comprend également les marques « sans nom » qu'il a été impossible de préciser.

26.3 Genre de fumeur

Nom au cycle 5 : SMC2DTYP

Nom au cycle 4 : SMC0DTYP

Nom au cycle 3 : SMC8DTYP

Nom au cycle 2 : SMC6DTYP

Nom au cycle 1 : SMC4DTYP (*anciennement DVSMKT94*)

Basé sur SMCn_2, SMCn_4A et SMCn_5.

Cette variable dérivée indique le genre de fumeur du répondant en fonction de ses habitudes.

Code	Description	Condition
1	Fume tous les jours	SMCn_2=1
2	Fume à l'occasion mais fumait tous les jours auparavant	SMCn_2=2 et SMCn_5=1
3	A toujours fumé occasionnellement	SMCn_2=2 et SMCn_5=2
4	Fumait tous les jours auparavant	SMCn_2=3 et SMCn_4A=1 et SMCn_5=1
5	Fumait à l'occasion auparavant	SMCn_2=3 et SMCn_4A=1 et SMCn_5=2
6	N'a jamais fumé	SMCn_2=3 et SMCn_4A=2
96	Sans objet	SMCn_2=6
99	Non déclaré	Autrement

26.4 **Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé**

Nom au cycle 5 : SMC2DYRS

Nom au cycle 4 : SMC0DYRS

Nom au cycle 3 : SMC8DYRS

Nom au cycle 2 : SMC6DYRS

Nom au cycle 1 : SMC4DYRS (*anciennement DVSMKY94*)**Source** : Enquête sociale générale - Santé - cycle 6 (1991)**Site Web de Statistique Canada** : www.statcan.ca/francais/sdds/3894_f.htm

Basé sur SMCn_3, SMCn_6, SMCn_8, DHCn_AGE et SMCnDTYP (Source : SMCn_2, SMCn_4A, SMCn_5).

Cette variable dérivée détermine le nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé. Cette variable inclut les non-fumeurs et les fumeurs occasionnels qui auparavant fumait tous les jours. Ceux qui ne fument pas tous les jours sont exclus.

Code	Description	Condition
0-135	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - Uniquement pour les personnes qui fument tous les jours ou qui avaient fumé tous les jours	Si SMCnDTYP=1 alors SMCnDYRS est égal à DHCn_AGE - SMCn_3; si SMCnDTYP=2 ou 4 alors SMCnDYRS est égal à SMCn_8 - SMCn_6;
996	Sans objet	SMCnDTYP=3 ou 5 ou 6 ou 96
999	Non déclaré	autrement

Deux nouveaux flux de questions ont été ajoutés au cycle 4

- 1- L'âge auquel ils ont commencé à fumer n'est plus demandé aux fumeurs quotidiens qui fumaient aussi tous les jours dans les autres cycles (l'information a déjà été recueillie) - SM_C103.
- 2- On ne demande plus aux anciens fumeurs quotidiens s'ils ont déjà fumé la cigarette tous les jours (l'information a déjà été recueillie) - SM_C105D

VARIABLES RELATIVES À L'USAGE DU TABAC SUPPRIMÉES :

1. **Âge auquel le répondant a commencé à fumer tous les jours - fumeur quotidien**
Nom au cycle 3 : SMC8G3
Nom au cycle 2 : SMC6G3
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)
2. **Âge auquel le répondant a commencé à fumer tous les jours - ancien fumeur quotidien**
Nom au cycle 3 : SMC8G6
Nom au cycle 2 : SMC6G6
Raison : Variable regroupée (FMGD)
3. **Âge auquel le répondant a cessé de fumer tous les jours - ancien fumeur quotidien**
Nom au cycle 3 : SMC8G8
Nom au cycle 2 : SMC6G8
Raison : Variable regroupée (FMGD seulement)
4. **Utilise des produits du tabac**
Nom au cycle 3 : TAS8D1
Raison : Variable dérivée (FMGD seulement)

27. SOUTIEN SOCIAL (SS)**27.1 Indice du soutien social perçu**

Nom au cycle 5 : S.O.

Nom au cycle 4 : S.O.

Nom au cycle 3 : S.O. (les questions sur le soutien social ont été révisées au cycle 3)

Nom au cycle 2 : SSC6D1

Nom au cycle 1 : SSC4D1 (*anciennement DVSSI194*)

Source : *Division de la statistique de la santé, Statistique Canada*
courriels : Beaumar@statcan.ca; Stoneler@statcan.ca.

Basé sur la somme de toutes les réponses valides aux questions SSCn_3 à SSCn_6.

MIN = 0, MAX = 4 (la perception du soutien social est d'autant plus prononcée que la cote est élevée)

L'indice de perception du soutien social comprend quatre questions qui reflètent l'impression qu'ont les personnes interrogées d'avoir un confident ou une confidente, d'avoir une personne sur laquelle elles peuvent compter, d'avoir quelqu'un à qui elles peuvent demander conseil et d'avoir quelqu'un qui leur donne le sentiment d'être aimées.

27.2 Indice de l'implication sociale

Nom au cycle 5 : S.O.

Nom au cycle 4 : S.O.

Nom au cycle 3 : S.O. (les questions sur le soutien social ont été révisées au cycle 3)

Nom au cycle 2 : SSC6D2

Nom au cycle 1 : SSC4D2 (*anciennement DVSSI294*)

Source : *Division de la statistique de la santé, Statistique Canada*
courriels : Beaumar@statcan.ca; Stoneler@statcan.ca.

Basé sur la somme des réponses valides aux questions SSCn_2 et SSCn_2A.

MIN = 0, MAX = 4 (l'implication sociale est d'autant plus importante que la cote est élevée)

On évalue l'indice de l'implication sociale au moyen de deux questions qui témoignent de la fréquence de la participation aux activités d'associations ou d'organismes sans but lucratif et de la fréquence de la participation à des services religieux au cours de la dernière année.

27.3 Indice de fréquence moyenne des contacts

Nom au cycle 5 : S.O.

Nom au cycle 4 : S.O.

Nom au cycle 3 : S.O. (les questions sur le soutien social ont été révisées au cycle 3)

Nom au cycle 2 : SSC6D3

Nom au cycle 1 : SSC4D3 (*anciennement DVSSI394*)

Source : *Division de la statistique de la santé, Statistique Canada*
courriels : Beaumar@statcan.ca; Stoneler@statcan.ca.

Basé sur SSCn_7A à SSCn_7H.

MIN = 0, MAX = 4 (le nombre de contacts est d'autant plus grand que la cote est élevée)

L'indice de fréquence moyenne des contacts indique le nombre moyen de contacts au cours des 12 derniers mois avec des membres de la famille et des amis qui ne font pas partie du ménage ainsi qu'avec des voisins.

$SSCnD3 = CONTACT / NETSIZE$

CONTACT est une valeur approximative qui indique le nombre de contacts pour toutes les catégories (SSCn_7A à SSCn_7H).

NETSIZE est une valeur combinée qui indique l'existence de personnes qui peuvent éventuellement être contactées (somme des indicateurs de réponse « Oui » pour les parents, les grands-parents, etc.).

La Medical Outcomes Study Social Support Survey (échelle MOS) donne des indicateurs de quatre catégories de soutien social. On a réduit un groupe initial de 50 éléments à 19 éléments de soutien fonctionnel couvrant cinq dimensions :

- Soutien émotionnel – l'expression d'une affectivité positive, d'une compréhension empathique et de l'encouragement des expressions des sentiments.
- Soutien informationnel – l'offre de conseils, d'information, d'orientation ou de rétroaction.
- Soutien tangible – la prestation d'aide matérielle ou d'aide en terme de comportement.
- Interaction sociale positive – la capacité que les autres personnes ont d'avoir du plaisir avec vous.
- Affection – qui concerne l'expression d'amour et d'affection.

Les analyses empiriques ont montré que les éléments concernant le soutien émotionnel et informationnel devraient être cotés ensemble, de sorte que nous ayons quatre sous-échelles :

- Soutien concret (questions 2, 5, 12, 15)
- Affection (questions 6, 10, 20)
- Interaction sociale positive (questions 7, 11, 14, 18)
- Soutien émotionnel ou informationnel (questions 3, 4, 8, 9, 13, 16, 17, 19)

On peut obtenir une cote globale en additionnant les cotes aux diverses sous-échelles, les cotes plus élevées indiquant davantage de soutien. Les concepteurs de l'échelle recommandent également de recourir aux cotes des sous-échelles plutôt qu'à la cote globale.

27.4 **Sous-échelle de soutien social tangible (Étude des issues médicales)**

Nom au cycle 5 : SSC2DTNG

Nom au cycle 4 : SSC0DTNG

Nom au cycle 3 : SSC8DTNG

Nom au cycle 2 : S.O. (les questions sur le soutien social ont été révisées au cycle 3)

Nom au cycle 1 : S.O.

Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (*Medical Outcomes Study Social Support Survey*), *Social Sciences & Medicine*; 32 : 705 - 714

Basé sur les questions SSCn_102, SSCn_105, SSCn_112 et SSCn_115.

MIN = 0, MAX = 16 (le soutien social est d'autant plus grand que la cote est élevée)

Cette variable dérivée détermine le soutien concret dont dispose le répondant. On a demandé au répondant si quelqu'un pourrait l'aider s'il était confiné au lit, pour aller chez le médecin, pour lui préparer des repas ou pour faire les travaux ménagers.

La valeur de la variable dérivée est fixée à « sans objet » pour les enfants de moins de 12 ans et les personnes en établissement, puisque les questions pertinentes ne leur sont pas posées.

Pour calculer la cote, on a recodé les catégories de réponses de chaque question de la sous-échelle pour les ramener dans la fourchette de 0 à 4 (où 0 correspond à « jamais » et 4 à « tout le temps »).

Code	Description	Condition
0 - 16	Valeur de l'indice (cote)	(SSCn_102>=0 et <=4) et (SSCn_105>=0 et <=4) et (SSCn_112>=0 et <=4) et (SSCn_115>=0 et <=4)
96	Sans objet	SSCn_101=996
99	Non déclaré	AM6n_PXY= 1
99	Répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) au moins une question est requise pour faire les calculs.	(SSCn_102=DK, R ou NS) ou (SSCn_105=DK, R ou NS) ou (SSCn_112=DK, R ou NS) ou (SSCn_115=DK, R ou NS)

27.5 Sous-échelle d'affection (Étude des issues médicales)

Nom au cycle 5 : SSC2DAFF

Nom au cycle 4 : SSC0DAFF

Nom au cycle 3 : SSC8DAFF

Nom au cycle 2 : S.O. (Les questions sur le soutien social ont été révisées au cycle 3)

Nom au cycle 1 : S.O.

Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), *Social Sciences & Medicine*; 32 : 705 - 714

Basée sur SSCn_106, SSCn_110 et SSCn_120.

MIN = 0, MAX = 12 (l'affection reçue est d'autant plus grande que la cote est élevée)

Cette variable dérivée détermine l'affection que le répondant reçoit. On a demandé au répondant si quelqu'un lui témoignait de l'amour, le prenait dans ses bras ou si quelqu'un l'aimait et le faisait se sentir désirable.

La valeur de la variable dérivée est fixée à « sans objet » pour les enfants de moins de 12 ans et les personnes en établissement, puisque les questions pertinentes ne leur sont pas posées.

Pour calculer la cote, on a recodé les catégories de réponses de chaque question de la sous-échelle pour les ramener dans la fourchette de 0 à 4 (où 0 correspond à « jamais » et 4 à « tout le temps »).

Code	Description	Condition
0 - 12	Valeur de l'indice (cote)	(SSCn_106>=0 et <=4) et (SSCn_110>=0 et <=4) et (SSCn_120>=0 et <=4)
96	Sans objet	SSCn_101=NA
99	Non déclaré	AM6n_PX Y= 1
99	Non déclaré	(SSCn_106=DK, R ou NS) ou (SSCn_110=DK, R ou NS) ou (SSCn_120=DK, R ou NS)

27.6 **Sous-échelle d'interaction sociale positive (Étude des issues médicales)**

Nom au cycle 5 : SSC2DSOC

Nom au cycle 4 : SSC0DSOC

Nom au cycle 3 : SSC8DSOC

Nom au cycle 2 : S.O. (les questions sur le soutien social ont été révisées au cycle 3)

Nom au cycle 1 : S.O.

Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), *Social Sciences & Medicine*; 32 : 705 - 714

Basée sur SSCn_107, SSCn_111, SSCn_114 et SSCn_118.

MIN = 0, MAX = 16 (l'interaction sociale est d'autant plus grande que la cote est élevée)

Cette variable dérivée détermine dans quelle mesure le répondant prend part à des interactions sociales positives. On a demandé au répondant s'il pouvait passer un bon moment avec quelqu'un, relaxer avec quelqu'un, faire des activités avec quelqu'un pour se changer les idées ou faire des choses plaisantes avec quelqu'un.

La valeur de la variable dérivée est fixée à « sans objet » pour les enfants de moins de 12 ans et les personnes en établissement, puisque les questions pertinentes ne leur sont pas posées.

Pour calculer la cote, on a recodé les catégories de réponses de chaque question de la sous-échelle pour les ramener dans la fourchette de 0 à 4 (où 0 correspond à « jamais » et 4 à « tout le temps »).

Code	Description	Condition
0 - 16	Valeur de l'indice (cote)	(SSCn_107>=0 et <=4) et (SSCn_111>=0 et <=4) et (SSCn_114>=0 et <=4) et (SSCn_118>=0 et <=4)
96	Sans objet	SSCn_101=S.O.
99	Non déclaré	AM6n_PXY= 1
99	Non déclaré	(SSCn_107=DK, R ou NS) ou (SSCn_111=DK, R ou NS) ou (SSCn_114=DK, R ou NS) ou (SSCn_118=DK, R ou NS)

27.7 **Sous-échelle de support émotionnel ou d'information (Étude des issues médicales)**

Nom au cycle 5 : SSC2DEMO

Nom au cycle 4 : SSC0DEMO

Nom au cycle 3 : SSC8DEMO

Nom au cycle 2 : S.O. (les questions sur le soutien social ont été révisées au cycle 3)

Nom au cycle 1 : S.O.

Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), *Social Sciences & Medicine*; 32 : 705 - 714

Basée sur SSCn_103, SSCn_104, SSCn_108, SSCn_109, SSCn_113, SSCn_116, SSCn_117 et SSCn_119.

MIN = 0, MAX = 32 (le support émotionnel est d'autant plus grand que la cote est élevée)

Cette variable dérivée détermine le soutien émotionnel ou informationnel du répondant. On a demandé au répondant si quelqu'un pouvait l'écouter et le conseiller en temps de crise, lui donner des renseignements ou s'il avait quelqu'un à qui il pouvait se confier et parler, ou quelqu'un qui comprend ses problèmes.

La valeur de la variable dérivée est fixée à « sans objet » pour les enfants de moins de 12 ans et les personnes en établissement, puisque les questions pertinentes ne leur sont pas posées.

Pour calculer la cote, on a recodé les réponses à chaque question de la sous-échelle pour les ramener dans la fourchette de 0 à 4 (où 0 correspond à « jamais » et 4 à « tout le temps »).

Code	Description	Condition
0 - 32	Valeur de l'indice (cote)	(SSCn_103>=0 et <=4) et (SSCn_104>=0 et <=4) et (SSCn_108>=0 et <=4) et (SSCn_109>=0 et <=4) et (SSCn_113>=0 et <=4) et (SSCn_116>=0 et <=4) et (SSCn_117>=0 et <=4) et (SSCn_119>=0 et <=4)
96	Sans objet	SSCn_101=S.O.
99	Non déclaré	AM6n_PXY= 1
99	Non déclaré	(SSCn_103=DK, R ou NS) ou (SSCn_104=DK, R ou NS) ou (SSCn_108=DK, R ou NS) ou (SSCn_109=DK, R ou NS) ou (SSCn_113=DK, R ou NS) ou (SSCn_116=DK, R ou NS) ou (SSCn_117=DK, R ou NS) ou (SSCn_119=DK, R ou NS)

28. STRESS (ST)

Les variables suivantes sur le stress ont été produites pour le cycle 1 et le cycle 4 à partir d'une méthode différente de celle utilisée à l'origine pour les données du cycle 1. Cette nouvelle méthode de calcul a été proposée par Blair Wheaton de l'Université de Toronto (www.utoronto.ca/) à l'égard des variables relatives au stress chronique, afin de permettre un certain nombre de valeurs manquantes.

Selon la méthode originale de calcul des variables relatives au stress du cycle 1, les indices de stress correspondaient à la somme des réponses « vrai ». On n'a pas calculé d'indice dans les cas de « Refus » ou « Non déclaré », mais on a tenu compte des réponses « Ne sait pas », qui ont été considérées comme des réponses « faux ». Selon la méthode présentée ci-dessous, les indices de stress ont été calculés à partir de la moyenne des réponses « vrai », rajustée selon le nombre de questions posées.

DV = Moyenne * Nombre total de questions posées

Moyenne = somme des réponses « vrai » / (nombre de réponses « vrai » + « faux » aux questions posées)

Cette méthode s'apparente à l'utilisation de la somme de toutes les réponses « Vrai » (comme pour les variables originales du cycle 1), sauf dans le cas de valeurs manquantes (« Ne sait pas », « Refus » ou « Non déclaré »). Les réponses « Ne sait pas » sont traitées comme des variables manquantes. Après consultation avec Margot Shields, analyste à Statistique Canada, il a été décidé de permettre jusqu'à 25 % de réponses « Ne sait pas » (valeur de 7), « Refus » (8) ou « Non déclaré » (9) pour le calcul de l'indice.

Nota : Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, toutes les variables dérivées à l'égard du stress ont été recalculées utilisant un algorithme différent.

Stress chronique

Le tableau qui suit résume les questions utilisées pour calculer les variables dérivées relatives au stress chronique. Le groupe de questions posées varie selon la situation familiale de la personne visée. Le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée.

MARIÉ(E) ¹		CÉLIBATAIRE ²		AUTRE ³	
ST_n_C1		ST_n_C1		ST_n_C1	
ST_n_C2		ST_n_C2		ST_n_C2	
ST_n_C3		ST_n_C3		ST_n_C3	
ST_n_C4		ST_n_C4		ST_n_C4	
ST_n_C5					
ST_n_C6					
ST_n_C7					
		ST_n_C8			
ENFANT(S) OUI	ENFANT(S) NON	ENFANT (S) OUI	ENFANT (S) NON	ENFANT (S) OUI	ENFANT (S) NON

¹Pour la section STRESS CHRONIQUE, la catégorie « marié(e) » regroupe toutes les personnes dont l'état matrimonial est « marié(e) » ou « conjoint(e) de fait » ou « vit avec un(e) partenaire » (pour le cycle 1 seulement).

²Pour la section STRESS CHRONIQUE, la catégorie « célibataire » regroupe toutes les personnes dont l'état matrimonial est « célibataire », « veuf(ve) », « séparé(e) » ou « divorcé(e) ».

³Pour la section STRESS CHRONIQUE, la catégorie « autre » regroupe toutes les personnes dont l'état matrimonial est : « sans objet », « ne sait pas », « refus » ou « non déclaré ».

MARIÉ(E) ¹		CÉLIBATAIRE ²		AUTRE ³	
ST_n_C10		ST_n_C10		ST_n_C10	
ST_n_C11		ST_n_C11		ST_n_C11	
ST_n_C12		ST_n_C12		ST_n_C12	
ST_n_C13		ST_n_C13		ST_n_C13	
ST_n_C14		ST_n_C14		ST_n_C14	
ST_n_C15		ST_n_C15		ST_n_C15	
ST_n_C16		ST_n_C16		ST_n_C16	
ST_n_C17		ST_n_C17		ST_n_C17	
ST_n_C18		ST_n_C18		ST_n_C18	

28.1 Indice général du stress chronique

Nom au cycle 5 : ST_2DC1

Nom au cycle 4 : ST_0DC1

Nom au cycle 3 : S.O.

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : ST_4DC1 (*anciennement DVCSI194*)

Basé sur ST_n_C1 à C4 et ST_n_C12 à C18.

MIN = 0,0, MAX = 11,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée)

Cet indice général de stress est composé de questions s'appliquant à tous les répondants, quelle que soit leur situation personnelle (marié(e)/non marié(e), avec enfant(s)/sans enfant).

Les facteurs de stress comprennent la surcharge d'activités, les problèmes financiers et les problèmes de rapports lors de rencontres journalières.

Calcul :

ST_nDC1 = Moyenne 1 * 11 (nombre total de questions ST_nC1 à C4 et C12 à C18)

Moyenne 1 = (somme des réponses « Vrai » à C1-C4 et à C12-C18) / (nombre de réponses « Vrai » + « Faux » à C1-C4 et C12-C18).

Pour cette échelle, le nombre maximum de valeurs manquantes (« Ne sait pas », « Refus » ou « Non déclaré ») « permis » pour calculer l'indice est 2 (25 % de valeurs manquantes sur les 11 questions posées).

Exemple :

Q1 = Vrai

Q2 = Faux

Q3 = Faux

Q4 = Vrai

Q12 = Refus

Q13 = N.D.

Q14 - Q18 = Vrai

Indice = 7 / 9 * 11 = 8,56

Code	Description	Condition
0,0-11,0	Valeur de l'indice (cote)	Voir le calcul de la variable dérivée ci-dessus
99,6	Sans objet	ST_n_C1=6
99,9	Non déclaré	Plus de deux questions de ST_n_C1 à C4 et de ST_n_C12 à C18 sont égales à 7, 8 ou 9

28.2 Indice spécifique du stress chronique

Nom au cycle 5 : ST_2DC2

Nom au cycle 4 : ST_0DC2

Nom au cycle 3 : S.O.

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : ST_4DC2 (*anciennement DVCS1294*)

Basé sur ST_n_C1 à C8 et ST_n_C10 à C18.

MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée)

Cet indice mesure le nombre total de facteurs de stress auxquels les répondants ont été exposés. La cote finale (de même que le nombre de questions) varie en fonction de la situation personnelle du répondant. Par exemple, pour les personnes mariées ou vivant avec un partenaire, on inclut les questions relatives aux rapports avec le partenaire. Pour les personnes sans partenaire, l'indice contient une question sur la difficulté de se trouver une personne compatible. Pour les personnes avec enfant(s), les questions relatives aux enfants jouent un rôle dans le calcul de l'indice.

Calcul :

ST_nDC2 = Moyenne 2 * nombre total de questions posées pour ST_n_C1 à C8 et C10 à C18.

Moyenne 2 = somme des réponses « Vrai » / nombre de réponses « Vrai » plus « Faux » de C1 à C8 et C10 à C18.

Pour cette échelle, le nombre maximum de valeurs manquantes « permis » (25 % de réponses « Ne sait pas », « Refus » ou « Non déclaré ») varie selon la situation familiale. Le tableau qui suit résume les cotes minimum et maximum, ainsi que le nombre de valeurs manquantes permis selon la situation familiale.

Code	Description	Condition	Nombre maximum de valeurs manquantes « permis » pour le calcul de l'indice (25 %)
0,0-16,0	Valeur de l'indice (cote)	Avec enfant(s) et marié(e) (ou conjoint(e) de fait) Voir le calcul de la variable dérivée ci-dessus	4
0,0-14,0	Valeur de l'indice (cote)	Avec enfant(s) et célibataire (ou veuf(ve), séparé(e) ou divorcé(e) ou Marié(e) ou conjoint(e) de fait et sans enfant Voir le calcul de la variable dérivée ci-dessus.	3
0,0-13,0	Valeur de l'indice (cote)	Avec enfant(s) et autre Voir le calcul de la variable dérivée ci-dessus	3
0,0-12,0	Valeur de l'indice (cote)	Sans enfant et célibataire (ou veuf(ve), séparé(e) ou divorcé(e)). Voir le calcul de la variable dérivée ci-dessus	3
0,0-11,0	Valeur de l'indice (cote)	Sans enfant et autre Voir le calcul de la variable dérivée ci-dessus	2
99,6	Sans objet	ST_n_C1=6	
99,9	Non déclaré	Nombre de valeurs manquantes supérieur à 25 % du nombre total de questions	

Nota : La cote maximum est égale au nombre total de questions posées.

28.3 Indice spécifique corrigé du stress chronique

Nom au cycle 5 : ST_2DC3

Nom au cycle 4 : ST_0DC3

Nom au cycle 3 : S.O.

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : ST_4DC3 (anciennement DVCSI394)

Basé sur ST_nDC2 (Source : ST_n_C1 à ST_n_C8 et ST_n_C10 à ST_n_C18).

MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée)

Dans ce troisième indice, les variations de cotes du deuxième indice ST_nDC2 sont corrigées comme si toutes les questions (16, comprenant celles destinées aux personnes mariées avec enfant(s)) qui s'appliquaient à chaque répondant.

$ST_nDC3 = (ST_nDC2 * 16) / \text{nombre de questions posées (varie selon la situation familiale), 16}$ représentant le nombre maximum de questions posées à une personne (personne mariée avec enfants). P. ex.: célibataire avec enfant(s) : $(ST_nDC2 * 16) / 14$.

Cotes des composantes de l'indice du stress chronique

On a dérivé certaines sous-cotes pour refléter le nombre de facteurs de stress auxquels les répondants étaient exposés dans certains domaines de leur vie. Elles sont fondées sur un sous-ensemble de questions de la section du questionnaire relative au stress chronique et leurs noms reflètent la composante mesurée. On a encore une fois permis jusqu'à 25 % de valeurs manquantes (NSP, R et N.D.) pour le calcul de l'indice de stress.

28.4 Indice du stress personnel

Nom au cycle 5 : ST_2DC4

Nom au cycle 4 : ST_0DC4

Nom au cycle 3 : S.O.

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : ST_4DC4 (*anciennement DVCSI494*)

Basé sur ST_n_C1 à ST_n_C3, ST_n_C12 et ST_n_C18.

MIN = 0,0, MAX = 5,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée)

Calcul :

$ST_nDC4 = \text{Moyenne4} * 5$ (nombre total de questions posées pour ST_n_C1 à C3, C12 et C18).
Moyenne4 = somme des réponses « Vrai » / nombre de réponses « Vrai » + « Faux » à C1-C3, C12 et C18.

Pour cette échelle, le nombre maximum de valeurs manquantes (« Ne sait pas », « Refus » ou « Non déclaré ») « permis » pour calculer l'indice est 1 (25 % de valeurs manquantes sur les 5 questions posées).

Code	Description	Condition
0,0-5,0	Valeur de l'indice (cote)	Somme des réponses « vrai » dans ST_n_C1 à C3, ST_n_C12 et ST_n_C18
9,6	Sans objet	ST_n_C1=6
9,9	Non déclaré	Plus d'une question égale à 7, 8 ou 9

28.5 Indice du stress fondé sur la situation financière

Nom au cycle 5 : ST_2DC5

Nom au cycle 4 : ST_0DC5

Nom au cycle 3 : S.O.

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : ST_4DC5 (*anciennement DVCSI594*)

Basé sur ST_n_C4.

MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée)

Aucune valeur manquante n'a été permise pour calculer l'indice.

Code	Description	Condition
0-1	Valeur de l'indice (cote)	ST_n_C4=1 ou 2, valeur de 2 (« faux ») remplacée par 0
6	Sans objet	ST_n_C1=6
9	Non déclaré	ST_n_C4=7, 8 ou 9

28.6 Indice du stress fondé sur la relation (avec le (la) conjoint(e))

Nom au cycle 5 : ST_2DC6

Nom au cycle 4 : ST_0DC6

Nom au cycle 3 : S.O.

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : ST_4DC6 (*anciennement DVCSI694*)

Basé sur ST_n_C5 à ST_n_C7 et DHCn_MAR .

MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée)

Calcul :

ST_nDC6 = Moyenne6 * 3 (nombre de questions posées ST_n_C5 à ST_n_C7)

Moyenne6 = somme des réponses « Vrai » / nombre de réponses « Vrai » + « Faux » à ST_n_C5, ST_n_C6 et ST_n_C7.

Aucune valeur manquante n'a été permise pour calculer l'indice, étant donné que le nombre de composantes de l'indice est trop limité.

Code	Description	Condition
0-3	Valeur de l'indice (cote)	« A un partenaire » Voir le calcul de la variable dérivée ci-dessus
6	Sans objet	ST_n_C1=6 ou « seul » ou ST_n_C5, ST_n_C6=6 ou ST_n_C7=6
9	Non déclaré	ST_n_C5, ST_n_C6 ou ST_n_C7 égale à 7, 8 ou 9 ou « autre »

28.7 Indice du stress fondé sur la difficulté de trouver un partenaire (personne seule)

Nom au cycle 5 : ST_2DC7

Nom au cycle 4 : ST_0DC7

Nom au cycle 3 : S.O.

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : ST_4DC7 (*anciennement DVCSI794*)

Basé sur ST_n_C8 et DHCn_MAR.

MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée)

Aucune valeur manquante n'a été permise pour calculer l'indice.

Code	Description	Condition
0-1	Valeur de l'indice (cote)	ST_n_C8=1 ou 2 (valeur de 2 (« faux ») remplacée par 0) lorsque le répondant est « seul »
6	Sans objet	ST_n_C1=6 ou « A un partenaire »
9	Non déclaré	ST_n_C8=7, 8 ou 9 ou « autre »

28.8 Indice du stress fondé sur les problèmes avec les enfants

Nom au cycle 5 : ST_2DC8

Nom au cycle 4 : ST_0DC8

Nom au cycle 3 : S.O.

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : ST_4DC8 (*anciennement DVCS1894*)

Basé sur ST_n_C9 à ST_n_C11 (lorsque ST_n_C9 =1 « a des enfant(s) »).

Uniquement si le répondant a des enfants.

MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée)

Calcul :

ST_nDC8 = Moyenne8 * 2 (nombre de questions posées, ST_n_C10 et C11)

Moyenne8 = somme des réponses « Vrai » / nombre de réponses « Vrai » + « Faux » à ST_n_C10 et ST_n_C11.

Aucune valeur manquante n'a été permise pour calculer l'indice.

Code	Description	Condition
0-2	Valeur de l'indice (cote)	ST_n_C9=1. Voir le calcul de la variable dérivée ci-dessus
6	Sans objet	ST_n_C1=6 ou ST_n_C9=2 ou ST_n_C9, ST_n_C10, ST_n_C11=6
9	Non déclaré	ST_n_C9 ou ST_n_C10 ou ST_n_C11 égale à 7, 8 ou 9

28.9 Indice du stress fondé sur les problèmes d'environnement

Nom au cycle 5 : ST_2DC9

Nom au cycle 4 : ST_0DC9

Nom au cycle 3 : S.O.

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : ST_4DC9 (*anciennement DVCS1994*)

Basé sur ST_n_C13 à ST_n_C15.

MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée)

Calcul :

ST_nDC9 = Moyenne9 * 3 (nombre de questions posées, ST_n_C13 à C15).

Moyenne9 = somme des réponses « Vrai » / nombre de réponses « Vrai » + « Faux » à ST_n_C13, ST_n_C14 et ST_n_C15.

Aucune valeur manquante n'a été permise pour calculer l'indice, étant donné que le nombre de

composantes de l'indice est trop limité.

Code	Description	Condition
0-3	Valeur de l'indice (cote)	Voir le calcul de la variable dérivée ci-dessus
6	Sans objet	ST_n_C1=6 ou ST_n_C13, ST_n_C14 ou ST_n_C15=6
9	Non déclaré	ST_n_C13, ST_n_C14 ou ST_n_C15 égale à 7, 8 ou 9

28.10 Indice du stress fondé sur la santé des membres de la famille

Nom au cycle 5 : ST_2DC10

Nom au cycle 4 : ST_0DC10

Nom au cycle 3 : S.O.

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : ST_4DC10 (*anciennement DVCSI094*)

Basé sur ST_n_C16 et ST_n_C17.

MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée)

Calcul :

ST_nDC10 = Moyenne10 * 2 (nombre de questions posées, ST_n_C16 et C17).

Moyenne10 = somme des réponses « Vrai » / nombre de réponses « Vrai » + « Faux » à ST_n_C16 et ST_n_C17.

Aucune valeur manquante n'a été permise pour calculer l'indice, étant donné que le nombre de composantes de l'indice est trop limité.

Code	Description	Condition
0-2	Valeur de l'indice (cote)	Voir le calcul de la variable dérivée ci-dessus
6	Sans objet	ST_n_C1=6 ou ST_n_C16 ou ST_n_C17=6
9	Non déclaré	ST_n_C16 ou ST_n_C17 égale à 7, 8 ou 9

Événements récents

Les trois indices qui mesurent les événements récents se fondent sur le nombre d'événements négatifs dont le répondant ou une personne proche du répondant a fait l'expérience au cours des douze derniers mois. Les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements. Les analyses de McDowell, Boulet et Kristjansson ont guidé le choix des questions qui faisaient partie d'un ensemble de questions utilisées dans les études dirigées par Blair Wheaton.

28.11 Indice des événements récents - Toutes les questions

Nom au cycle 5 : S.O.

Nom au cycle 4 : ST_ODR1

Nom au cycle 3 : S.O.

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : ST_4DR1 (*anciennement DVRLI194*)

Basé sur ST_n_R1 à ST_n_R7 et ST_n_R9.

MIN = 0,0, MAX = 8,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements)

Cet indice se compose de toutes les questions s'appliquant à tous les répondants. Les événements comprennent un abus physique, une grossesse non désirée, un avortement ou une fausse couche, des difficultés financières importantes, et des problèmes graves au travail ou à l'école.

Calcul :

$ST_nDR1 = MoyenneR1 * 8$ (nombre de questions ST_n_R1 à ST_n_R7 et ST_n_R9).
 $MoyenneR1 = \text{somme des réponses « Oui »} / \text{nombre de réponses « Oui »} + \text{« Non » de } ST_n_R1 \text{ à } ST_n_R7 \text{ et } ST_n_R9.$

Pour cette échelle, le nombre maximum de valeurs manquantes permis pour calculer l'indice est **2** (25 % de réponses « Ne sait pas », « Refus » ou « Non déclaré » sur 8 questions).

Code	Description	Condition
0,0-8,0	Valeur de l'indice (cote)	Voir le calcul de la variable dérivée ci-dessus
99,6	Sans objet	$ST_n_R1=6$
99,9	Non déclaré	Plus de deux questions dans ST_n_R1 à $R7$ et ST_n_R9 sont égales à 7, 8 ou 9

28.12 Indice des événements récents - Toutes les questions à une réponse valide

Nom au cycle 5 : S.O.
 Nom au cycle 4 : ST_0DR2
 Nom au cycle 3 : S.O.
 Nom au cycle 2 : S.O.
 Nom au cycle 1 : ST_4DR2 (*anciennement DVRLI294*)

Basé sur ST_n_R1 à ST_n_R10 .

MIN = 0,0, MAX = 10,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements)

Cet indice tient compte des rôles assumés par les personnes. Pour les personnes mariées ou vivant avec un(e) partenaire (« A un partenaire »), l'indice comprend une question relative à la relation avec le (la) partenaire. Pour les personnes qui ont des enfants, l'indice comprend une question relative aux enfants qui reviennent vivre à la maison.

Calcul :

$ST_nDR2 = MoyenneR2 * \text{nombre total de questions posées pour } ST_n_R1 \text{ à } R10.$
 $MoyenneR2 = \text{somme des réponses « Oui »} / \text{nombre de réponses « Oui »} + \text{« Non » à } R1-R10.$

Pour cette échelle, le nombre maximum de valeurs manquantes « permis » (25 % de réponses « Ne sait pas », « Refus » ou « Non déclaré ») est égal à **2** (sur 8, 9 ou 10 questions, selon la situation familiale). Le tableau qui suit montre les cotes minimum et maximum, ainsi que les questions et les valeurs manquantes permises.

Code	Description	Condition	Nombre maximum de valeurs manquantes permis	Questions posées
0,0-10,0	Valeur de l'indice (cote)	« A un partenaire » avec enfant(s) Voir le calcul de la variable dérivée ci-dessus	2	ST_n_R1 à ST_n_R10
0,0-9,0	Valeur de l'indice (cote)	« A un partenaire » sans enfant Voir le calcul de la variable dérivée ci-dessus	2	ST_n_R1 à ST_n_R9
0,0-9,0	Valeur de l'indice (cote)	« Seul(e) » avec enfant(s) Voir le calcul de la variable dérivée ci-dessus	2	ST_n_R1 à ST_n_R7, R9, R10
0,0-8,0	Valeur de l'indice (cote)	« seul » sans enfant Voir le calcul de la variable dérivée ci-dessus	2	ST_n_R1 à R7, R9
99,6	Sans objet	ST_n_R1=6		
99,9	Non déclaré	Plus de deux questions de R1 à R10 sont égales à 7, 8 ou 9		

¹ La cote maximum correspond au nombre total de questions posées.

28.13 Indice corrigé des événements récents

Nom au cycle 5 : S.O.

Nom au cycle 4 : ST_0DR3

Nom au cycle 3 : S.O.

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : ST_4DR3 (*anciennement DVRLI394*)

Basé sur ST_nDR2 (Source : ST_n_R1 à ST_n_R10).

MIN = 0,0, MAX = 10,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements)

$ST_nDR3 = (ST_nDR2 * 10) / \text{nombre de questions posées.}$

P. ex., : ST_nDR3 pour les personnes « seules » sans enfant = $(ST_nDR2 * 10) / 8$

Les variations des cotes pour le second indice, ST_nDR2, sont corrigées comme si les dix questions s'appliquaient à tous les répondants.

Facteurs de stress chez l'enfant et chez l'adulte**28.14 Indice de stress de l'enfant et de l'adulte**

Nom au cycle 5 : S.O.

Nom au cycle 4 : ST_ODT1

Nom au cycle 3 : S.O.

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : ST_4DT1 (*anciennement DVTRI194*)

Basé sur ST_n_T1 à ST_n_T7.

MIN = 0,0, MAX = 7,0 (le nombre de facteurs de stress est d'autant plus grand que la cote est élevée)

Cet indice mesure le nombre d'événements traumatisants auxquels les répondants ont été exposés pendant leur enfance, leur adolescence ou à l'âge adulte. Les événements comprennent le divorce des parents, une longue hospitalisation, le chômage prolongé des parents, la consommation fréquente d'alcool ou l'usage fréquent de drogues par un parent. Une cote plus élevée indique plus de facteurs de stress. Les analyses de McDowell, Boulet et Kristjansson ont guidé le choix définitif des questions qui faisaient partie d'un ensemble de questions utilisées dans les études dirigées par Blair Wheaton.

Calcul :

$$ST_nDT1 = \text{MoyenneT1} * 7 \text{ (nombre de questions posées).}$$

$$\text{MoyenneT1} = \text{Somme des réponses « Oui »} / \text{nombre de réponses « Oui » + « Non » à ST_n_T1-T7.}$$

Pour cette échelle, un maximum d'une valeur manquante (« NSP », « R » ou « N.D. ») est permis pour calculer l'indice (25 % de valeurs manquantes sur les 7 questions).

Code	Description	Condition
0,0-7,0	Valeur de l'indice (cote)	Voir le calcul de la variable dérivée ci-dessus
99,6	Sans objet	ST_n_T1=6
99,9	Non déclaré	Plus d'une question de ST_n_T1 à T7 sont égales à 7, 8 ou 9

Stress au travail**28.15 Indice du stress au travail - Toutes les questions**

Nom au cycle 5 : ST_2DW1

Nom au cycle 4 : ST_ODW1

Nom au cycle 3 : S.O.

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : ST_4DW1 (*anciennement DVWSI194*)

Basé sur ST_n_W1A à ST_n_W1L.

MIN = 0,0, MAX = 48,0 (le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée)

Les résultats ont été inversés pour les questions ST_n_W1D, W1E, W1H et W1J.

Cette variable dérivée détermine la perception du répondant à l'égard de toutes les dimensions de son travail. On a demandé aux répondants de 15 ans et plus qui travaillaient au moment de l'enquête

d'évaluer leur situation au travail. L'indice de 12 questions, fondé sur un ensemble plus large de questions de Karasek (voir Karasek R, Theorell T. *Healthy Work: Stress, Productivity and the Reconstruction of Working Life*. New York: Basic Books, Inc. 1990.), reflète les perceptions qu'ont les répondants des différentes dimensions de leur travail, comme la sécurité au travail, le soutien social, la monotonie, les efforts physiques requis et l'étendue de leur participation au processus de prise de décisions. Le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée.

Pour plus d'information, consulter le Schwartz J, Pieper C, Karasek RA. "A procedure for linking psychosocial job characteristics data to health surveys". *American Journal of Public Health* 1988; 78: 904-9.

Dans l'interview en français du 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à tous les travailleurs. Un biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient le considérer pour l'analyse.

Les réponses à toutes les questions (à l'exception de la dernière) sont basées sur une échelle de 5 points (1, 2, 3, 4, 5). On a inversé la cote pour les questions ST_n_W1D, E, H et J afin de calculer les variables dérivées 27.15 à 27.21. Afin de faciliter les calculs pour les variables dérivées, l'échelle de 5 points est changée à (0, 1, 2, 3, 4).

Calcul :

$ST_nDW1 = MoyenneW1 * 12$ (nombre de questions posées).

MoyenneW1 = somme des réponses valides / nombre de réponses valides (les réponses valides correspondant à 0, 1, 2, 3 ou 4).

On permet jusqu'à 25 % de valeurs manquantes (« NSP », « R » ou « N.D. ») pour calculer l'indice. Cela signifie que jusqu'à trois valeurs manquantes sont permises pour ST_nDW1 (25 % de 12).

Code	Description	Condition
0,0-48,0	Valeur de l'indice (cote)	La somme des réponses de ST_n_W1A à ST_n_W1L
99,6	Sans objet	ST_n_W1=6
99,9	Non déclaré	Plus de trois réponses aux questions ST_n_W1A à W1L sont égales à 7, 8 ou 9

Indices des composantes de l'indice du stress au travail

Les questions relatives au stress au travail ont été subdivisées en six composantes. Comme c'est le cas pour l'indice global, les réponses aux questions reflètent les perceptions des répondants et les différentes dimensions de leur travail. Le nom de chaque sous-échelle reflète la dimension mesurée.

28.16 **Latitude de décision - Discrétion relative à la compétence (compétence requise)**

Nom au cycle 5 : ST_2DW2

Nom au cycle 4 : ST_0DW2

Nom au cycle 3 : S.O.

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : ST_4DW2 (*anciennement DVWSI294*)

Basé sur ST_n_W1A, ST_n_W1B et ST_n_W1D.

MIN = 0, MAX = 12 (plus la cote est basse plus l'emploi exige des compétences plus élevées)

Les résultats ont été inversés pour la question ST_n_W1D.

Cette variable dérivée détermine la diversité des tâches du répondant dans le cadre de son emploi principal au cours des 12 derniers mois. On demandait aux répondants s'ils devaient continuellement apprendre de nouvelles choses ou si leur travail exigeait un degré élevé de compétences et de créativité.

Dans l'interview en français du 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à tous les travailleurs. Un biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient le considérer pour l'analyse.

Calcul :

$ST_nDW2 = MoyenneW2 * 3$ (nombre de questions posées).

$MoyenneW2 = \text{somme des réponses valides} / \text{nombre de réponses valides}$ (les réponses valides étant égales à 0, 1, 2, 3 ou 4).

Aucune valeur manquante n'a été permise pour calculer l'indice, étant donné que le nombre de composantes de l'indice est trop limité.

Code	Description	Condition
0-12	Valeur de l'indice (cote)	Voir le calcul de la variable dérivée ci-dessus
96	Sans objet	$ST_n_W1=6$ ou $ST_n_W1A=6$
99	Non déclaré	Toute réponse à la question ST_n_W1A , $W1B$ ou $W1D$ égale à 7, 8 ou 9

28.17 Latitude de décision - Pouvoir décisionnel

Nom au cycle 5 : ST_2DW3

Nom au cycle 4 : ST_0DW3

Nom au cycle 3 : S.O.

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : ST_4DW3 (anciennement $DVWSI394$)

Basé sur ST_n_W1C et ST_n_W1I .

MIN = 0, MAX = 8 (le pouvoir décisionnel est d'autant plus bas que la cote est élevée)

Cette variable dérivée détermine si le principal emploi du répondant au cours des 12 derniers mois lui permet une marge de manœuvre suffisante et s'il a son mot à dire dans le déroulement des choses.

Dans l'interview en français du 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à tous les travailleurs. Un biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient le considérer pour l'analyse.

Calcul :

$ST_nDW3 = MoyenneW3 * 2$ (nombre de questions posées).

$MoyenneW3 = \text{somme des réponses valides} / \text{nombre de réponses valides}$ (les réponses valides étant égales à 0, 1, 2, 3 ou 4).

Aucune valeur manquante n'a été permise pour calculer l'indice, étant donné que le nombre de composantes de l'indice est trop limité.

Code	Description	Condition
0-8	Valeur de l'indice (cote)	Voir le calcul de la variable dérivée ci-dessus
96	Sans objet	ST_n_W1=6 ou ST_n_W1A=6
99	Non déclaré	Toute réponse à la question ST_n_W1C ou W1I égale à 7, 8 ou 9

28.18 Demandes psychologiques

Nom au cycle 5 : ST_2DW4

Nom au cycle 4 : ST_0DW4

Nom au cycle 3 : S.O.

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : ST_4DW4 (*anciennement DVWSI494*)

Basé sur ST_n_W1E et ST_n_W1F.

MIN = 0, MAX = 8 (la demande psychologique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée)

Les résultats ont été inversés pour la question ST_n_W1E.

Cette variable dérivée détermine si le répondant a pu éviter d'être touché par les demandes conflictuelles d'autres employés et si l'horaire de son principal emploi au cours des 12 derniers mois a été très chargé.

Dans l'interview en français du 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à tous les travailleurs. Un biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient le considérer pour l'analyse.

Calcul :

$ST_nDW4 = MoyenneW4 * 2$ (nombre de questions posées).

MoyenneW4 = somme des réponses valides / nombre de réponses valides (les réponses valides étant égales à 0, 1, 2, 3 ou 4).

Aucune valeur manquante n'a été permise pour calculer l'indice, étant donné que le nombre de composantes de l'indice est trop limité.

Code	Description	Condition
0-8	Valeur de l'indice (cote)	Voir le calcul de la variable dérivée ci-dessus
96	Sans objet	ST_n_W1=6 ou ST_n_W1A=6
99	Non déclaré	Toute réponse à la question ST_n_W1E ou W1F égale à 7, 8 ou 9

28.19 Menace de perdre son emploi

Nom au cycle 5 : ST_2DW5

Nom au cycle 4 : ST_0DW5

Nom au cycle 3 : S.O.

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : ST_4DW5 (*anciennement DVWSI 594*)

Basé sur ST_n_W1G.

MIN = 0, MAX = 4 (la menace de perdre son emploi est d'autant plus prononcée que la cote est élevée)

Cette variable dérivée détermine si le répondant estime que la sécurité de son emploi principal était bonne.

Dans l'interview en français du 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à tous les travailleurs. Un biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient le considérer pour l'analyse.

Aucune valeur manquante n'a été permise pour calculer l'indice.

Code	Description	Condition
0-4	Valeur de l'indice (cote)	ST_n_W1G=1 à 5; on soustrait un de la réponse pour la convertir à une échelle de 0 à 4
6	Sans objet	ST_n_W1=6 ou ST_n_W1A=6
9	Non déclaré	ST_n_W1G=7,8 ou 9

28.20 Exigences physiques

Nom au cycle 5 : ST_2DW6

Nom au cycle 4 : ST_0DW6

Nom au cycle 3 : S.O.

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : ST_4DW6 (*anciennement DVWSI694*)

Basé sur ST_n_W1H.

MIN = 0, MAX = 4 (le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée)

Les résultats ont été inversés pour la question ST_n_W1H.

Cette variable dérivée détermine si le principal emploi du répondant au cours des 12 derniers mois exigeait beaucoup d'efforts physiques.

Dans l'interview en français du 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à tous les travailleurs. Un biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient le considérer pour l'analyse.

Aucune valeur manquante n'a été permise pour calculer l'indice.

Code	Description	Condition
0-4	Valeur de l'indice (cote)	ST_n_W1H=1 à 5; La réponse est inversée et convertie à une échelle de 0 à 4
6	Sans objet	ST_n_W1=6 ou ST_n_W1A=6
9	Non déclaré	ST_n_W1H=7, 8 ou 9

28.21 **Soutien social**

Nom au cycle 5 : ST_2DW7

Nom au cycle 4 : ST_0DW7

Nom au cycle 3 : S.O.

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : ST_4DW7 (*anciennement DVWSI794*)

Basé sur ST_n_W1J, ST_n_W1K et ST_n_W1L.

MIN = 0, MAX = 12 (le soutien social est d'autant plus bas que la cote est élevée)

Les résultats ont été inversés pour la question ST_n_W1J.

Cette variable dérivée détermine si le superviseur et les collègues du répondant l'aident ou non dans l'exercice de ses fonctions. De plus, elle détermine si le répondant a été exposé à de l'hostilité ou à des conflits de la part de ses collègues dans le cadre de son principal emploi au cours des 12 derniers mois.

Dans l'interview en français du 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à tous les travailleurs. Un biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient le considérer pour l'analyse.

Calcul :

$$ST_nDW7 = MoyenneW7 * 3 \text{ (nombre de questions posées)}$$

$$MoyenneW7 = \text{somme des réponses valides} / \text{nombre de réponses valides (les réponses valides étant égales à 0, 1, 2, 3 ou 4)}$$

Aucune valeur manquante n'a été permise pour calculer l'indice, étant donné que le nombre de composantes de l'indice est trop limité.

Code	Description	Condition
0-12	Valeur de l'indice (cote)	Voir le calcul de la variable dérivée ci-dessus
96	Sans objet	ST_n_W1=6 ou ST_n_W1A=6
99	Non déclaré	Toute réponse à la question ST_n_W1J, W1K ou W1L égale à 7, 8 ou 9

28.22 **Contrainte au travail**

Nom au cycle 5 : ST_2DW8

Nom au cycle 4 : ST_0DW8

Nom au cycle 3 : S.O.

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : ST_4DW8

Basé sur ST_n_W1A, ST_n_W1B, ST_n_W1C, ST_n_W1D, ST_n_W1E, ST_n_W1F et ST_n_W1I.

MIN = 0,20, MAX = 5,00 (la contrainte au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée)

Les résultats ont été inversés pour les questions ST_n_W1A, W1B, W1C, W1E et W1I.

Cette variable dérivée détermine si le répondant avait expérimenté de la tension à son emploi. Le stress au travail est mesuré en tant que ratio des exigences psychologiques par rapport à la latitude de décision, laquelle inclut la discrétion relative à la compétence et le pouvoir décisionnel.

Dans l'interview en français du 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à tous les travailleurs. Un biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient le considérer pour l'analyse.

Références : Karasek R., Theorell T. *Healthy Work: Stress, Productivity and the Reconstruction of Working Life*, New York, Basic Books, Inc., 1990.

Calculs :

- On a inversé l'échelle pour les questions ST_n_W1A, ST_n_W1B, ST_n_W1C, ST_n_W1E et ST_n_W1I en soustrayant la valeur de ces variables de 6: 6-(valeurs 1 à 5).
- Le stress au travail est mesuré en tant que ratio :
 - des exigences psychologiques (variables : ST_n_W1E et ST_n_W1F) par rapport à
 - la latitude de décision, qui comprend :
 - la discrétion relative à la compétence (variables : ST_n_W1A, ST_n_W1B et ST_n_W1D); et
 - le pouvoir décisionnel (variables : ST_n_W1C et ST_n_W1I).
- La contribution possible de chaque énoncé aux cotes des exigences psychologiques et de la latitude de décision devrait être égale; on a divisé les sommes des cotes des réponses aux énoncés concernant chaque élément par 2 et par 5, respectivement :

Nouvelle cote des exigences psychologiques = $[(6 - ST_n_W1E) + (ST_n_W1F)] / 2$

Nouvelle cote de la latitude de décision = $[(6 - ST_n_W1A) + (6 - ST_n_W1B) + ST_n_W1D + (6 - ST_n_W1C) + (6 - ST_n_W1I)] / 5$

- On calcule ensuite le ratio du stress au travail en divisant la nouvelle cote des exigences psychologiques par la nouvelle cote de la latitude de décision.

$$ST_nDW8 = \{[(6 - ST_n_W1E) + ST_n_W1F] / 2\} / \{[(6 - ST_n_W1A) + (6 - ST_n_W1B) + ST_n_W1D + (6 - ST_n_W1C) + (6 - ST_n_W1I)] / 5\}$$

- Un répondant qui aurait la valeur la plus basse possible pour toutes les variables des exigences psychologiques (c'est-à-dire la valeur 1 à chacun des deux énoncés) et la valeur la plus haute possible pour toutes les variables de la latitude de décision (c'est-à-dire la valeur 5 à chacun des cinq énoncés) obtiendrait la cote minimale observée. Cette cote serait donc de $(2/2) / (25/5) = 0,2$. La cote maximale serait de $(10/2) / (5/5) = 5$.

Code	Description	Condition
0,20-5,00	Valeur de l'indice (cote)	$\{[(6 - ST_n_W1E) + ST_n_W1F] / 2\} / \{[(6 - ST_n_W1A) + (6 - ST_n_W1B) + ST_n_W1D + (6 - ST_n_W1C) + (6 - ST_n_W1I)] / 5\}$
9,96	Sans objet	ST_n_W1A=6
9,99	Non déclaré	Toute réponse à la question ST_n_W1A, ST_n_W1B, ST_n_W1C, ST_n_W1D, ST_n_W1E, ST_n_W1F ou ST_n_W1I égale à 7, 8 ou 9

Ressources psychologiques

28.23 **Échelle de l'estime de soi**

Nom au cycle 5 : S.O.

Nom au cycle 4 : PY_0DE1

Nom au cycle 3 : S.O.

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : PY_4DE1 (anciennement DVESTI94)

Source : Rosenberg, Morris, *Conceiving the self*, Appendix A, 1979, 291-295

Basé sur somme de toutes les réponses de PY_n_E1A à PY_n_E1F.

MIN = 0, MAX = 24 (des valeurs plus élevées indiquent plus d'estime de soi)

Les résultats ont été inversés pour les questions PY_n_E1A, E1B, E1C, E1D et E1E.

L'indice de l'estime de soi reflète la mesure de sentiments positifs qu'une personne éprouve à son égard. Les valeurs de l'indice sont basées sur un sous-ensemble de questions de l'échelle d'estime de soi de Rosenberg (1969). Les six questions ont été mises en facteurs dans une composante de l'analyse factorielle de Pearlin et Schooler (1978). Le codage des réponses se fonde sur une échelle à 5 points.

Code	Description	Condition
0-24	Valeur de l'indice (cote)	Somme des réponses de PY_n_E1A à PY_n_E1F. Les réponses sont converties en une échelle de 0 à 4
96	Sans objet	PY_n_E1A=6
99	Non déclaré	Une question parmi PY_n_E1A à PY_n_E1F égale à 7, 8 ou 9

28.24 **Échelle de contrôle**

Nom au cycle 5 : PY_2DM1

Nom au cycle 4 : PY_0DM1

Nom au cycle 3 : S.O.

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : PY_4DM1 (anciennement DVMAS194)

Source : Perlin, LI et Schooler, C, *Journal of Health and Social Behavior*, « The Structure of Coping », 1981, vol 19, p. 2-21.

Site Internet : www.jstor.org/

Basé sur la somme de PY_n_M1A à PY_n_M1G.

MIN = 0, MAX = 28 (des valeurs plus élevées indiquent un contrôle plus grand)

Les résultats ont été inversés pour les questions PY_n_M1F et PY_n_M1G.

L'indice qui mesure le sentiment de contrôle se fonde sur le travail de Pearlin et Schooler (1978). Il mesure l'ampleur de la croyance qu'ont les individus que leurs choix dans la vie sont sous leur contrôle. Les réponses sont codées au moyen d'une échelle à 5 points.

Code	Description	Condition
0-28	Valeur de l'indice (cote)	Somme des réponses aux questions PY_n_M1A à PY_n_M1G
96	Sans objet	PY_n_M1A=6
99	Non déclaré	Une question parmi PY_n_M1A à PY_n_M1G égale à 7, 8 ou 9

28.24 Échelle du sentiment de cohésion

Nom au cycle 5 : S.O.

Nom au cycle 4 : S.O.

Nom au cycle 3 : PY_8DH1

Nom au cycle 2 : S.O.

Nom au cycle 1 : PY_4DH1 (*anciennement DVSCI94*)

Source : Antonovsky, Morris, *Unraveling the Mystery of Health : How people Manage Stress and Stay Well*, 1987, Appendix, p. 189 - 194

Basé sur la somme de PY_n_H1 à PY_n_H13.

MIN = 0 , MAX = 78 (des valeurs plus élevées indiquent un sentiment plus puissant de cohésion)

Les résultats ont été inversés pour les questions PY_n_H1, H2, H3, H8 et H13.

On a utilisé pour l'ENSP la version abrégée de 13 questions de l'échelle du sentiment de cohésion développée par Antonovsky. Elle dénote jusqu'à quel point les individus perçoivent les événements comme étant compréhensibles, contrôlables et significatifs. Les questions Q3, Q4, Q8 et Q10 visent le concept de contrôle. Les questions Q1, Q9, Q11 et Q13 mesurent le degré d'importance du sentiment et les questions Q2, Q5, Q6, Q7 et Q12 portent sur le degré de compréhension.

29. INCAPACITÉ AU COURS DES DEUX DERNIÈRES SEMAINES (TW)**29.1 Nombre total de jours d'incapacité**

Nom au cycle 5 : S.O.

Nom au cycle 4 : S.O.

Nom au cycle 3 : TWC8DDDY

Nom au cycle 2 : TWC6DDDY

Nom au cycle 1 : TWC4DDDY (*anciennement DVDSY94*)**Source** : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991)**Site Web de Statistique Canada** : www.statcan.ca/francais/sdds/3894_f.htmBasé sur la somme de TWC_{n_2} et TWC_{n_4}.

Nombre de jours au cours des deux dernières semaines pendant lesquels le répondant a été alité ou a dû limiter ses activités à cause d'une maladie ou d'une blessure.

Code	Description	Condition
0-14	Nombre de jours d'incapacité	TWC _{n_2} <15 et TWC _{n_4} <15
96	Sans objet	TWC _{n_2} =96 et TWC _{n_4} =96
99	Non déclaré	TWC _{n_2} =99 et TWC _{n_4} =99

30. SANTÉ PRÉVENTIVE (WH)

VARIABLES RELATIVES À LA SANTÉ PRÉVENTIVE SUPPRIMÉES :

- 1. Âge auquel la répondante a subi une hystérectomie - variable groupée**
Nom au cycle 3 : WHC8G5A
***Raison :** Variable regroupée (FMGD seulement)*

ANNEXE A : CODES DE LIMITATION DES ACTIVITÉS**Principal problème de santé - 25 Groupes (RACnGC25)**

Recodage de CIM-9 à 25 groupes

1. Retard mental

3170 - 3190 Retard mental
7580 Syndrome de Down

2. Troubles mentaux

2900 - 3160 Psychoses, états psychotiques organiques, troubles névrotiques de la personnalité

3. Troubles de la vue

3600 - 3799 Maladies de l'œil et de ses annexes
7430 - 7439 Anomalies congénitales de l'œil
8710 - 8719 Plaie du globe oculaire
9213 - 9219 Contusion du globe oculaire
9400 - 9409 Brûlure limitée à l'œil et ses annexes
9500 - 9509 Traumatisme du nerf et des voies optiques
V410 - V411 Problèmes de la vue et autres problèmes oculaires
V425 Cornée remplacée par transplantation
V430 - V431 Œil et cristallin remplacés par d'autres moyens
V522 Mise en place et ajustement d'un œil artificiel

4. Troubles de l'ouïe

3800 - 3899 Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde
7440 - 7443 Anomalies congénitales de l'oreille
8720 - 8729 Plaie de l'oreille
9515 Traumatisme du nerf auditif
V412 - V413 Problèmes de l'audition et autres problèmes de l'audition

5. Autres maladies du système nerveux

3200 - 3599 Maladies inflammatoires, affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central et périphérique
7400 - 7429 Anencéphalie, spina bifida et autres anomalies congénitales du système nerveux
8000 - 8049 Fractures du crâne
8060 - 8069 Fracture de la colonne vertébrale, avec lésion médullaire
8500 - 8540 Traumatismes intracrâniens non associés à des fractures du crâne
9510 - 9514 Traumatismes des nerfs suivants : moteur oculaire commun, pathétique, trijumeau, moteur oculaire externe et facial
9516 - 9579 Traumatismes des autres nerfs crâniens, des nerfs périphériques, des racines, des autres nerfs
9520 Traumatisme de la moelle épinière (cervicale), sans signes de lésion vertébrale

6. Maladies hypertensives

4010 - 4059 Maladies hypertensives

7. Cardiopathies ischémiques

4100 - 4149 Cardiopathies ischémiques

8. Autres formes de cardiopathie

3900 - 3989	Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques
4150 - 4179	Troubles de la circulation pulmonaire
4200 - 4299	Autres formes de cardiopathies
7450 - 7459	Anomalies du bulbus cordis et des cloisons intracardiaques
7460 - 7469	Autres anomalies congénitales du cœur
7850 - 7853	Tachycardie, palpitations souffles cardiaques et autres signes cliniques cardiaques anormaux
8610 - 8611	Traumatisme du cœur avec ou sans mention de plaie du thorax
V421	Cœur remplacé par transplantation
V422	Valvule cardiaque remplacée par transplantation
V433	Valvule cardiaque remplacée par d'autres moyens
V450	Stimulateur cardiaque in situ

9. Autres troubles de l'appareil circulatoire

4300 - 4389	Maladies vasculaires cérébrales
4400 - 4489	Maladies des artères, artérioles et capillaires
4510 - 4599	Maladies des veines et des vaisseaux lymphatiques et autres maladies de l'appareil circulatoire
7470 - 7479	Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire
7854 - 7859	Gangrène, choc, sans mention de traumatisme, adénopathie
9000 - 9049	Traumatismes des vaisseaux sanguins
V434	Vaisseaux sanguins remplacés par d'autres moyens

10. Bronchite et emphysème

4900 - 4920	Bronchite, bronchite chronique et emphysème
-------------	---

11. Asthme

4930 - 4939	Asthme
-------------	--------

12. Autres maladies de l'appareil respiratoire

4770 - 4779	Rhinite allergique
4940 - 5199	Bronchectasie, pneumoconioses et autres maladies pulmonaires et de l'appareil respiratoire
7480 - 7489	Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire
7860 - 7869	Symptômes relatifs à l'appareil respiratoire et au thorax
8612 - 8613	Traumatisme du poumon avec ou sans mention de plaie du thorax

13. Maladies de l'appareil digestif

5200 - 5299	Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires
5300 - 5799	Maladies de l'œsophage, de l'estomac et du duodénum, appendicite, hernie abdominale, entérite, péritoine et autres
7500 - 7519	Autres anomalies congénitales de l'appareil digestif
7870 - 7879	Symptômes relatifs à l'appareil digestif
8630 - 8641	Traumatisme du tube digestif et du foie

14. Maladies infectieuses et parasitaires

0010 - 1398	Maladies infectieuses et parasites (sauf intestinales)
-------------	--

15. Arthrite - membres inférieurs

VA01 - VA06 Arthrite/Rhumatisme

16. Arthrite - membres supérieurs

VA07 - VA12 Arthrite/Rhumatisme

17. Arthrite - dos et colonne vertébrale

VA13 Arthrite/Rhumatisme

18. Arthrite - autre et non précisée

7110 - 7169 Arthropathies, arthrite rhumatoïde, arthroses, autres et sans précision

7250 Pseudo-polyarthrite rhizomélique

7290 Autres atteintes des tissus mous

VA00 Arthrite/Rhumatisme

VA14 - VA19 Arthrite/Rhumatisme

19. Maladies du système ostéoarticulaire - Membres inférieurs

7170 - 7179 Lésions articulaires du genou

7265 - 7267 Tendinites des insertions - hanche, genou, cheville, tarse

7321 - 7322 Ostéochondrite de la hanche et du bassin et épiphysite de l'extrémité supérieure du fémur

7324 - 7325 Ostéochondrite du membre inférieur et ostéochondrite du pied

7340 - 7359 Pied plat et déformations acquises des orteils

7363 - 7367 Déformations acquises de la hanche, genu varum, genu recurvatum et autres déformations de la cheville et pied

7395 - 7396 Dysfonctionnements somatiques, région pelvienne et hanche, et membres inférieurs

7543 - 7547 Malformations (hanche, genu recurvatum, pied)

7553 Raccourcissement du membre inférieur

7556 Autres anomalies du membre inférieur et de la ceinture pelvienne

8200 - 8291 Fractures du membre inférieur

8350 - 8381 Luxation de la hanche, genou, cheville, pied

8430 - 8451 Entorse de la hanche, cuisse, genou, jambe, cheville, pied

8900 - 8977 Plaies du membre inférieur

9280 - 9289 Écrasement du membre inférieur

9596 - 9597 Traumatismes de la hanche, cuisse, genou, jambe, cheville et pied

9912 Effets du froid

V521 Mise en place et ajustement (jambe artificielle)

VB01 - VB06 Disques endommagés/enlevés

VC01 - VC06 Os endommagés/faibles

VD01 - VD06 Cartilages endommagés

VE01 - VE06 Entorse/ligaments déchirés/tendons

VF01 - VF06 Muscles endommagés/étirés/faibles

VG01 - VG06 Absence/manquant

VH01 - VH06 Fractures/Brisures

VJ01 - VJ06 Fusions

VK01 - VK06 Difforme/crochu

VL01 - VL06 Déplacé/disloqué

VM01 - VM06 Douleur/endolorissement

VN01 - VN06 Ankylose

VP01 - VP06 Paralysie

VR01 - VR06 Problèmes de coordination

VS01 - VS06	Faiblesse - endroit non spécifié
VT01 - VT06	Autre faculté spécifiée
VU01 - VU06	Autre faculté non spécifiée

20. Autres maladies du système ostéoarticulaire - Membres supérieurs

7260 - 7264	Maladies des insertions tendineuses (épaule, coude, poignet)
7323	Ostéochondrite juvénile du membre supérieur
7360 - 7362	Déformations acquises de l'avant-bras, varus, doigt en maillet et autres déformations de la hanche
7397	Dysfonctionnements somatiques (membres supérieurs)
7552	Autres malformations (raccourcissement du membre supérieur)
7555	Autres malformations (autres anomalies du membre supérieur et de la ceinture scapulaire)
V520	Mise en place et ajustement (bras artificiel)
8100 - 8191	Fractures du membre supérieur
8310 - 8341	Luxation de l'épaule, coude, poignet, doigts
8400 - 8421	Entorse de l'épaule, bras, coude, avant-bras, poignet, main
8800 - 8877	Plaies du membre supérieur
9270 - 9279	Écrasement du membre supérieur
9592 - 9595	Autres traumatismes (épaule, bras, coude, avant-bras, poignet, main, doigt)
9911	Gelure des mains
VB07 - VB12*	Disques endommagés/enlevés
VC07 - VC12*	Os endommagés/faible
VD07 - VD12*	Cartilages endommagés
VE07 - VE12*	Entorse/ligaments déchirés/tendons
VF07 - VF12*	Muscles endommagés/étirés/faibles
VG07 - VG12*	Absence/manquant
VH07 - VH12*	Fractures/Brisures
VJ07 - VJ12*	Fusions
VK07 - VK12*	Difforme/crochu
VL07 - VL12*	Déplacé/disloqué
VM07 - VM12*	Douleur/endolorissement
VN07 - VN12*	Ankylose
VP07 - VP12*	Paralysie
VR07 - VR12*	Problèmes de coordination
VS07 - VS12*	Faiblesse - localisation non spécifiée
VT07 - VT12*	Autre incapacité spécifiée
VU07 - VU12*	Autre incapacité non spécifiée

21. Autres maladies du système ostéoarticulaire - dos et colonne vertébrale

7200 - 7209	Spondylarthrite ankylosante et autres spondylopathies inflammatoires
7210 - 7249	Arthrose rachidienne, lésions des disques intervertébraux, et autres atteintes de la région cervicale et du plan dorsal
7268 - 7269	Autres maladies des insertions tendineuses et autres maladies sans précision
7320	Ostéochondrite vertébrale infantile
7370 - 7379	Anomalies de la courbure de la colonne vertébrale et autres déformations acquises
7384 - 7385	Spondylolisthésis acquis et autres déformations du dos et colonne vertébrale
7391 - 7394	Dysfonctionnements somatiques (région cervicale, thoracique, lombaire, sacrée)
7542	Malformation du rachis
7561	Autres anomalies congénitales de la colonne vertébrale
8050 - 8059	Fracture de la colonne vertébrale, sans mention de lésion médullaire
8460 - 8479	Entorse de la région sacro-iliaque, cou, autres régions dorsales ou non précisées
9591	Autres traumatismes (tronc)
VB13 - VU13*	Incapacité du dos/rachis/disques intervertébraux

**Vn13 - lorsque « n » est B à H, J à N, P et R à U.

22. Maladies du système ostéoarticulaire autres et non précisées

7100 - 7109	Maladies disséminées du tissu conjonctif
7180 - 7199	Autres lésions des articulations et manifestations articulaires, autres et sans précision
7270 - 7279	Autres atteintes des synoviales, des tendons et des bourses
7280 - 7289	Atteintes des muscles, ligaments et aponévroses
7291 - 7299	Autres atteintes des tissus mous excluant rhumatisme et fibrosites
7300 - 7319	Ostéomyélite, périostite, maladies osseuses
7326 - 7339	Ostéochondropathie et atteintes, autres et non précisées, des os et des cartilages
7368 - 7369	Déformations acquises d'autres parties des membres, d'un membre
7380 - 7383	Autres déformations acquises (nez, tête, cou, thorax, côtes)
7386 - 7389	Autres déformations acquises (bassin, oreille, autres sièges précisés)
7390	Dysfonctionnements somatiques non classés ailleurs (région céphalique)
7398 - 7399	Dysfonctionnements somatiques non classés ailleurs (cage thoracique, région abdominale)
7540 - 7541	Malformations du crâne, face, mâchoires, sterno-cléido-mastoidien
7548	Autres malformations du système ostéo-musculaire
7550 - 7551	Autres malformations (polydactylie, syndactylie)
7554	Autres malformations (raccourcissement d'un membre, sans précision)
7558 - 7559	Autres malformations (autres anomalies précisées ou sans précision d'un membre non précisé)
7560	Anomalies du crâne et des os de la face
7562 - 7569	Autres anomalies congénitales du système ostéo-musculaire excluant colonne vertébrale
8070 - 8091	Fracture du sternum, côte, larynx, bassin, tronc
8300 - 8301	Luxation temporo-maxillaire
8390 - 8391	Luxation d'une vertèbre cervicale, simple ou compliquée
8480 - 8489	Entorses, autres ou mal définies
9260 - 9269	Écrasement du tronc
9598 - 9599	Traumatismes, autres, localisation précisée ou non précisée
V436	Remplacement d'une articulation d'un doigt

23. Tumeurs

1400 - 2089	Tumeurs malignes
2100 - 2299	Tumeurs bénignes
2300 - 2399	Carcinome in situ, tumeurs à évolution imprévisible, nature non précisée

24. Maladies des glandes endocrines, de la nutrition, du métabolisme et du système immunitaire

2400 - 2469	Troubles du corps thyroïde
2500 - 2509	Maladies des autres endocrines (diabète)
2510 - 2799	Maladies des autres endocrines (sauf diabète), états de carence et autres troubles du métabolisme

25. Autre

Tous autres

***Système de codage supplémentaire pour les incapacités ostéoarticulaires et musculaires**

Exemple VA01 - Arthrite/Rhumatisme de l'orteil

Incapacité	Localisation
VA__ - Arthrite/Rhumatisme	__00 - Sans objet
VB__ - Disques endommagés/enlevés	__01 - Orteil
VC__ - Os endommagés/faibles/en dégénérescence	__02 - Pied
VD__ - Cartilages endommagés/déchirés	__03 - Cheville
VE__ - Entorses/ligaments endommagés/déchirés	__04 - Genou
VF__ - Muscles endommagés/étirés/faibles	__05 - Jambe
VG__ - Absence/manquant	__06 - Hanche
VH__ - Fractures/cassures (seulement pour les os)	__07 - Doigt
VJ__ - Coalescences	__08 - Main
VK__ - Difforme/crochu	__09 - Poignet
VL__ - Déplacé/disloqué	__10 - Coude
VM__ - Douleur/endolorissement	__11 - Bras
VN__ - Ankylose	__12 - Épaule
VP__ - Paralysie	__13 - Dos/colonne vertébrale/disque
VR__ - Problèmes de coordination	__14 - Tronc/thorax/côtes/ clavicules
VS__ - Faiblesse - localisation spécifiée	__15 - Cou
VT__ - Autre incapacité spécifiée	__16 - Tête/visage
VU__ - Autre incapacité non spécifiée	__17 - Un côté du corps
	__18 - Au-dessous de la ceinture
	__19 - Tout le corps

ANNEXE B : CODAGE DES MÉDICAMENTS

Code pour les médicaments n° 1 à 12 - Groupé (DGCnG3A à DGCnG3L)

Code pour les produits pour la santé n° 1 à 12 - Groupé (DGCnG5A à DGCnG5L)

La classification des médicaments se fonde sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé et telle que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques (BDPP) de Santé Canada en septembre 2003. Ces codes sont disponibles sur demande spéciale.

1. Tube digestif et métabolisme

Formules diététiques pour le traitement d'obésité, excluant les préparations diététiques
Suppléments de minéraux
Préparations d'enzymes
Anti-reflux
Antiflatulents
Digestifs, incluant les enzymes
Antiémétiques et antinauséux
Modificateurs de la motilité intestinale
Purgatifs/laxatifs
Laxatifs - agents de masse
Laxatifs de contact
Laxatifs lubrifiants, émoullients
Laxatifs osmotiques
Système génito-urinaire, divers
Cholélithe et cholérétique
Traitement de l'ulcère peptique (antagonistes des récepteurs H2)
Traitement de l'ulcère peptique (autres)
Antiacides
Médicaments utilisés pour le diabète
Médicaments utilisés pour le diabète (insulines)
Médicaments utilisés pour le diabète (hypoglycémiant oraux)
Anti-hypoglycémiques
Autres suppléments de minéraux
Suppléments nutritionnels
Formules diététiques pour le traitement de l'obésité

2. Sang et organes sanguiformateurs

Formation de sang et coagulation
Anticoagulants
Antiplaquettaires
Préparations antianémiques (fer)
Solutions affectant la balance d'électrolytes (alcalin)
Solutions d'irrigations

3. Système cardio-vasculaire

Vasodilatateurs périphériques
Hémorragiques
Anti-hyperlipidémiques
Médicaments pour les affections cardiaques.
Thérapie cardiaque (glycosides et autres)
Thérapie cardiaque (antiarythmiques)
Thérapie cardiaque (bloqueurs des canaux calciques)

Agents antihypertenseurs
Agents antihypertenseurs (agents bloqueurs bêta)
Agents antihypertenseurs (inhibiteurs de l'enzyme de conversion -IECA)
Agents antihypertenseurs (agents adrénérgiques- bloqueurs neuronaux)
Agents antihypertenseurs (bloqueurs alpha)
Agents antihypertenseurs (autres)
Vasodilatateurs (nitrates/nitrites)
Vasodilatateurs (autres)
Diurétiques
Diurétiques (thiazidiques et dérivés)
Diurétiques (dit de l'«anse»)
Diurétiques (d'épargne potassique)

4. Produits dermatologiques

Préparations cutanées/muqueuses
Antibiotiques
Antiviraux
Antifongiques
Autres anti-infectieux
Anesthésiques à usage local/antiprurigineux
Préparations pour le traitement de l'acné
Médicaments contre le psoriasis et protecteurs
Kératolytiques
Kératoplastie
Astringents
Dépigmentation/pigmentation
Anti-inflammatoires (corticostéroïdes)
Protecteurs contre les radiations UV
Préparations dermatologiques diverses

7. Système génito-urinaire et hormones sexuelles

Agents anti-infectieux urinaires
Androgènes
Contraceptifs oraux
Progestatifs
Estrogènes
Gonadotropines
Antispasmodiques génito-urinaires

8. Préparations hormonales systématiques excluant les hormones sexuelles

Hormones
Thérapie aux corticostéroïdes
Hormones hypophysaires et hypothalamiques
Thérapie thyroïdienne/antithyroïdienne
Hormonothérapie thyroïdienne
Préparations antithyroïdiennes

10. Anti-infectieux généraux pour usage systémique

Antimycosiques pour usage systémique
Agents contre les mycobactéries
Antiviraux pour usage systémique
Aminosides antibactériens

Céphalosporine et produits apparentés
Macrolides
Antibactériens dérivés des quinolones
Sulfamidés
Tétracyclines
Pénicillines
Pénicillines (naturelle)
Pénicillines (résistant à la pénicillinase)
Pénicillines (à large spectre)
Antibactériens divers

12. Agents antinéoplasiques

Antinéoplasiques
Alcoylants
Anti-métabolites
Antinéoplasiques divers
Agents immunosuppresseurs

13. Système musculo-squelettique

Relaxants musculaires
Relaxants musculaires (action centrale)
Relaxants musculaires (association)
Analgésiques/antipyrétiques
Anti-inflammatoires et antirhumatismaux
Préparations augmentant l'excrétion d'acide urique
Préparations de sels d'or
Produits topiques pour douleurs articulaires et musculaires

14. Système nerveux

Parasympathomimétiques
Anticholinergiques, antimuscariniques/antispasmodiques
Alcaloïdes de l'ergot de seigle
Anticonvulsants
Préparations contre la migraine
Antiparkinsoniens
Alcool
Analgésiques/antipyrétiques (acide salicylique et dérivés)
Analgésiques/antipyrétiques (opiacés)
Analgésiques/antipyrétiques (opiacés-association)
Analgésiques/antipyrétiques (opiacés-Codéine)
Analgésiques/antipyrétiques (divers)
Analgésiques/antipyrétiques (acétaminophène)
Antidépresseurs
Antidépresseurs (inhibiteurs de la monoamine oxydase)
Antidépresseurs (tricycliques)
Antidépresseurs (inhibiteurs de sérotonine)
Antidépresseurs (autres)
Anxiolytiques, sédatifs, hypnotiques
Anxiolytiques (Benzodiazépines demi-vie courte)
Anxiolytiques (Benzodiazépines demi-vie moyenne)
Anxiolytiques (Benzodiazépines demi-vie longue)
Anxiolytiques (autres)
Hypnotiques et sédatifs (barbituriques)

- Hypnotiques et sédatifs (autres)
 - Antipsychotiques (phénothiazine)
 - Antipsychotiques (autres)
 - Psychostimulants
 - Neuroleptiques (lithium)
- 16. Produits antiparasitaires**
- Antiprotozoaires (antipaludiques)
- 17. Médicaments communs contre la toux et le rhume**
- Médicaments contre le rhume
- 18. Système respiratoire**
- Antihistaminiques (général)
 - Antihistaminiques (pour usage systémique)
 - Antihistaminiques (pour usage systémique - autres)
 - Stimulants respiratoires
 - Antiasthmiques et autres antiasthmiques (inhalateurs)
 - Antiasthmiques (théophylline)
 - Antiasthmiques (Agoniste-B)
 - Antiasthmiques (autres)
- 19. Organes sensoriels**
- Anti-infectieux
 - Anti-inflammatoire
 - Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique
 - Préparations pour le glaucome et miotiques
 - Mydriatiques
 - Rince-bouches et gargarismes
 - Décongestionnants nasaux et systémiques (nasal)
 - Préparations ophtalmologiques et otologiques
 - Anti-infectieux (antiviraux)
 - Anti-infectieux (sulfamidés)
 - Anti-infectieux (divers)
- 22. Divers**
- Agents contre le tabagisme
 - Métaux lourds - antagonistes
 - Anesthésiques locaux (parentéraux)
 - Vaccins
 - Dérivés de vitamine A
 - Complexe vitaminique B
 - Vitamine C
 - Vitamine D
 - Vitamine E
 - Vitamine K
 - Préparations diverses vitaminiques
 - Multivitamines
 - Placebo
 - Thérapies non classées

24. Médecines douces

Médecines naturelles
Herbes médicinales
Cure de réduction pondérale naturelle
Tisanes
Médecine chinoise
Immuno-antiallergiques naturels
Micro-algues
Protéines
Acides aminés
Nucléosides
Aminés sucrés
Acides gras
Huiles naturelles, épices
Enzymes naturels
Vitamines naturelles
Anti-oxydants
Minéraux naturels
Produits nutritifs
Thérapies alternatives
Thérapies aromatiques
Homéopathie
Médicaments naturels (divers)

26. Produits manquants

Produits et médicaments manquants

ANNEXE C : CODAGE DES PAYS DE NAISSANCE

Variables	COBC & COBGC
Code	Pays
13	CANADA
101	GROENLAND
102	SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
103	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
105	AMÉRIQUE DU NORD
201	BELIZE
202	COSTA RICA
203	EL SALVADOR
204	GUATEMALA
205	HONDURAS
206	MEXIQUE
207	NICARAGUA
208	PANAMA
209	AMÉRIQUE CENTRALE
301	ANGUILLA
302	ANTIGUA
303	ARUBA
304	BAHAMAS
305	BARBADE
306	BERMUDES
307	ÎLES CAÏMAN
308	CUBA
309	DOMINIQUE
310	DOMINICAINE, RÉPUBLIQUE
311	GRENADE
312	GUADELOUPE
313	HAÏTI
314	JAMAÏQUE
315	MARTINIQUE
316	MONTSERRAT
317	ANTILLES NÉERLANDAISES
318	PORTO RICO
319	SAINT-CHRISTOPHE ET NEVIS
320	SAINTE-LUCIE
321	SAINT-VINCENT ET GRENADINES
322	TRINITÉ ET TOBAGO
323	TURKS ET CAÏCOS, ÎLES
324	ÎLES VIERGES, (BRITANNIQUES)
325	ÎLES VIERGES, (AMÉRICAINES)
326	ANTILLES
327	CARAÏBES
401	ARGENTINE
402	BOLIVIE
403	BRÉSIL
404	CHILI
405	COLOMBIE
406	ÉQUATEUR
407	FALKLAND, ÎLES
408	GUYANE FRANÇAISE
409	GUYANA

410	PARAGUAY
411	PÉROU
412	SURINAM
413	URUGUAY
414	VENEZUELA
419	AMÉRIQUE DU SUD
501	AUTRICHE
502	BELGIQUE
503	FRANCE
505	ALLEMAGNE, RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'
506	LIECHTENSTEIN
507	LUXEMBOURG
508	MONACO
509	PAYS-BAS
511	SUISSE
512	EUROPE OCCIDENTALE
517	BULGARIE
518	TCHÉCOSLOVAQUIE
519	TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
520	ESTONIE
521	HONGRIE
522	LETTONIE
523	LITHUANIE
524	POLOGNE
525	ROUMANIE
526	SLOVAQUIE
527	URSS
529	ARMÉNIE
530	AZERBAÏDJAN
531	BELARUS, RÉPUBLIQUE DE
532	GEORGIE
533	MOLDAVIE
534	RUSSIE
535	UKRAINE
536	KAZAKHSTAN
537	KIRGHIZISTAN
538	TADJIKISTAN
539	TURKMÉNISTAN
540	OUZBÉKISTAN
541	EUROPE ORIENTALE
546	IRLANDE, RÉPUBLIQUE D' (EIRE)
547	IRLANDE
548	ROYAUME-UNI
551	EUROPE DU NORD
556	DANEMARK
557	FINLANDE
558	ISLANDE
559	NORVÈGE
560	SUÈDE
561	SCANDINAVIE
566	ALBANIE
567	ANDORRE
568	BOSNIE-HERZÉGOVINE
569	CROATIE
570	CHYPRE
571	GIBRALTAR

572	GRÈCE
573	ITALIE
574	MACÉDONIE, ANCIENNE RÉPUB. YOUGOSLAVE
575	MALTE
576	MONTÉNÉGRO
577	PORTUGAL
578	SAINT-MARIN
579	SERBIE
580	SLOVÉNIE
581	ESPAGNE
582	VATICAN, ÉTAT DE LA CITÉ DU
583	YOUGOSLAVIE, L'ANCIENNE
584	EUROPE MÉRIDIONALE
585	RÉPUBLIC FÉDÉRALE DE YOUGOSLAVIE
586	MACÉDONIE (GRÈCE OU ARY DE MACÉDONIE)
589	EUROPE
601	BÉNIN
602	BURKINA FASO
603	CAP-VERT
604	GAMBIE
605	GHANA
606	GUINÉE
607	GUINÉE-BISSAU
608	CÔTE D'IVOIRE
609	LIBÉRIA
610	MALI
611	MAURITANIE
612	NIGER
613	NIGERIA
614	SAINTE-HELÈNE-ET-ASCENSION
615	SÉNÉGAL
616	SIERRA LEONE
617	TOGO
618	AFRIQUE DE L'OUEST
623	BURUNDI
624	COMORES
625	DJIBOUTI, RÉPUBLIQUE DE
626	ERYTHRÉE
627	ÉTHIOPIE
628	KENYA
629	MADAGASCAR
630	MALAWI
631	MAURICE
632	MAYOTTE
633	MOZAMBIQUE
634	RÉUNION
635	RWANDA
636	SEYCHELLES
637	SOMALIE
638	TANZANIE
639	OUGANDA
640	ZAMBIE
641	ZIMBABWE
642	AFRIQUE ORIENTALE
647	ALGÉRIE
648	ÉGYPTE

649	LIBYE
650	MAROC
651	SOUDAN
652	TUNISIE
653	SAHARA OCCIDENTAL
654	AFRIQUE DU NORD
659	ANGOLA
660	CAMEROUN
661	CENTRAFRICAINE, RÉPUBLIQUE
662	TCHAD
663	CONGO (LA REPUBLIC DU CONGO)
664	GUINÉE ÉQUATORIALE
665	GABON
666	SAO TOMÉ ET PRINCIPE
667	LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
672	BOTSWANA
673	LESOTHO
674	NAMIBIE
675	AFRIQUE DU SUD, RÉPUBLIQUE D'
676	SWAZILAND
681	AFRIQUE
701	AFGHANISTAN
702	TURQUIE
703	ASIE DE L'OUEST
708	BAHREIN
709	IRAN
710	IRAQ
711	ISRAËL
712	JORDANIE
713	KOWEÏT
714	LIBAN
715	OMAN
716	QATAR
717	ARABIE SAOUDITE
718	SYRIE
719	ÉMIRATS ARABES UNIS
720	YÉMEN, RÉPUBLIQUE
721	MOYEN ORIENT
726	CHINE
727	CHINE, RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE
728	HONG KONG
729	JAPON
730	CORÉE DU NORD
731	CORÉE DU SUD
732	CORÉE
733	MACAO
734	MONGOLIE
735	TAIWAN
736	ASIE ORIENTAL
741	BRUNEI
742	INDONÉSIE
743	KAMPUCHÉA
744	LAOS
745	MALAISIE
746	MYANMAR, UNION DU
747	PHILIPPINES

748	SINGAPOUR
749	THAÏLANDE
750	VIËT-NAM
751	ASIE DU SUD EST
756	BANGLADESH
757	BHOUTAN
758	INDE
759	MALDIVES, RÉPUBLIQUE DE
760	NÉPAL
761	PAKISTAN
762	SRI LANKA
763	ASIE DU SUD
764	PALESTINE
768	ASIE
801	SAMOA AMÉRICAINES
802	AUSTRALIE
803	BELAU, RÉPUBLIQUE
804	COOK, ÎLES
805	FIDJI
806	POLYNÉSIE FRANÇAISE
807	GUAM (E.U.)
808	KIRIBATI
809	MARSHALL, ÎLES
810	MICRONÉSIE, ÉTATS FÉDÉRÉS DE
811	NAURU
812	NOUVELLE-CALÉDONIE
813	NOUVELLE-ZÉLANDE
814	PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE
815	PITCAIRN, ÎLE
816	SALOMON, ÎLES
817	TONGA
818	TUVALU
819	TERRITOIRES SOUS LES É.U. DANS PACIFIQUE
820	VANUATU
821	WALLIS ET FUTUNA
822	SAMOA OCCIDENTALES
827	OCÉANIE
901	IMMIGRANT REÇU
910	PAS NÉ
998	ADOPTION / INCONNUE
999	SUR L'OCÉAN